

บัญชีรายชื่อนกในประเทศไทย

A CHECKLIST OF THE BIRDS IN THAILAND

โดม ประทุมทอง^{1*/} สมหญิง ทักษิกรณ์^{2/} และประทีป ด้วงแค^{1/}

Dome Pratumthong^{1*/} Somying Thunhikorn^{2/} & Prateep Duengkae^{1/}

ABSTRACT

A checklist of birds in Thailand has been compiled based on literature surveys. Specific names, locality types, species code, and distribution were gathered from many recent sources. Currently, the birds of Thailand comprise 1,000 species. Many reports have indicated that Thailand has new bird record every year.

บทคัดย่อ

บัญชีรายชื่อของนกในประเทศไทยได้ทำการรวบรวมจากเอกสารสิ่งพิมพ์และแหล่งเผยแพร่ต่างๆ และโดยได้นำเสนอในรูปแบบของชื่อไทย ชื่อสามัญ ชื่อชนิด พร้อมกับ อักษรย่อ รายงานแหล่งที่พบครั้งแรก การแพร่กระจายในประเทศไทย พร้อมเอกสารอ้างอิงที่เกี่ยวข้องกับชนิด จนถึงในปัจจุบันมีรายงานจำนวนชนิดไว้แล้ว 1,000 ชนิด และจากการรวบรวมเอกสารที่ผ่านมาพบว่ามีรายงานชนิดนกเพิ่มขึ้น(new record) อยู่เป็นประจำทุกปี

^{1*/} ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ม.เกษตรศาสตร์ ถ.พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 * E-mail: karchera61@gmail.com

^{2/} กลุ่มงานวิจัยสัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพรรณพืช 61 ถ.พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900

คำนำ

ในระยะ 30 ปี ที่ผ่านมานี้ มีผลงานและเอกสารงานวิจัยเกี่ยวกับนกในประเทศไทย ถูกตีพิมพ์มากมาย ทั้งวิทยานิพนธ์ ผลงานวิชาการ วารสาร นิตยสาร และหนังสือ ทั้งนี้ นับตั้งแต่ปีพ.ศ. 2531 เป็นต้นมา กระแสการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รับความสนใจจากประชาชนมากยิ่งขึ้น และกิจกรรมการดูนก ก็เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่ส่งเสริมให้การศึกษาเกี่ยวกับนกในประเทศไทย มีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น

นับตั้งแต่ พ.ศ.2534 นายแพทย์บุญส่ง เลขะกุล ได้จัดพิมพ์หนังสือ A Guide to the Birds of Thailand เล่มที่ 3 ขึ้น โดยร่วมมือกับ Phillip D. Round มีนกในประเทศไทยในเล่มนี้ทั้งสิ้น 915 ชนิด (Lekagul & Round, 1991) ในระหว่างปีพ.ศ. 2541 -2545 รศ. โอภาส ขอบเขตต์ ได้เขียนหนังสือ เรื่อง นกในเมืองไทย เล่ม 1 – 5 เป็นข้อมูลนกในประเทศไทยจำนวน 965 ชนิด ที่เป็นภาษาไทยที่สมบูรณ์ที่สุดในขณะนั้น (โอภาส ,2541;2542;2543;2544ก;2544ข) ในปีเดียวกัน คือ พ.ศ. 2545 Craig Robson จัดพิมพ์หนังสือ A Field Guide to the Birds of Thailand ขึ้น มีนกจำนวน 962 ชนิด (Robson, 2002)

พ.ศ. 2550 หนังสือ คู่มือดูนกหมอบุญส่ง เลขะกุล นกเมืองไทย โดย อ.จารุจินต์ นภิตะภักดิ์ และคณะ เป็นหนังสือคู่มือดูนกฉบับภาษาไทยที่รวบรวมชนิดนกไว้มากถึง 986 ชนิด (จารุจินต์ และคณะ,2550)

สำหรับ บัญชีรายชื่อนกในประเทศไทยครั้งนี้ได้ดำเนินการตรวจเอกสารและข้อมูลชนิดนกที่พบในประเทศไทย จนถึงปี พ.ศ. 2554 โดยใช้เอกสารหลักๆ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541 อันประกอบไปด้วย โอภาส (2541;2542;2543;2544ก;2544ข) จารุจินต์ และคณะ (2550) และ Robson (2008) โดยอ้างอิงเพิ่มเติมจาก คณะกรรมการพิจารณาข้อมูลนก สมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย(สมาคมอนุรักษ์นกแห่งประเทศไทย (2554) ซึ่งยังมีบางชนิดที่รอการยืนยันและขึ้นบัญชีเป็นนกชนิดใหม่ในประเทศไทย ในที่นี้รวบรวมไว้ จำนวน 1,000ชนิด ที่มีการยืนยันชัดเจน และทำการถอนรายชื่อ นกอินทรีสีน้ำตาลเล็ก (Tawny Eagle) *Aquila rapax* (Temminck) 1828 ออกจากบัญชีเดิมที่เคยมีรายงาน เนื่องจากตัวอย่างที่ใช้จำแนกซึ่งมีเพียงตัวอย่างเดียวจริงๆ แล้วเป็นนกอินทรีแถบปีกดำ วัยเด็ก (Duckworth *et al.*, 2008)

อันดับไก่ (Order Galliformes)

วงศ์ไก่ฟ้า นกกระทา และนกคุ้ม (Family Phasianidae)

1. นกกระทาทู้ง (Chinese Francolin) *Francolinus pintadeanus* (Scopoli, 1786) FRANPI
Type locality: ประเทศจีน *การแพร่กระจาย* : ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก และ ภาคตะวันออก *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2541); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

2. ไก่นวล (Long-billed Partridge) *Rhizothera longirostris* (Temminck, 1807) RHZOLO
Type locality: เกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย *การแพร่กระจาย* : ภาคตะวันตก และ ภาคใต้
อ้างอิงจาก : โอภาส (2541); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

3. นกคุ้มญี่ปุ่น (Japanese Quail) *Coturnix japonica* Temminck & Schlegel, 1849
 COTUJA
Type locality: ประเทศญี่ปุ่น *การแพร่กระจาย* : ภาคเหนือ *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2541); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

4. นกคุ้มมอกดำ (Rain Quail) *Coturnix coromandelica* (Gmelin, 1789)
 COTUCO *Type locality*: ชายฝั่ง कोरोแมนเดล (Coromandel) ประเทศอินเดีย *การแพร่กระจาย* : ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2541); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

5. นกคุ้มสี (Blue-breasted Quail) *Coturnix chinensis* (Linnaeus, 1766) COTUCH
Type locality: ประเทศจีน *การแพร่กระจาย* : ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออกและภาคใต้ *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2541); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

6. นกกระทาดงคอสีแสด (Rufous-throated Partridge) *Arborophila rufogularis* (Blyth, 1850) ARBORU
Type locality: เมืองดาร์จีลิง (Darjeeling) รัฐอัสสัม ประเทศอินเดีย *การแพร่กระจาย* : ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันตก *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2541); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008);

7. นกกระทาดงอกสีน้ำตาล (Bar-backed Partridge) *Arborophila brunnepectus* (Blyth, 1855)

ARBOBR

Type locality:บริเวณเทือกเขาตะนาวศรี ประเทศพม่า *การแพร่กระจาย* : ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2541); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

8. นกกระทาดงอกเทา (Grey-breasted Partridge) *Arborophila orientalis* (Horsfield, 1821)

ARBOOR

Type locality:เกาะชวา ประเทศอินโดนีเซีย *การแพร่กระจาย* : ภาคใต้ *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2541); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

9. นกกระทาดงอกจันทบูร (Chestnut-headed Partridge) *Arborophila cambodiana* Delacour & Jabouille, 1928

ARBOCA

Type locality:ประเทศกัมพูชา *การแพร่กระจาย* : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2541); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

10. นกกระทาดงอกเขี้ยว (Scaly-breasted Partridge) *Arborophila chloropus* (Blyth, 1859)

ARBOCH

Type locality:ประเทศมาเลเซีย *การแพร่กระจาย* : ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกและภาคตะวันตก *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2541); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

11. นกกระทาดงอกขี้ไก่ (Chestnut-necklaced Partridge) *Arborophila charltonii*(Eyton, 1845)

ARBOCH

Type locality:ประเทศมาเลเซีย *การแพร่กระจาย* : ภาคใต้ *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2541); จารุจินต์ และคณะ (2550)

12. นกกระทาดงมลายู (Malayan Partridge) *Arborophila campbelli* (Robison, 1904)

ARBOCM

Type locality:ประเทศมาเลเซีย *การแพร่กระจาย* : ภาคใต้ *อ้างอิงจาก* : สมาคมอนุรักษ์นกแห่งประเทศไทย (2554)

13. นกกระทาสองเดือย (Ferruginous Partridge) *Caloperdix oculo* (Temminck, 1815)

CALOOC

Type locality: ประเทศมาเลเซีย *การแพร่กระจาย* : ภาคใต้และภาคตะวันตก *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2541); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

14. ไก่จุก (Crested Wood Partridge) *Rollulus rouloul* (Scopoli, 1786)

ROLLRO

Type locality: ประเทศมาเลเซีย *การแพร่กระจาย* : ภาคใต้และภาคตะวันตก *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2541); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

15. นกกระทาป่าไผ่ (Mountain Bamboo Partridge) *Bambusicola fytchii* Anderson, 1871

BAMBFY

Type locality: มลฑลยูนนาน ตอนใต้ของประเทศจีน *การแพร่กระจาย* : ภาคเหนือ *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2541); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

16. ไก่ป่า (Red Junglefowl) *Gallus gallus* (Linnaeus, 1758)

GALLGA

Type locality: เกาะปูลูกองคอร์ นอกชายฝั่งทะเลประเทศเวียดนาม *การแพร่กระจาย* : ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออกและภาคใต้ *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2541); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

17. ก. ไก่ฟ้าหลังขาว (Silver Pheasant) *Lophura nycthemera* (Linnaeus, 1758)

LOPHNY

Type locality: ประเทศจีน *การแพร่กระจาย* : ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2541); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008);

ข. ไก่ฟ้าหลังเทา (Kalij Pheasant) *Lophura nycthemera* (Linnaeus, 1758)

LOPHNY

Type locality: ประเทศเนปาล *การแพร่กระจาย* : ภาคเหนือ และภาคตะวันตก *อ้างอิงจาก*: โอภาส (2541); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

18. ไก่ฟ้าหน้าเขียว (Crested Fireback) *Lophura ignita* (Ahaw,1797) LOPHIG
Type locality:เกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย *การแพร่กระจาย* :ภาคใต้ *อ้างอิงจาก* :โอภาส (2541); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)
19. ไก่ฟ้าพญาลอ (Siamese Fireback) *Lophura diardi* (Bonaparte, 1856) LOPHDI
Type locality:ประเทศเวียดนาม *การแพร่กระจาย* :ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก *อ้างอิงจาก* :โอภาส (2541); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)
20. ไก่ฟ้าหางลายขวาง (Mrs Hume's Pheasant) *Syrmaticus humiae* (Hume, 1881) SYRMHU
Type locality:เมืองมานิปัวร์ (Manipur) รัฐอัสสัม ประเทศอินเดีย *การแพร่กระจาย* :ภาคเหนือ *อ้างอิงจาก* :โอภาส (2541); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)
21. นกแว่นภูเขา (Mountain Peacock-Pheasant) *Polyplectron inopinatum* (Rothschild, 1903)
 POLYIN
Type locality:ประเทศมาเลเซีย *การแพร่กระจาย* :ภาคใต้ *อ้างอิงจาก* :โอภาส (2541); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008); Sibley and Monroe (1990)
22. นกแว่นสีเทา (Grey Peacock Pheasant) *Polyplectron bicalcaratum* (Linnaeus, 1758)
 POLYBI
Type locality:มณฑลยูนนาน ประเทศจีน *การแพร่กระจาย* :ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันตก *อ้างอิงจาก* :โอภาส (2541); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)
23. นกแว่นสีน้ำตาล (Malayan Peacock Pheasant) *Polyplectron malacense* (Scopoli, 1786)
 POLYMA
Type locality:รัฐมะละกา ประเทศมาเลเซีย *การแพร่กระจาย* :ภาคใต้ *อ้างอิงจาก* :โอภาส (2541); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)
24. นกหัวัว (Great Argus) *Argusianus argus* (Linnaeus, 1766) ARGUAR
Type locality:เกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย *การแพร่กระจาย* :ภาคใต้ *อ้างอิงจาก* :โอภาส (2541); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

25. นกยูง (Green Peafowl) *Pavo muticus* Linnaeus, 1766 PAVOMU

Type locality: เกาะชวา ประเทศอินโดนีเซีย *การแพร่กระจาย* : ภาคเหนือ และภาคตะวันตก *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2541); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

อันดับห่าน (Order Anseriformes)

วงศ์เป็ดและห่าน (Family Anatidae/Dendrocygnidae)

26. เป็ดแดง (Lesser Whistling-duck) *Dendrocygna javanica* (Horsfield, 1821)

DENDJA

Type locality: เกาะชวา ประเทศอินโดนีเซีย *การแพร่กระจาย* : ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันตกและ ภาคใต้ *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2541); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

วงศ์นกเป็ดน้ำ (Family Anatidae)

27. ห่านเทาปากดำห่านคอขาว (Swan Goose) *Anser cygnoides* (Linnaeus) 1758 ANSECY

Type locality: ไชบีเรีย ประเทศรัสเซีย *การแพร่กระจาย* : ภาคเหนือ *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2544ข); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

28. ห่านเทาปากสีชมพู (Greylag Goose) *Anser anser* (Linnaeus) 1758. ANSEAN

Type locality: ประเทศสวีเดน *การแพร่กระจาย* : ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2541); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

29. ห่านหัวลาย (Bar-headed Goose) *Anser indicus* (Latham, 1790) ANSEIN

Type locality: ประเทศอินเดีย *การแพร่กระจาย* : ภาคเหนือ *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2541); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

30. เป็ดพม่า (Ruddy Shelduck) *Tadorna ferruginea* (Pallas, 1764) TADOFE

Type locality: ทาร์ทารี (Tartary) *การแพร่กระจาย* : ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2541); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

31. เป็ดเชลดัค (Common Shelduck) *Tadorna tadorna* (Linnaeus, 1758) TADOTA
Type locality:ประเทศสวีเดน *การแพร่กระจาย* : ภาคเหนือ และ ภาคกลาง *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2541); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)
32. เป็ดก่า (White-winged Duck) *Cairina scutulata* (Mueller, 1842) CAIRSC
Type locality: เกาะชวา ประเทศอินโดนีเซีย *การแพร่กระจาย* : ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก และ ภาคใต้ *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2541); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)
33. เป็ดหงส์ (Comb Duck) *Sarkidiornis melanotos* (Pennant, 1769) SARKME
Type locality: ประเทศศรีลังกา *การแพร่กระจาย* : ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ ภาคกลาง *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2541); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)
34. เป็ดคัมแบค (Cotton Pygmy-goose) *Nettapus coromandelianus* (Gmelin, 1789) NETTCO
Type locality: ชายฝั่งโคโรแมนเดล ประเทศอินเดีย *การแพร่กระจาย* : ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และ ภาคใต้ *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2541); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)
35. เป็ดแมนดาริน (Mandarin Duck) *Aix galericulata* (Linnaeus, 1758) AIXGAL
Type locality: ประเทศจีน *การแพร่กระจาย* : ภาคเหนือ *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2541); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)
36. เป็ดเทากันดำ (Gadwall) *Anas strepera* Linnaeus, 1758 ANASST
Type locality: ประเทศสวีเดน *การแพร่กระจาย* : ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันตก *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2541); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)
37. เป็ดเป็ยหน้าเขี้ยว (Falcated Teal) *Anas falcata* Georgi, 1775 ANASFA
Type locality: ประเทศรัสเซีย *การแพร่กระจาย* : ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2541); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

38. เป็ดปากสั้น (Eurasian Wigeon) *Anas penelope* Linnaeus, 1758 ANASPE
Type locality:ประเทศสวีเดน *การแพร่กระจาย* : ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และ ภาคใต้ *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2541); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)
39. เป็ดหัวเขียว (Mallard) *Anas platyrhynchos* Linnaeus, 1758 ANASPL
Type locality:ประเทศสวีเดน *การแพร่กระจาย* : ภาคเหนือ *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2541); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)
40. เป็ดเทา (Spot-billed Duck) *Anas poecilorhyncha* Forster, 1781 ANASPO
Type locality:ประเทศศรีลังกา *การแพร่กระจาย* : ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียง *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2541); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)
41. นกเป็ดเทาพันธุ์จีน (Chinese Spot-billed Duck) *Anas zonorhyncha* Swinhoe, 1866.
 ANASZO
Type locality:ทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศรัสเซีย (SE USSR)*การแพร่กระจาย* : ภาคเหนือ *อ้างอิงจาก* : สมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย(2554)
42. เป็ดปากพลั่ว (Northern Shoveler) *Anas clypeata* Linnaeus, 1758 ANASCL
Type locality:ประเทศสวีเดน *การแพร่กระจาย* : ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียง และภาคตะวันตก *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2541); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)
43. เป็ดหางแหลม (Northern Pintail) *Anas acuta* Linnaeus, 1758 ANASAC
Type locality:ประเทศสวีเดน *การแพร่กระจาย* : ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียง และภาคตะวันตก *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2541); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)
44. เป็ดลาย (Garganey) *Anas querquedula* Linnaeus, 1758. ANASQU
Type locality:ประเทศสวีเดน *การแพร่กระจาย* : ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียง ภาคตะวันตกและ ภาคใต้ *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2541); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

45. เปิดหน้าเหลือง (Baikal Teal) *Anas formosa* Georgi, 1775 ANASFO
Type locality:ทะเลสาบไบคาล ในไซบีเรีย *การแพร่กระจาย* : ภาคเหนือ และ ภาคกลาง *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2541); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)
46. เปิดปีกเขียว (Common Teal) *Anas crecca* Linnaeus, 1758 ANASCR
Type locality:ประเทศสวีเดน *การแพร่กระจาย* : ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันตก *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2541); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)
47. เปิดปากแดง (Red-crested Pochard) *Rhodonessa rufina* (Pallas, 1773) RHODRU
Type locality:ทะเลสาบแคสเปียน *การแพร่กระจาย* : ภาคกลาง *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2541); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)
48. เปิดโปซาดหลังขาว (Common Pochard) *Aythya ferina* (Linnaeus, 1758) AYTHFE
Type locality:ประเทศสวีเดน *การแพร่กระจาย* : ภาคเหนือ *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2541); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)
49. เปิดดำหัวสีน้ำตาล (Ferruginous Pochard) *Aythya nyroca* (Gueldenstadt, 1770) AYTHMY
Type locality:ประเทศรัสเซีย *การแพร่กระจาย* : ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2541); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)
50. เปิดดำหัวดำ (Baer's Pochard) *Aythya baeri* (Radde, 1863) AYTHBA
Type locality: ไซบีเรีย ประเทศรัสเซีย *การแพร่กระจาย* : ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตกและ ภาคใต้ *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2541); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)
51. เปิดเปี้ยว (Tufted Duck) *Aythya fuligula* (Linnaeus, 1758) AYTHFU
Type locality:ประเทศสวีเดน *การแพร่กระจาย* : ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตกและ ภาคใต้ *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2541); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

52. เป็ดดำหลังขาว (Greater Scaup) *Aythya marila*(Linnaeus, 1761) AYTHMA
Type locality:Lapland (บริเวณตอนเหนือของประเทศนอร์เวย์ สวีเดน ฟินแลนด์ และแหลมโคลาของรัสเซีย) *การแพร่กระจาย* : ภาคเหนือ *อ้างอิงจาก* : จารูจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

53. เป็ดหางยาว(Long-tailed Duck) *Clangula hyemalis* (Linnaeus, 1758) CLANHY
Type locality:Arctic Europe and America*การแพร่กระจาย* : ภาคเหนือ *อ้างอิงจาก* : สมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย (2554)

54. เป็ดปากยาวข้างลาย (Scaly-sided Merganser) *Mergus squamatus* Gould, 1864
 MERGSQ
Type locality:ประเทศจีน *การแพร่กระจาย* : ภาคเหนือ *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2541);จารูจินต์ และคณะ (2550)

อันดับ นกคุ่มอีด (Order Turniciformes)

วงศ์นกคุ่มอีด (Family Turnicidae)

55. นกคุ่มอีดเล็ก (Small Buttonquail) *Turnix sylvatica* (Desfontaines, 1787) TURNSY
Type locality:ประเทศแอลจีเรีย *การแพร่กระจาย* : ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียง *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2541);จารูจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

56. นกคุ่มอีดใหญ่ (Yellow-legged Buttonquail) *Turnix tanki* Blyth, 1843 TURNTA
Type locality:รัฐเบงกอล ประเทศอินเดีย *การแพร่กระจาย* : ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก และภาคตะวันออก *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2541);จารูจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

57. นกคุ่มอกลาย (Barred Buttonquail) *Turnix suscitator* (Gmelin,1789) TURNSU
Type locality:เกาะชวา ประเทศอินโดนีเซีย *การแพร่กระจาย* : ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออกและภาคใต้ *อ้างอิงจาก* : จารูจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

อันดับนกหัวขวาน (Order Piciformes)

วงศ์นกพรานผึ้ง (Family Indecatoridae)

58. นกพรานผึ้ง (Malaysian Honeyguide) *Indicator archipelagicus* Temminck, 1832

INDIAR

Type locality: เกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย *การแพร่กระจาย* : ภาคตะวันตก และภาคใต้ *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2541); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

วงศ์นกคอกพิน และนกหัวขวาน (Family Picidae)

59. นกคอกพิน (Eurasian Wryneck) *Jynx torquilla* Linnaeus, 1758 JYNXTO

Type locality: ประเทศสวีเดน *การแพร่กระจาย* : ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก และภาคตะวันออก *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2541); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

60. นกหัวขวานจิวทองลาย (Speckled Piculet) *Picumnus innominatus* Burton, 1836 PICUIN

Type locality: เข็มเขาหิมาลัย *การแพร่กระจาย* : ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันตก *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2541); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

61. นกหัวขวานจิวคิ้วขาว (White-browed Piculet) *Sasia ochracea* Hodgson, 1836 SASIOC

Type locality: ประเทศเนปาล *การแพร่กระจาย* : ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก และภาคใต้ *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2541); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

62. นกหัวขวานจิวอกแดง (Rufous Piculet) *Sasia abnormis* (Temminck) 1825 SASIAB

Type locality: เกาะชวา ประเทศอินโดนีเซีย *การแพร่กระจาย* : ภาคใต้ *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2541); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

63. นกหัวขวานด่างแกระ (Grey-capped Woodpecker) *Dendrocopos canicapillus* (Blyth, 1845)

DENDCAN

Type locality: ทางตอนใต้ประเทศพม่า *การแพร่กระจาย* : ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก และภาคใต้ *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2541); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

64. นกหัวขวานด่างแกระปีกยี่ไต๋ (Sunda Pygmy Woodpecker) *Dendrocopos*

moluccensis (Gmelin, 1788) DENDMO

Type locality:เมืองMalacca ประเทศมาเลเซีย *การแพร่กระจาย* : ภาคใต้ *อ้างอิงจาก* : สยามม
อนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย (2554)

65. นกหัวขวานด่างอกลายจุด (Fulvous-breasted Woodpecker) *Dendrocopos macei* (Vieillot, 1818) DENDMAC

Type locality:รัฐเบงกอล ประเทศอินเดีย *การแพร่กระจาย* : ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันตก *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2541); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

66. นกหัวขวานด่างหัวแดงอกลาย (Stripe-breasted Woodpecker) *Dendrocopos atratus* (Blyth, 1849) DENDAT

Type locality:ที่อกเขาตะนาวศรี ในประเทศพม่า *การแพร่กระจาย* : ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันตก *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2541); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

67. นกหัวขวานด่างหน้าผากเหลือง (Yellow-crowned Woodpecker) *Dendrocopos mahrattensis* (Latham, 1801) DENDMAH

Type locality:รัฐมหาราษฏระ (Maharashtra) ประเทศอินเดีย *การแพร่กระจาย* : ภาคตะวันตก *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2541); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

68. นกหัวขวานด่างท้องน้ำตาลแดง (Rufous-bellied Woodpecker) *Dendrocopos hyperythrus* (Vigors, 1831) DENDHY

Type locality:ที่อกเขาหิมาลัย ประเทศเนปาล *การแพร่กระจาย* : ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก และภาคตะวันออก *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2541); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

69. นกหัวขวานอกแดง (Crimson-breasted Woodpecker) *Dendrocopos cathpharius* (Blyth, 1843) DENDCAT

Type locality:เมืองดาร์จีลิง (Darjeeling) ประเทศอินเดีย *การแพร่กระจาย* : ภาคเหนือ *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2541); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

70. นกหัวขวานสีตาล (Rufous Woodpecker) *Celeus brachyurus* (Vieillot, 1818) CELEBR

Type locality:เกาะชวา ประเทศอินโดนีเซีย **การแพร่กระจาย :**ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออกและภาคใต้ **อ้างอิงจาก :**โอบาส (2541); จารูจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

71. นกหัวขวานหัวเหลือง (Pale-headed Woodpecker) *Gecinulus grantia* (Horsfield, 1840)

GECIGR

Type locality:รัฐอัสสัม ประเทศอินเดีย **การแพร่กระจาย :**ภาคเหนือ **อ้างอิงจาก :**โอบาส (2541); จารูจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

72. นกหัวขวานป่าไผ่ (Bamboo Woodpecker) *Gecinulus viridis* Blyth, 1862 GECIVI

Type locality:เมืองพะโค ประเทศพม่า **การแพร่กระจาย :**ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออกและภาคใต้ **อ้างอิงจาก :**โอบาส (2541); จารูจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

73. นกหัวขวานแดง (Maroon Woodpecker) *Blythipicus rubiginosus* (Swainson, 1837)

BLYTRU

Type locality:ประเทศมาเลเซีย **การแพร่กระจาย :**ภาคตะวันตก และภาคใต้ **อ้างอิงจาก :**โอบาส (2541); จารูจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

74. นกหัวขวานแดงหลังลาย (Bay Woodpecker) *Blythipicus pyrrhotis* (Hodgson, 1837)

BLYTPY

Type locality:ประเทศเนปาล **การแพร่กระจาย :**ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันตก **อ้างอิงจาก :**โอบาส (2541); จารูจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

75. นกหัวขวานแดงลาย (Banded Woodpecker) *Picus mineaceus* Pennant, 1769 PICUMI

Type locality:เกาะชวา ประเทศอินโดนีเซีย **การแพร่กระจาย :**ภาคตะวันตก และภาคใต้ **อ้างอิงจาก :**โอบาส (2541); จารูจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

76. นกหัวขวานใหญ่หงอนเหลือง (Greater Yellownappe) *Picus flavinucha* Gould, 1834

PICUFL

Type locality:เมืองดาร์จีลิง (Darjeeling) ประเทศอินเดีย **การแพร่กระจาย :**ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก และภาคตะวันออก **อ้างอิงจาก :**จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008); โอภาส (2541)

77. นกหัวขวานเล็กหงอนเหลือง (Lesser Yellownape) *Picus chlorolophus* Vieillot, 1818

PICUCH

Type locality:รัฐเบงกอล ประเทศอินเดีย **การแพร่กระจาย :**ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก และภาคตะวันออก **อ้างอิงจาก :**โอภาส (2541);จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

78. นกหัวขวานคอลาย (Checker-throated Woodpecker) *Picus mentalis* Temminck, 1825

PICUME

Type locality:เกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย **การแพร่กระจาย :**ภาคใต้ **อ้างอิงจาก :**โอภาส (2541);จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

79. นกหัวขวานปีกแดง (Crimson-winged Woodpecker) *Picus puniceus* Horsfield, 1821

PICUPU

Type locality:เกาะชวา ประเทศอินโดนีเซีย **การแพร่กระจาย :**ภาคตะวันตก และภาคใต้ **อ้างอิงจาก :**โอภาส (2541);จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

80. นกหัวขวานเขียวคอเขียว (Streak-breasted Woodpecker) *Picus viridanus* Blyth, 1843

PICUVIR

Type locality:ประเทศพม่า **การแพร่กระจาย :**ภาคตะวันตก และภาคใต้ **อ้างอิงจาก :**โอภาส (2541);จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

81. นกหัวขวานเขียวป่าไผ่ (Laced Woodpecker) *Picus vittatus* Vieillot, 1818 **PICUVIT**

Type locality:ด้านตะวันตกของเกาะชวา ประเทศอินโดนีเซีย **การแพร่กระจาย :**ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออกและภาคใต้ **อ้างอิงจาก :**โอภาส (2541);จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

82. นกหัวขวานเขียวท้องลาย (Streak-throated Woodpecker) *Picus xanthopygaeus* (Gray & Gray, 1846) PICUXA

Type locality: ประเทศเนปาล *การแพร่กระจาย* : ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันตก *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2541); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

83. นกหัวขวานเขียวตะโพกแดง (Black-headed Woodpecker) *Picus erythropygius* (Elliot, 1865) PICUER

Type locality: ทางตอนใต้ของประเทศเวียดนาม *การแพร่กระจาย* : ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก และภาคตะวันออก *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2541); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

84. นกหัวขวานเขียวหัวดำ (Grey-headed Woodpecker) *Picus canus* Gmelin, 1788 PICUCA

Type locality: ประเทศนอร์เวย์ *การแพร่กระจาย* : ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออกและภาคใต้ *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2541); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

85. นกหัวขวานใหญ่สีดํา (White-bellied Woodpecker) *Dryocopus javensis* (Horsfield, 1821) DRYOJA

Type locality: เกาะชวา ประเทศอินโดนีเซีย *การแพร่กระจาย* : ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออกและภาคใต้ *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2541); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

86. นกหัวขวานสามนิ้วหลังไฟล (Oliver-backed Woodpecker) *Dinopium rafflesii* (Vigors & Horsfield, 1830) DINORA

Type locality: เกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย *การแพร่กระจาย* : ภาคตะวันตก และภาคใต้ *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2541); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

87. นกหัวขวานสามนิ้วหลังทอง (Common Flameback) *Dinopium javanense* (Ljungh, 1797) DINOJA

Type locality: เกาะชวา ประเทศอินโดนีเซีย *การแพร่กระจาย* : ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออกและภาคใต้ *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2541); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

88. นกหัวขวานสีน้หลังทอง (Greater Flameback) *Chrysocolaptes lucidus* (Scopoli, 1796)
CHRYLU

Type locality: ประเทศอินเดี๋ย *การแพร่กระจาย* : ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออกและภาคใต้ *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2541); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

89. นกหัวขวานหลังสีส้ม (Orange-backed Woodpecker) *Reinwardtipicus validus* (Temminck, 1825)
REINVA

Type locality: เกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย *การแพร่กระจาย* : ภาคใต้ *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2541); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

90. นกหัวขวานลายตะโพกเหลือง (Buff-rumped Woodpecker) *Meiglyptes tristis* (Horsfield, 1821)
MEIGTR

Type locality: เกาะชวา ประเทศอินโดนีเซีย *การแพร่กระจาย* : ภาคตะวันตก และภาคใต้ *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2541); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

91. นกหัวขวานดำท้องดำ (Black-and-Buff Woodpecker) *Meiglyptes jugularis* (Blyth, 1845)
MEIGJU

Type locality: ประเทศพม่า *การแพร่กระจาย* : ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก และภาคตะวันออก *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2541); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

92. นกหัวขวานลายคอแถบขาว (Buff-necked Woodpecker) *Meiglyptes tukki* (Lesson, 1839)
MEIGTU

Type locality: เกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย *การแพร่กระจาย* : ภาคใต้ *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2541); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

93. นกหัวขวานแคะกระจู๋หัวใจ (Heart-spotted Woodpecker) *Hemicircus canente* (Lesson, 1830) TURNSU

*Type locality:*เมืองพะโล ประเทศพม่า *การแพร่กระจาย* :ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออกและภาคใต้ *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2541); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

94. นกหัวขวานแคะอกเทา (Grey-and-Buff Woodpecker) *Hemicircus concretus*(Temminck, 1821) HEMICO

*Type locality:*เกาะชวา ประเทศอินโดนีเซีย *การแพร่กระจาย* :ภาคตะวันตก และภาคใต้ *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2541); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

95. นกหัวขวานใหญ่สีเทา (Great Slaty Woodpecker) *Mulleripicus pulverulentus* (Temminck, 1826) MULLPU

*Type locality:*เกาะชวา ประเทศอินโดนีเซีย *การแพร่กระจาย* :ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออกและภาคใต้ *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2541); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

วงศ์นกโพระดก (Family Megalaimidae)

96. นกโพระดกหนวดแดง (Fire-tufted Barbet) *Psilopogon pyrolophus* Mueller, 1835 PSILPY

*Type locality:*เกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย *การแพร่กระจาย* :ภาคใต้ *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2541); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

97. นกตั้งล้อ (Great Barbet) *Megalaima virens* (Boddaert, 1816) MEGAVI

*Type locality:*ประเทศจีน *การแพร่กระจาย* :ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันตก *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2541); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

98. นกโพระดกขรรธมดา (Lineated Barbet) *Megalaima lineate* (Vieillot, 1816) MEGALI

*Type locality:*เกาะชวา ประเทศอินโดนีเซีย *การแพร่กระจาย* :ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออกและภาคใต้ *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2541); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

99. นกโพพระดกหูเขียว (Green-eared Barbet) *Megalaima faiostriata* (Temminck, 1831)

MEGAFA

Type locality: ทางตอนใต้ของประเทศเวียดนาม *การแพร่กระจาย* : ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก และภาคตะวันออก *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2541); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

100. นกโพพระดกเคราเหลือง (Gold-whiskered Barbet) *Megalaima chrysopogon* (Temminck, 1824) MEGACH

Type locality: ประเทศมาเลเซีย *การแพร่กระจาย* : ภาคตะวันตก และภาคใต้ *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2541); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

101. นกโพพระดกหลากสี (Red-crowned Barbet) *Megalaima rafflesii* (Lesson, 1839)

MEGARA

Type locality: เกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย *การแพร่กระจาย* : ภาคใต้ *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2541); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

102. นกโพพระดกคางแดง (Red-throated Barbet) *Megalaima mystacophanos* (Temminck, 1824)

MEGAMY

Type locality: เกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย *การแพร่กระจาย* : ภาคตะวันตก และภาคใต้ *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2541); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

103. นกโพพระดกคิ้วดำ (Black-browed Barbet) *Megalaima oorti* (Mueller, 1835) MEGA OO

Type locality: เกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย *การแพร่กระจาย* : ภาคใต้ *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2541); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

104. นกโพพระดกคางเหลือง (Golden-throated Barbet) *Megalaima franklinii* (Blyth, 1842)

MEGA FR

Type locality: เมืองดาร์จีลิง (Darjeeling) ประเทศอินเดีย *การแพร่กระจาย* : ภาคเหนือ ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก และภาคใต้ *อ้างอิงจาก* : โอบาส (2541); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

105. นกโพระดกคอสีฟ้า (Blue-throate Barbet) *Megalaima asiatica* (Latham, 1790)

MEGAAS

Type locality: เมืองกัลกัตตา ประเทศอินเดีย *การแพร่กระจาย* : ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก และภาคใต้ *อ้างอิงจาก* : โอบาส (2541); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

106. นกโพระดกคอสีฟ้าเคราดำ (Moustached Barbet) *Megalaima incognita* Hume, 1874

MEGAIN

Type locality: ที่อกเขาตะนาวศรี ประเทศพม่า *การแพร่กระจาย* : ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก และภาคตะวันออก *อ้างอิงจาก* : โอบาส (2541); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

107. นกโพระดกหน้าผากดำ (Blue-eared Barbet) *Megalaima australis* (Horsfield, 1821)

MEGAAU

Type locality: ประเทศออสเตรเลีย *การแพร่กระจาย* : ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออกและภาคใต้ *อ้างอิงจาก* : โอบาส (2541); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

108. โพระดกหัวเหลือง (Yellow-crowned Barbet) *Megalaima henricii* (Temminck, 1831)

MEGAHE

Type locality: เกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย *การแพร่กระจาย* : ภาคใต้ *อ้างอิงจาก* : โอบาส (2541); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

109. นกตีทอง (Coppersmith Barbet) *Megalaima haemacephala* (Mueller, 1776) MEGAHA

Type locality: ประเทศฟิลิปปินส์ *การแพร่กระจาย* : ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออกและภาคใต้ *อ้างอิงจาก* : โอบาส (2541); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

110. นกจอกป่าหัวโต (Brown Barbet) *Calorhamphus fuliginosus* (Temminck, 1830)**CALOFU**

Type locality: ทางตอนใต้ของเกาะบอร์เนียว ประเทศอินโดนีเซีย *การแพร่กระจาย :* ภาคใต้ *อ้างอิงจาก :* โอภาส (2541); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

อันดับนกเงือก (Order Bucerotiformes)**วงศ์นกเงือก (Family Bucerotidae)****111. นกแก๊ก (Oriental Pied Hornbill) *Anthracoceros albirostris* (Shaw & Nodder, 1807) ANTHCE**

Type locality: มาลาบาร์ (Malabar) ปัจจุบันคือรัฐเกรละ (Kerala) ประเทศอินเดีย *การแพร่กระจาย :* ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออกและภาคใต้ *อ้างอิงจาก :* โอภาส (2541); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

112. นกเงือกดำ (Black Hornbill) *Anthracoceros malayanus* (Raffles, 1822) ANTHMA

Type locality: ประเทศมาเลเซีย *การแพร่กระจาย :* ภาคใต้ *อ้างอิงจาก :* โอภาส (2541); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

113. นกเงือกหัวแรด (Rhinoceros Hornbill) *Buceros rhinoceros* Linnaeus, 1758 BUCERH

Type locality: ประเทศมาเลเซีย *การแพร่กระจาย :* ภาคใต้ *อ้างอิงจาก :* โอภาส (2541); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

114. นกกก, นกกาอี้ง (Great Hornbill) *Buceros bicornis* Linnaeus, 1758 BUCEBI

Type locality: เกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย *การแพร่กระจาย :* ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออกและภาคใต้ *อ้างอิงจาก :* โอภาส (2541); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

115. นกขนนหิน (Helmeted Hornbill) *Buceros vigil* (Forster, 1781) BUCEVI

Type locality: เกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย *การแพร่กระจาย :* ภาคตะวันตก และภาคใต้ *อ้างอิงจาก :* โอภาส (2541); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

116. นกเงือกสีน้ำตาล (Brown Hornbill) *Anorrhinus tickelli* (Blyth, 1855) ANORTI
Type locality: ประเทศพม่า *การแพร่กระจาย* : ภาคตะวันตก *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2541); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)
117. นกเงือกสีน้ำตาลคอขาว (Austen's Brown Hornbill) *Anorrhinus austeni* Jerdon, 1872
 ANORAU
Type locality: รัฐอัสสัม ประเทศอินเดีย *การแพร่กระจาย* : ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
อ้างอิงจาก : โอภาส (2541); จารุจินต์ และคณะ (2550)
118. นกเงือกปากดำ (Bushy-crested Hornbill) *Anorrhinus galeritus* (Temminck, 1831)
 ANORGA
Type locality: เกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย *การแพร่กระจาย* : ภาคใต้ *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2541); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)
119. นกเงือกหัวหงอก (White-crowned Hornbill) *Aceros comatus* (Raffles, 1822)
 ACERCOM
Type locality: เกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย *การแพร่กระจาย* : ภาคตะวันตก และภาคใต้
อ้างอิงจาก : โอภาส (2541); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)
120. นกเงือกคอแดง (Rufous-necked Hornbill) *Aceros nipalensis* (Hodgson, 1829) ACESNI
Type locality: ประเทศเนปาล *การแพร่กระจาย* : ภาคเหนือ และภาคตะวันตก *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2541); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)
121. นกเงือกปากย่น (Wrinkled Hornbill) *Aceros corrugatus* (Temminck, 1832) ACERCOR
Type locality: เกาะบอร์เนียว ประเทศอินโดนีเซีย *การแพร่กระจาย* : ภาคใต้ *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2541); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)
122. นกเงือกกรมช้าง, นกกุ๊ก (Wreathed Hornbill) *Aceros undulates* (Shaw, 1811) ACERUN
Type locality: เกาะชวา ประเทศอินโดนีเซีย *การแพร่กระจาย* : ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออกและภาคใต้ *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2541); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

123. นกเงือกกรามข้างปากเรียบ (Plain-pouched Hornbill) *Aceros subruficollis* (Blyth, 1834)

ACERSU

Type locality: ตะนาวศรี ทางตอนใต้ของพม่า *การแพร่กระจาย* : ภาคตะวันตก และภาคใต้

อ้างอิงจาก : โอภาส (2541); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

อันดับนกขุนแผน (Order Trogoniformes)

วงศ์นกขุนแผน (Family Trogonidae)

124. นกขุนแผนท้ายทอยแดง (Red-naped Trogon) *Harpactes kasumba* (Raffles, 1822)

HARPKA

Type locality: เกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย *การแพร่กระจาย* : ภาคใต้ *อ้างอิงจาก* : จารุจินต์

และคณะ (2550); Robson (2008)

125. นกขุนแผนหัวดำ (Diard's Trogon) *Harpactes diardii* (Temminck, 1832) HARPDI

Type locality: เกาะบอร์เนียว ประเทศอินโดนีเซีย *การแพร่กระจาย* : ภาคใต้ *อ้างอิงจาก* : โอภาส

(2541); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008); Pratumthong *et al.* (2007)

126. นกขุนแผนตะโพกสีน้ำตาล (Cinnamon-rumped Trogon) *Harpactes*

orrhophaeus Cabanis & Heine, 1863) HARPOR

Type locality: เกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย *การแพร่กระจาย* : ภาคใต้ *อ้างอิงจาก* : โอภาส

(2541); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

127. นกขุนแผนตะโพกแดง (Scarlet-rumped Trogon) *Harpactes duvaucelii* (Temminck,

1824) HARPDU

Type locality: เกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย *การแพร่กระจาย* : ภาคตะวันตก และภาคใต้

อ้างอิงจาก : โอภาส (2541); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

128. นกขุนแผนอกสีส้ม (Orange-breasted Trogon) *Harpactes oreskios* (Temminck, 1823)

HARPOR

Type locality:เกาะชวา ประเทศอินโดนีเซีย **การแพร่กระจาย** :ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออกและภาคใต้ **อ้างอิงจาก** :โอภาส (2541);จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

129. นกขุนแผนหัวแดง (Red-headed Trogon) *Harpactes erythrocephalus* (Gould, 1834)

HARPER

Type locality:เมืองย่างกุ้ง ประเทศพม่า **การแพร่กระจาย** :ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออกและภาคใต้ **อ้างอิงจาก** :โอภาส (2541);จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

อันดับนกกระรางหัวขวาน (Order Upupiformes)

วงศ์นกกระรางหัวขวาน (Family Upupidae)

130. นกกระรางหัวขวาน (Common Hoopoe) *Upupa epops* Linnaeus, 1758 **UPUPEP**

Type locality:ประเทศสวีเดน **การแพร่กระจาย** :ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออกและภาคใต้ **อ้างอิงจาก** :โอภาส (2542);จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

อันดับ (Order Coraciiformes)

วงศ์นกตะขาบ (Coraciidae)

131. นกตะขาบทุ่ง (Indian Roller) *Coracias benghalensis* (Linnaeus, 1758) **CORABE**

Type locality:รัฐเบงกอล ประเทศอินเดีย **การแพร่กระจาย** :ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออกและภาคใต้ **อ้างอิงจาก** :โอภาส (2542);จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

132. นกตะขาบดง (Dollarbird) *Eurystomus orientalis*(Linnaeus, 1766) **EURYOR**

Type locality:เกาะชวา ประเทศอินโดนีเซีย **การแพร่กระจาย** :ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออกและภาคใต้ **อ้างอิงจาก** :โอภาส (2542);จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

วงศ์นกกะเต็น (Family Alcedinidae/Halcyonidae/Cerylidae)

133. นกกะเต็นเฮอคิวลิส (Blyth's Kingfisher) *Alcedo hercules* Laubmann, 1917 **ALCEHE**

Type locality:ที่เมืองดาร์จีลิง (Darjeeling) รัฐอัสสัม ประเทศอินเดีย **การแพร่กระจาย :**ภาคเหนือ
อ้างอิงจาก :โอภาส (2542); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

134. นกกระเต็นน้อยธรรมดา (Common Kingfisher) *Alcedo atthis*(Linnaeus, 1758) ALCEAT

Type locality:ประเทศอียิปต์ **การแพร่กระจาย :**ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออกและภาคใต้ **อ้างอิงจาก :**โอภาส (2542); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

135. นกกระเต็นน้อยหลังสีน้ำเงิน (Blue-eared Kingfisher) *Alcedo meninting*Horsfield, 1821

ALCEME

Type locality:เกาะชวา ประเทศอินโดนีเซีย **การแพร่กระจาย :**ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออกและภาคใต้ **อ้างอิงจาก :**โอภาส (2542); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

136. นกกระเต็นน้อยแถบอกดำ (Blue-banded Kingfisher) *Alcedo euryzona* Temminck, 1830

ALCEEU

Type locality:เกาะชวา ประเทศอินโดนีเซีย **การแพร่กระจาย :**ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออกและภาคใต้ **อ้างอิงจาก :**โอภาส (2542); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

137. นกกระเต็นน้อยสามนิ้วหลังดำ (Black-backed Kingfisher) *Ceyx erithacus*(Linnaeus,

1758)CEYXER

Type locality:รัฐเบงกอล ประเทศอินโดนีเซีย **การแพร่กระจาย :**ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคตะวันออกและภาคใต้ **อ้างอิงจาก :**โอภาส (2542); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

138. นกกระเต็นน้อยสามนิ้วหลังแดง (Rufous-backed Kingfisher) *Ceyx rufidorsa*Strickland,

1847 CORABE

Type locality:ประเทศมาเลเซีย **การแพร่กระจาย :**ภาคใต้ **อ้างอิงจาก :**โอภาส (2542); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

139. นกกระเต็นใหญ่ปีกสีน้ำตาล (Brown-winged Kingfisher) *Halcyon amauroptera* (Pearson, 1841) HALCAM

Type locality: ประเทศอินเดีย *การแพร่กระจาย* : ภาคใต้ *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2542); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

140. นกกระเต็นใหญ่ชรรวมตา, นกกำกวม (Stork-billed Kingfisher) *Halcyon capensis* (Linnaeus, 1766) HALCCA

Type locality: แหลมกู๊ดโฮป (Cape of Good Hope) ประเทศแอฟริกาใต้ *การแพร่กระจาย* : ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออกและภาคใต้ *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2542); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

141. นกกระเต็นแดง (Ruddy Kingfisher) *Halcyon coromanda* (Latham, 1790) HALCCO

Type locality: ชายฝั่งทะเล Coromandel ประเทศอินเดีย *การแพร่กระจาย* : ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคตะวันออกและภาคใต้ *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2542); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

142. นกกระเต็นอกขาว (White-throated Kingfisher) *Halcyon smyrnensis* (Linnaeus, 1758) HALCSM

Type locality: เมือง Smyrna (Izmir) ประเทศตุรกี *การแพร่กระจาย* : ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออกและภาคใต้ *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2542); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

143. นกกระเต็นหัวดำ (Black-capped Kingfisher) *Halcyon pileata* (Boddaert, 1783) HALCPI

Type locality: ประเทศจีน *การแพร่กระจาย* : ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออกและภาคใต้ *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2542); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

144. นกกระเต็นขาวดำใหญ่ (Crested Kingfisher) *Megaceryle lugubris* (Temminck, 1834) MEGALU

Type locality:ประเทศไทยญี่ปุ่น **การแพร่กระจาย :**ภาคเหนือ และ ภาคตะวันตก **อ้างอิงจาก :**โอบาส (2542); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

145. นกกระเต็นปีกหลัก (Pied Kingfisher) *Ceryle rudis*(Linnaeus, 1758) CERYRU

Type locality:ประเทศอียิปต์ **การแพร่กระจาย :**ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ **อ้างอิงจาก :**โอบาส (2542); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

146. นกกินเปี้ยว (Collared Kingfisher) *Todiramphus chloris*(Boddaert, 1783) TODICH

Type locality:เกาะบुरु(Buru) หมู่เกาะโมลุกกะ ประเทศอินโดนีเซีย **การแพร่กระจาย :**ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ **อ้างอิงจาก :**โอบาส (2542); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

147. นกกระเต็นลาย (Banded Kingfisher) *Lacedo pulchella*(Horsfield, 1821) LACEPU

Type locality:เกาะชวา ประเทศอินโดนีเซีย **การแพร่กระจาย :**ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ **อ้างอิงจาก :**โอบาส (2542); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

148. นกกระเต็นสร้อยคอสีน้ำตาล (Rufous-collared Kingfisher) *Actenoides*

concretus(Temminck, 1825) ACTECO

Type locality:ประเทศอินโดนีเซีย **การแพร่กระจาย :**ภาคตะวันตก และภาคใต้ **อ้างอิงจาก :**โอบาส (2542); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

วงศ์นกจาบคา (Family Meropidae)

149. นกจาบคาเคราแดง (Red-bearded Bee-eater) *Nyctornis amictus* (Temminck, 1824)

NYCTAM

Type locality:เกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย **การแพร่กระจาย :**ภาคตะวันตก และภาคใต้ **อ้างอิงจาก :**โอบาส (2542); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

150. นกจาบคาเคราน้ำเงิน (Blue-bearded Bee-eater) *Nyctornis athertoni* (Jardine & Selby, 1830) NYCTAT

Type locality:ทางตอนใต้ประเทศอินเดีย **การแพร่กระจาย :**ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก และภาคตะวันออก **อ้างอิงจาก :**โอภาส (2542);จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

151. นกจาบคาเล็ก (Green Bee-eater) *Merops orientalis* Latham, 1801 MEROOR

Type locality:ประเทศอินเดีย **การแพร่กระจาย :**ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก และภาคตะวันออก **อ้างอิงจาก :**โอภาส (2542);จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

152. นกจาบคาคอสีฟ้า (Blue-throated Bee-eater) *Merops viridis* Linnaeus, 1758 MEROVI

Type locality:เกาะชวา ประเทศอินโดนีเซีย **การแพร่กระจาย :**ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ **อ้างอิงจาก :**โอภาส (2542);จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

153. นกจาบคาหัวเขียว (Blue-tailed Bee-eater) *Merops philippinus* Linnaeus, 1766

MEROPH

Type locality:ประเทศฟิลิปปินส์ **การแพร่กระจาย :**ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ **อ้างอิงจาก :**โอภาส (2542);จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

154. นกจาบคาหัวสีส้ม (Chestnut-headed Bee-eater) *Merops leschenaultia* Vieillot, 1817

MEROLE

Type locality:ประเทศศรีลังกา **การแพร่กระจาย :**ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ **อ้างอิงจาก :**โอภาส (2542);จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

อันดับนกคัตถุ (Order Cuculiformes)

วงศ์นกคัตถุ (Family Cuculidae)

155. นกคัตถุหงอน (Chestnut-winged Cuckoo) *Clamator coromandus* (Linnaeus, 1766)

CLAMCO

Type locality:ชายฝั่งทะเลโคโรแมนเดล (Coromandel) ประเทศอินเดีย **การแพร่กระจาย :**ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก และภาคใต้ **อ้างอิงจาก :**โอภาส (2542);จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

156. นกคัตคูขาวดำ, นกคัตคูดำ (Pied Cuckoo) *Clamator jacobinus* (Boddaert, 1783)

CLAMJA

Type locality: ชายฝั่งทะเลโคโรแมนเดล (Coromandel) ประเทศอินเดีย *การแพร่กระจาย*: ภาคกลาง *อ้างอิงจาก*: โอภาส (2542); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

157. นกคัตคูพันธุ์อินเดีย (Indian Cuckoo) *Cuculus micropterus* Gould, 1837 CUCUMI

Type locality: ที่อกเขาหิมาลัย ประเทศเนปาล *การแพร่กระจาย*: ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก และภาคใต้ *อ้างอิงจาก*: โอภาส (2542); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

158. นกคัตคูพันธุ์ยุโรป (Eurasian Cuckoo) *Cuculus canorus* Linnaeus, 1758 CUCUCA

Type locality: ประเทศสวีเดน *การแพร่กระจาย*: ภาคเหนือ *อ้างอิงจาก*: โอภาส (2542); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

159. นกคัตคูพันธุ์หิมาลัย (Oriental Cuckoo) *Cuculus saturatus* Blyth, 1843 CUCUSA

Type locality: ที่อกเขาหิมาลัย *การแพร่กระจาย*: ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ *อ้างอิงจาก*: โอภาส (2542); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

160. นกคัตคูเล็ก (Lesser Cuckoo) *Cuculus poliocephalus* Latham, 1790 CUCUPO

Type locality: ประเทศอินเดีย *การแพร่กระจาย*: ภาคเหนือ *อ้างอิงจาก*: โอภาส (2542); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

161. นกคัตคูเหยี่ยวใหญ่ (Large Hawk Cuckoo) *Hierococcyx sparveroides* (Vigors, 1832)

HIERSP

Type locality: ที่อกเขาหิมาลัย *การแพร่กระจาย*: ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ *อ้างอิงจาก*: โอภาส (2542); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

162. นกคัตคูเหยี่ยวพันธุ์อินเดีย (Common Hawk Cuckoo) *Hierococcyx varius* (Vahl, 1797)

HIERVA

Type locality: ประเทศอินเดีย *การแพร่กระจาย*: ภาคตะวันตก *อ้างอิงจาก*: โอภาส (2542); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

163. นกคัตคูเหี้ยวเล็ก (Moustached hawk Cuckoo) *Hierocoocyx vagans* (Mueller, 1845)

HIERVA

Type locality: เกาะชวา ประเทศอินโดนีเซีย *การแพร่กระจาย* : ภาคตะวันตก ภาคตะวันออกและภาคใต้ *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2542); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

164. นกคัตคูเหี้ยวมลายู (Malaysian Hawk Cuckoo) *Hierocoocyx fugax* Horsfield, 1821

HIERFU

Type locality: เกาะชวา ประเทศอินโดนีเซีย *การแพร่กระจาย* : ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออกและภาคใต้ *อ้างอิงจาก* : จารุจินต์ และคณะ (2550)

165. นกคัตคูเหี้ยวอกแดง (Hodgson's Hawk Cuckoo) *Hierocoocyx nisicolor* Blyth, 1843

HIERNI

Type locality: เกาะชวา ประเทศอินโดนีเซีย *การแพร่กระจาย* : ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคตะวันออกและภาคใต้ *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2542); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

166. นกคัตคูแซงแซว (Drongo Cuckoo) *Surniculus lugubris* (Horsfield, 1821)

SURNLU

Type locality: เกาะชวา ประเทศอินโดนีเซีย *การแพร่กระจาย* : ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคตะวันออกและภาคใต้ *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2542); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

167. นกคัตคูลาย (Banded Bay Cuckoo) *Cacomantis sonneratii* (Latham, 1790)

CACOSO

Type locality: ประเทศอินเดีย *การแพร่กระจาย* : ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออกและภาคใต้ *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2542); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

168. นกอีวาบตั๊กแตน (Plaintive Cuckoo) *Cacomantis merulinus* (Scopoli, 1786)

CACOME

Type locality: ประเทศฟิลิปปินส์ *การแพร่กระจาย* : ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออกและภาคใต้ *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2542); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

169. นกคัตคูหางแพน (Rusty-breasted Cuckoo) *Cacomantis sepulcralis* Mueller, 1843

CACOSE

Type locality: เกาะชวา ประเทศอินโดนีเซีย *การแพร่กระจาย* : ภาคตะวันตก และภาคใต้

อ้างอิงจาก : โอภาส (2542); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

170. นกคัตคูสีทองแดง (Little Bronze Cuckoo) *Chrysococcyx minutillus* Gould, 1859

CHRYMI

Type locality: ประเทศมาเลเซีย *การแพร่กระจาย* : ภาคใต้ *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2542); จารุจินต์

และคณะ (2550); Robson (2008)

171. นกคัตคูมรกต (Asian Emerald Cuckoo) *Chrysococcyx maculates* (Gmelin, 1788)

CHRYMA

Type locality: เมืองพะโค ประเทศพม่า *การแพร่กระจาย* : ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาค

ตะวันออกและภาคใต้ *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2542); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

172. นกคัตคูสีม่วง (Violet Cuckoo) *Chrysococcyx xanthorhynchus* (Horsfield, 1821)

CHRYXA

Type locality: เกาะชวา ประเทศอินโดนีเซีย *การแพร่กระจาย* : ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก

ภาคตะวันออกและภาคใต้ *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2542); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

173. นกบั้งรอกเล็กท้องเทา (Black-bellied Malkoha) *Phaenicophaeus diardi* (Lesson, 1830)

PHAEDI

Type locality: เกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย *การแพร่กระจาย* : ภาคใต้ *อ้างอิงจาก* : โอภาส

(2542); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

174. นกบั้งรอกเล็กท้องแดง (Chestnut-bellied Malkoha) *Phaenicophaeus sumatranus*

(Raffles, 1822) PHAESU

Type locality: เกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย *การแพร่กระจาย* : ภาคตะวันตก และภาคใต้

อ้างอิงจาก : โอภาส (2542); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

175. นกบั้งรอกใหญ่ (Green-billed Malkoha) *Phaenicophaeus tristis* (Lesson, 1830) PHAETR

Type locality: รัฐเบงกอล ประเทศอินเดีย *การแพร่กระจาย* : ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออกและภาคใต้ *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2542); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

176. นกบั้งรอกแดง (Raffles' Malkoha) *Phaenicophaeus chlorophaeus* (Raffles, 1822)

PHAECH

Type locality: เกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย *การแพร่กระจาย* : ภาคตะวันตก และภาคใต้ *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2542); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

177. นกบั้งรอกปากแดง (Red-billed Malkoha) *Phaenicophaeus javanicus* Horsfield, 1821

PHAEJA

Type locality: เกาะชวา ประเทศอินโดนีเซีย *การแพร่กระจาย* : ภาคตะวันตก และภาคใต้ *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2542); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

178. นกบั้งรอกเขียวอกแดง (Chestnut-breasted Malkoha) *Phaenicophaeus curvirostris* (Shaw, 1810) PHAECU

Type locality: เกาะชวา ประเทศอินโดนีเซีย *การแพร่กระจาย* : ภาคตะวันตก และภาคใต้ *อ้างอิงจาก* : จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008); โอภาส (2542)

179. นกกาเหว่า (Asian Koel) *Eudynamys scolopacea* (Linnaeus, 1758) EUDYSC

Type locality: ชายฝั่ง Malabar ประเทศอินเดีย *การแพร่กระจาย* : ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออกและภาคใต้ *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2542); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

180. นกโกโรโกโส (Coral-billed Ground Cuckoo) *Carpococcyx renauldi* Oustalet, 1896

CARPRE

Type locality: ประเทศเวียดนาม *การแพร่กระจาย* : ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2542); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

วงศ์นกกะปูด (Family Centropodidae)

181. นกกระจู๋ตีนสั้น (Short-toed Coucal) *Centropus rectunguis* Strickland, 1847 CENTRE

Type locality: เกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย *การแพร่กระจาย :* ภาคใต้ *อ้างอิงจาก :* โอภาส (2542); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

182. นกกระจู๋ใหญ่ (Greater Coucal) *Centopus sinensis* (Stephens, 1815) CENTSI

Type locality: ประเทศจีน *การแพร่กระจาย :* ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออกและภาคใต้ *อ้างอิงจาก :* โอภาส (2542); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

183. นกกระจู๋เล็ก (Lesser Coucal) *Centropus bengalensis* (Gmelin, 1788) CENTRO

Type locality: รัฐเบงกอล ประเทศอินเดีย *การแพร่กระจาย :* ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออกและภาคใต้ *อ้างอิงจาก :* โอภาส (2542); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

อันดับนกแก้ว (Order Psittaciformes)

วงศ์นกแก้วและนกหูก (Family Psittacidae)

184. นกหูกใหญ่ (Blue-rumped Parrot) *Psittinus cyanurus* (Forster, 1795) PSITCY

Type locality: ประเทศมาเลเซีย *การแพร่กระจาย :* ภาคตะวันตก และภาคใต้ *อ้างอิงจาก :* โอภาส (2542); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

185. นกหูกเล็กปากแดง (Vernal Hanging Parrot) *Loriculus vernalis* (Sparrman, 1787)

LORIVE

Type locality: รัฐอัสสัม ประเทศอินเดีย *การแพร่กระจาย :* ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออกและภาคใต้ *อ้างอิงจาก :* โอภาส (2542); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

186. นกหูกเล็กปากดำ (Blue-crowned Hanging Parrot) *Loriculus galgulus* (Linnaeus, 1758)

LORIGA

Type locality: ประเทศมาเลเซีย *การแพร่กระจาย :* ภาคใต้ *อ้างอิงจาก :* โอภาส (2542); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

187. นกแก้วคอแหวนสีกุหลาบ (Rose-ringed Parakeet) *Psittacula krameri*(Scopoli, 1769)

PSITKR

Type locality: ประเทศเซเนกัล (Senegal) *การแพร่กระจาย* : ภาคกลาง *อ้างอิงจาก* : จารุจินต์ และคณะ (2550)

188. นกแก้วโม่ง (Alexandrine Parakeet) *Psittacula eupatria* (Linnaeus, 1766) PSITEU

Type locality: ประเทศอินเดีย *การแพร่กระจาย* : ภาคเหนือ ภาคตะวันตก และภาคกลาง

อ้างอิงจาก : โอภาส (2542); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

189. นกกะลิง (Grey-headed Parakeet) *Psittacula finschii* (Hume, 1874) PSITFI

Type locality: คุ่มน้ำสาละวินตอนบน ประเทศพม่า *การแพร่กระจาย* : ภาคเหนือ และ ภาคตะวันตก

อ้างอิงจาก : จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008); โอภาส (2542)

190. นกแก้วหัวแพร (Blossom-headed Parakeet) *Psittacula roseata* Biswas, 1951 PSITRO

Type locality: รัฐอัสสัม ประเทศอินเดีย *การแพร่กระจาย* : ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันตก *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2542); จารุจินต์ และคณะ (2550);

Robson (2008)

191. นกแขกเต้า (Red-breasted Parakeet) *Psittacula alexandri* (Linnaeus, 1758) PSITAL

Type locality: เกาะชวา ประเทศอินโดนีเซีย *การแพร่กระจาย* : ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันตก *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2542); จารุจินต์ และคณะ (2550);

Robson (2008)

อันดับนกแอ่น (Order Apodiformes)

วงศ์นกแอ่น (Family Apodidae)

192. นกแอ่นท้องขาว (Glossy Swiftlet) *Collocalia esculenta* (Linnaeus, 1758) COLLES

Type locality: เกาะแอมบอยนา ประเทศอินโดนีเซีย *การแพร่กระจาย* : ภาคใต้ *อ้างอิงจาก* : โอภาส

(2542); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

193. นกแอ่นพันธุ์หิมาลัย (Himalayan Swiftlet) *Collocalia brevirostris* (Horsfield, 1840)

COLLBR

Type locality: รัฐอัสสัม ประเทศอินเดีย *การแพร่กระจาย* : ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก และภาคใต้ *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2542); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

194. นกแอ่นหางสีเหลือง, นกแอ่นรังดำ (Black-nest Swiftlet) *Collocalia maxima* Hume, 1878 COLLMA

Type locality: ตะนาวศรี ประเทศพม่า *การแพร่กระจาย* : ภาคใต้ *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2542); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

195. นกแอ่นกินรัง (Germain's Swiftlet) *Collocalia germani* Oustalet, 1878 COLLGE

Type locality: เกาะคอนซอน ประเทศเวียดนาม *การแพร่กระจาย* : ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2542); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

196. นกแอ่นตาล (Asian Palm Swift) *Cypsiurus balasinensis* (Gray, 1829) CYPSPA

Type locality: รัฐเบงกอล ประเทศอินเดีย *การแพร่กระจาย* : ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2542); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

197. นกแอ่นเล็กหางหนามตะโพกขาว (Silver-rumped Needletail) *Rhaphidura leucopygialis* (Blyth, 1849) RHAPLE

Type locality: เกาะปีนัง ประเทศมาเลเซีย *การแพร่กระจาย* : ภาคใต้ *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2542); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

198. นกแอ่นใหญ่คอขาว (White-throated Needletail) *Hirundapus caudacutus* (Latham, 1802) HIRUCA

Type locality: ประเทศออสเตรเลีย *การแพร่กระจาย* : ภาคเหนือ ภาคกลาง และ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ *อ้างอิงจาก* : จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008); โอภาส (2542)

199. นกแอ่นใหญ่หัวดำ (Silver-backed Needletail) *Hirundapus cochinchinensis* (Oustalet, 1878) HIRUCO

Type locality: ตอนใต้ของประเทศเวียดนาม *การแพร่กระจาย* : ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก และภาคตะวันออก *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2542); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

200. นกแอ่นใหญ่หัวตาขาว (Brown-backed Needletail) *Hirundapus giganteus* (Temminck, 1825) HIRUGI

Type locality: เมืองบันทาม (Bantam) เกาะชวา ประเทศอินโดนีเซีย *การแพร่กระจาย* : ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออกและภาคใต้ *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2542); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

201. นกแอ่นตะโพกขาวหางแฉก (Fork-tailed Swift) *Apus pacificus* (Latham, 1802) APUSPA

Type locality: เมืองนิวซอลต์แลนด์ รัฐนิวเซาท์เวล ประเทศออสเตรเลีย *การแพร่กระจาย* : ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออกและภาคใต้ *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2542); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

202. นกแอ่นท้องลาย (Dark-rumped Swift) *Apus acuticauda* (Jerdon, 1864) APUSAC

Type locality: ประเทศเนปาล *การแพร่กระจาย* : ภาคเหนือ *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2542); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

203. นกแอ่นบ้าน (House Swift) *Apus affinis* (Gray, 1830) APUSAF

Type locality: ประเทศอินเดีย *การแพร่กระจาย* : ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออกและภาคใต้ *อ้างอิงจาก* : จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008); โอภาส (2542)

วงศ์นกแอ่นฟ้า (Family Hemiprocnidae)

204. นกแอ่นฟ้าหงอน (Crested Treeswift) *Hemiproctne coronata* (Tickell, 1833) HEMICO

Type locality: เมืองไบฮาร์ (Bihar) ประเทศอินเดีย *การแพร่กระจาย* : ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันตก *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2542); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

205. นกแอ่นฟ้าตะโพกเทา (Grey-rumped Treeswift) *Hemiprocne longipennis* (Rafinesque, 1802) HEMILO

Type locality: เกาะชวา ประเทศอินโดนีเซีย *การแพร่กระจาย:* ภาคตะวันตก และภาคใต้

อ้างอิงจาก: โอภาส (2542); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

206. นกแอ่นฟ้าเคราขาว (Whiskered Treeswift) *Hemiprocne comata* (Temminck, 1824) HEMICO

Type locality: เกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย *การแพร่กระจาย:* ภาคตะวันตก และภาคใต้

อ้างอิงจาก: โอภาส (2542); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

อันดับนกเค้า (Order Strigiformes)

วงศ์นกแสก (Family Tytonidae)

207. นกแสก (Barn Owl) *Tyto alba* (Scopoli, 1769) TYTOAL

Type locality: ทางตอนเหนือของประเทศอิตาลี *การแพร่กระจาย:* ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออกและภาคใต้ *อ้างอิงจาก:* โอภาส (2542); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

208. นกแสกทุ่งหญ้า (Grass Owl) *Tyto capensis* (A. Smith, 1834) TYTOCA

Type locality: เคปทาวน์ ประเทศแอฟริกาใต้ (Cape Town, South Africa) *การแพร่กระจาย:*

ภาคเหนือ *อ้างอิงจาก:* จารุจินต์ และคณะ (2550)

209. นกแสกแดง (Oriental Bay Owl) *Phodilus badius* (Horsfield, 1821) PHODBA

Type locality: เกาะชวา ประเทศอินโดนีเซีย *การแพร่กระจาย:* ภาคเหนือ ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออกและภาคใต้ *อ้างอิงจาก:* โอภาส (2542); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

วงศ์นกเค้า (Family Strigidae)

210. นกเค้าแมวมหูสั้น (Short-eared) *Asio flammeus* (Pontoppidan, 1763) ASIOFL

Type locality: ประเทศสวีเดน **การแพร่กระจาย :**ภาคเหนือ และภาคกลาง **อ้างอิงจาก :**โอภาส (2542); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

211. นกเค้าเหยี่ยว (Brown Hawk Owl) *Ninox scutulata* (Raffles, 1822) NINOSC

Type locality: เกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย **การแพร่กระจาย :**ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออกและภาคใต้ **อ้างอิงจาก :**โอภาส (2542); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

212. นกเค้าหน้าผากขาว (White-fronted Scops Owl) *Otus sagittatus* (Cassin, 1848) OTUSSA

Type locality: ประเทศมาเลเซีย **การแพร่กระจาย :**ภาคตะวันตก และภาคใต้ **อ้างอิงจาก :**โอภาส (2542); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

213. นกเค้าแดง (Reddish Scops Owl) *Otus rufescens* (Horsfield, 1821) OTUSRU

Type locality: ประเทศอินโดนีเซีย **การแพร่กระจาย :**ภาคใต้ **อ้างอิงจาก :**โอภาส (2542); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

214. นกเค้าภูเขา (Mountain Scops Owl) *Otus spilocephalus* (Blyth, 1846) OTUSSP

Type locality: เมืองคาร์จีลิง (Darjeeling) รัฐอัสสัม ประเทศอินเดีย **การแพร่กระจาย :**ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออกและภาคใต้ **อ้างอิงจาก :**โอภาส (2542); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

215. นกเค้าหูยาวเล็ก (Oriental Scops Owl) *Otus sunia* (Hodgson, 1836) OTUSSU

Type locality: ประเทศเนปาล **การแพร่กระจาย :**ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออกและภาคใต้ **อ้างอิงจาก :**โอภาส (2542); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

216. นกเค้ากู่, นกฮูก (Collared Scops Owl) *Otus bakkamoena* Pennant, 1769 OTUSBA

Type locality: ประเทศศรีลังกา **การแพร่กระจาย :**ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออกและภาคใต้ **อ้างอิงจาก :**โอภาส (2542); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

217. นกเค้าใหญ่พันธุ์เนปาล (Spot-bellied Eagle Owl) *Bubo nipalensis* Hodgson, 1836

BUBONI

Type locality: ประเทศเนปาล *การแพร่กระจาย:* ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก และภาคตะวันออก *อ้างอิงจาก:* โอภาส (2542); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

218. นกเค้าใหญ่พันธุ์สุมาตรา (Barred Eagle Owl) *Bubo sumatranus* (Raffles, 1822) **BUBOSU**

Type locality: เกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย *การแพร่กระจาย:* ภาคตะวันตก และภาคใต้ *อ้างอิงจาก:* โอภาส (2542); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

219. นกเค้าใหญ่สีคล้ำ (Dusky Eagle Owl) *Bubo coromandus* (Latham, 1790) **BUBOCO**

Type locality: ชายฝั่ง Coromandel รัฐอัสสัม ประเทศอินเดีย *การแพร่กระจาย:* ภาคใต้ *อ้างอิงจาก:* โอภาส (2542); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

220. นกทืดทื่อพันธุ์เหนือ (Brown Fish Owl) *Ketupa zeylonensis* (Gmelin, 1788) **KETUZE**

Type locality: ประเทศศรีลังกา *การแพร่กระจาย:* ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตกและภาคใต้ *อ้างอิงจาก:* โอภาส (2542); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

221. นกทืดทื่อพันธุ์มลายู (Buffy Fish Owl) *Ketupa ketupu* (Horsfield, 1821) **KETUKE**

Type locality: เกาะชวา ประเทศอินโดนีเซีย *การแพร่กระจาย:* ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออกและภาคใต้ *อ้างอิงจาก:* โอภาส (2542); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

222. นกเค้าป่าหลังจุด (Spotted Wood Owl) *Strix seloputo* Horsfield, 1878 **STRISE**

Type locality: เกาะชวา ประเทศอินโดนีเซีย *การแพร่กระจาย:* ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ *อ้างอิงจาก:* โอภาส (2542); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

223. นกเค้าป่าสีน้ำตาล (Brown Wood owl) *Strix leptogrammica* Temminck, 1831 **STRILE**

Type locality: ทางตอนใต้เกาะบอร์เนียว ประเทศอินโดนีเซีย *การแพร่กระจาย:* ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออกและภาคใต้ *อ้างอิงจาก:* โอภาส (2542); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

224. นกเค้าแตร (Collared Owlet) *Glaucidium brodiei* (Burton, 1836) **GLAUBR**

Type locality: ที่เมืองสิมลา (Simla) รัฐปัญจาบ ประเทศอินเดีย *การแพร่กระจาย:* ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออกและภาคใต้ *อ้างอิงจาก:* โอภาส (2542); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

225. นกเค้าโมง, นกเค้าแมว (Asian Barred Owlet) *Glaucidium cuculoides* (Vigors, 1831) **GLAUBR**

Type locality: เทือกเขาหิมาลัย *การแพร่กระจาย:* ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก และภาคตะวันออก *อ้างอิงจาก:* โอภาส (2542); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

226. นกเค้าจุด (Spotted Owlet) *Athene brama* (Temminck, 1821) **ATHEBR**

Type locality: เมือง Pondicherry ประเทศอินเดีย *การแพร่กระจาย:* ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก และภาคตะวันออก *อ้างอิงจาก:* โอภาส (2542); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

วงศ์นกปากกบ (Family Batrachostomidae)

227. นกปากกบยักษ์ (large Frogmouth) *Batrachostomus auritus* (Gray, 1829) **BATRAU**

Type locality: เกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย *การแพร่กระจาย:* ภาคใต้ *อ้างอิงจาก:* โอภาส (2542); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

228. นกปากกบลายดำ (Hodgson's Frogmouth) *Batrachostomus hodgsoni* (Gray, 1859)

BATRHO

Type locality: เมืองคาร์จีลิง รัฐอัสสัม ประเทศอินเดีย *การแพร่กระจาย:* ภาคเหนือ *อ้างอิงจาก:* โอภาส (2542); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

229. นกปากกบปักขี้ไต้ (Gould's Frogmouth) *Batrachostomus stellatus* (Gould, 1837)

BATRST

Type locality: ประเทศมาเลเซีย *การแพร่กระจาย:* ภาคใต้ *อ้างอิงจาก:* โอภาส (2542); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

230. นกปากกบพินธุ์ชวา (Javan Frogmouth) *Batrachostomus javensis* (Hosfield, 1821)

BATRJA

Type locality: เกาะชวา ประเทศอินโดนีเซีย *การแพร่กระจาย:* ภาคเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ *อ้างอิงจาก:* โอภาส (2542); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

วงศ์นกตบยุงยักษ์ (Family Eurostopodidae/Caprimulgidae)

231. นกตบยุงยักษ์ (Great Eared Nightjar) *Eurostopodus macrotis* (Vigors, 1831)

EUROMA

Type locality: ประเทศฟิลิปปินส์ *การแพร่กระจาย:* ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ *อ้างอิงจาก:* โอภาส (2542); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

232. นกตบยุงพินธุ์มลายู (Malaysian Eared Nightjar) *Eurostopodus temminckii* (Gould, 1838)

EUROTE

Type locality: ประเทศมาเลเซีย *การแพร่กระจาย:* ภาคใต้ *อ้างอิงจาก:* โอภาส (2542); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

233. นกตบยุงภูเขา (Grey Nightjar) *Caprimulgus indicus* Latham, 1790 **CAPRIN**

Type locality: ประเทศอินเดีย *การแพร่กระจาย:* ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก และภาคใต้ *อ้างอิงจาก:* จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008); โอภาส (2542)

234. นกตบยุงหางยาว (large-tailed Nightjar) *Caprimulgus marurus* Horsfield, 1821

CAPRMA

Type locality: เกาะชวา ประเทศอินโดนีเซีย *การแพร่กระจาย:* ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ *อ้างอิงจาก:* โอภาส (2542); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

235. นกตบยุงเล็ก (Indian Nightjar) *Caprimulgus asiaticus* Latham, 1790 **CAPRAS**

Type locality: เมืองบอมเบย์ ประเทศอินเดีย *การแพร่กระจาย:* ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ *อ้างอิงจาก:* โอภาส (2542); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

236. นกตบยุงป่าโลก (Savana Nightjar) *Caprimulgus affinis* Horsfield, 1821 CAPRAF

Type locality: เกาะชวา ประเทศอินโดนีเซีย *การแพร่กระจาย:* ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก และภาคตะวันออก *อ้างอิงจาก:* โอภาส (2542); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

อันดับนกพิราบ (Order Columbiformes)

วงศ์นกพิราบ และนกเขา (Family Columbidae)

237. นกพิราบป่า (Rock Pigeon) *Columba livia* Gmelin, 1789 COLULI

Type locality: ทางตอนใต้ทวีปยุโรป *การแพร่กระจาย:* ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออกและภาคใต้ *อ้างอิงจาก:* โอภาส (2542); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

238. นกพิราบป่าอกลาย (Speckled Wood Pigeon) *Columba hodgsonii* Vigors, 1832 COLUHO

Type locality: ประเทศเนปาล *การแพร่กระจาย:* ภาคเหนือ *อ้างอิงจาก:* จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008); โอภาส (2542)

239. นกพิราบเขาสอง (Ashy Wood Pigeon) *Columba pulchricollis* Blyth, 1846 COLUPUL

Type locality: ประเทศเนปาล *การแพร่กระจาย:* ภาคเหนือ *อ้างอิงจาก:* โอภาส (2542); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

240. นกลุมพู่แดง (Pale-capped Pigeon) *Columba punicea* Blyth, 1842 COLUPUN

Type locality: ประเทศอินเดีย *การแพร่กระจาย:* ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคตะวันออกและภาคใต้ *อ้างอิงจาก:* โอภาส (2542); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

241. นกขาปีไหน (Nicobar Pigeon) *Caloenas nicobarica* (Linnaeus, 1758) CALONI

Type locality: หมู่เกาะนิโคบาร์ มหาสมุทรอินเดีย *การแพร่กระจาย:* ภาคใต้ *อ้างอิงจาก:* โอภาส (2542); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

242. นกเขาพม่า (Oriental Turtle Dove) *Streptopelia orientalis* (Latham, 1790) STREOR

Type locality: เมืองLhasa ประเทศทิเบต **การแพร่กระจาย :**ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันตก **อ้างอิงจาก :**โอภาส (2542); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

243. นกเขาใหญ่ (Spotted Dove) *Streptopelia chinensis* (Scopoli, 1786) STRECH

Type locality: ประเทศจีน **การแพร่กระจาย :**ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออกและภาคใต้ **อ้างอิงจาก :**โอภาส (2542); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

244. นกเขาไฟ (Red Collared Dove) *Streptopelia tranquebarica* (Hermann, 1804)

STRETR

Type locality: Tranquebaria ประเทศอินเดีย **การแพร่กระจาย :**ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก และภาคตะวันออก **อ้างอิงจาก :**โอภาส (2542); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

245. นกเขาขาว (Peaceful Dove) *Geopelia striata* (Linnaeus, 1766) GEOPST

Type locality: เกาะชวา ประเทศอินโดนีเซีย **การแพร่กระจาย :**ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออกและภาคใต้ **อ้างอิงจาก :**โอภาส (2542); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

246. นกเขาลายใหญ่ (Barred Cuckoo Dove) *Macropygia unchall* (Wagler, 1827) MACRUN

Type locality: เกาะชวา ประเทศอินโดนีเซีย **การแพร่กระจาย :**ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก และภาคตะวันออก **อ้างอิงจาก :**โอภาส (2542); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

247. นกเขาลายเล็ก (Little Cuckoo Dove) *Macropygia ruficeps* (Temminck, 1834) MACRRU

Type locality: เกาะชวา ประเทศอินโดนีเซีย **การแพร่กระจาย :**ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันตก **อ้างอิงจาก :**โอภาส (2542); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

248. นกเปล้าแดง (Cinnamon-headed Green Pigeon) *Treron fulvicollis* (Wagler, 1827)

TRERFU

Type locality: เกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย **การแพร่กระจาย :** ภาคใต้ **อ้างอิงจาก :** โอภาส (2542); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

249. นกเปล้าเล็กหัวเทา (Little Green Pigeon) *Treron olax* (Temminck, 1823) TREROL

Type locality: เกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย **การแพร่กระจาย :** ภาคใต้ **อ้างอิงจาก :** โอภาส (2542); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

250. นกเปล้าคอสีม่วง (Pink-necked Green Pigeon) *Treron vernans* (Linnaeus, 1771)

TRERVE

Type locality: ประเทศฟิลิปปินส์ **การแพร่กระจาย :** ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ **อ้างอิงจาก :** โอภาส (2542); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

251. นกเปล้าคอสีม่วงน้ำตาล (Orange-breasted Green Pigeon) *Treron bicincta* (Jerdon, 1840) TRERBI

Type locality: เมืองมาดราส (Madras) ประเทศอินเดีย **การแพร่กระจาย :** ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ **อ้างอิงจาก :** โอภาส (2542); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

252. นกเปล้าหน้าเหลือง (Pompadour Green Pigeon) *Treron pompadora* (Gmelin, 1789)

TRERPO

Type locality: ประเทศศรีลังกา **การแพร่กระจาย :** ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก และภาคตะวันออก **อ้างอิงจาก :** โอภาส (2542); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

253. นกเขาเปล้าธรรมดา (Thick-billed Green Pigeon) *Treron curvirostra* (Gmelin, 1789)

TRERCU

Type locality: ประเทศมาเลเซีย **การแพร่กระจาย :** ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก และภาคใต้ **อ้างอิงจาก :** โอภาส (2542); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

254. นกเปล้าใหญ่ (Large Green Pigeon) *Treron capellei* (Temminck, 1823) TRERCA

Type locality: เกาะชวา ประเทศอินโดนีเซีย **การแพร่กระจาย:** ภาคใต้ **อ้างอิงจาก:** โอภาส (2542); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

255. นกเปล้าขาเหลือง (Yellow-footed Green Pigeon) *Treron phoenicoptera* (Latham, 1790)

TRERPH

Type locality: รัฐเบงกอล ประเทศอินเดีย **การแพร่กระจาย:** ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันตก **อ้างอิงจาก:** โอภาส (2542); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

256. นกเปล้าหางเข็ม (Pin-tailed Green Pigeon) *Treron apicauda* Blyth, 1846 **TRERAPI**

Type locality: เมืองดาร์จีลิง (Darjeeling) รัฐอัสสัม ประเทศอินเดีย **การแพร่กระจาย:** ภาคเหนือ และ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ **อ้างอิงจาก:** โอภาส (2542); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

257. นกเปล้าหางเข็มหัวปีกแดง (Yellow-vented Green Pigeon) *Treron seimundi* (Robinson, 1910) **TRERSE**

Type locality: ประเทศมาเลเซีย **การแพร่กระจาย:** ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ **อ้างอิงจาก:** โอภาส (2542); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

258. นกเปล้าหางพลั่ว (Wedge-tailed Green Pigeon) *Treron sphenura* (Vigors, 1832)

TRERSP

Type locality: เทือกเขาหิมาลัย **การแพร่กระจาย:** ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออกและภาคใต้ **อ้างอิงจาก:** โอภาส (2542); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

259. นกเปล้าท้องขาว (White-bellied Green Pigeon) *Treron sieboldii* (Temminck, 1835)

TRERSI

Type locality: ประเทศญี่ปุ่น **การแพร่กระจาย:** ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันตก **อ้างอิงจาก:** โอภาส (2542); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

260. นกเปล้าหน้าแดง (Jambu Fruit Dove) *Ptilinopus jambu* (Gmelin, 1789) **PTILJA**

Type locality: เกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย **การแพร่กระจาย :**ภาคใต้ **อ้างอิงจาก :**โอภาส (2542); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

261. นกเขาเขียว (Emerald Dove) *Chalcophaps indica*(Linnaeus, 1758) CHALIN

Type locality: เมืองกัลกัตตา ประเทศอินเดีย **การแพร่กระจาย :**ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออกและภาคใต้ **อ้างอิงจาก :**โอภาส (2542); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

262. นกกรมพู่,นกกรมพู่เขียว (Green Imperial Pigeon) *Ducula aenea* (Linnaeus, 1766)

DUCUAE

Type locality: เกาะฟลอเรส ประเทศอินโดนีเซีย **การแพร่กระจาย :**ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออกและภาคใต้ **อ้างอิงจาก :**โอภาส (2542); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

263. นกมูม (Mountain Imperial Pigeon) *Ducula badia* (Raffles, 1822) DUCUAE

Type locality: เกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย **การแพร่กระจาย :**ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออกและภาคใต้ **อ้างอิงจาก :**โอภาส (2542); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

264. นกกรมพู่ขาว (Pied Imperial Pigeon) *Ducula bicolor* (Scopoli, 1786) DUCUBI

Type locality: เกาะนิวกินี **การแพร่กระจาย :**ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ **อ้างอิงจาก :**โอภาส (2542); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

อันดับนกกระเรียน (Order Gruiformes)

วงศ์นกกระเรียน (Family Gruidae)

265. นกกระเรียน (Sarus Crane) *Grus antigone* (Linnaeus, 1758) GRUSAN

Type locality: ประเทศอินเดีย **การแพร่กระจาย :**ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก และภาคใต้ **อ้างอิงจาก :**โอภาส (2542); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

266. นกกระเรียนพันธุ์ยุโรป (Common Crane) *Grus grus* (Linnaeus, 1758) GRUSGR

Type locality: ประเทศสวีเดน **การแพร่กระจาย :** ภาคเหนือ **อ้างอิงจาก :** โอภาส (2544ข); จารุจินต์ และคณะ (2550)

267. นกกระเรียนเล็ก (Demoiselle Crane) *Grus virgo* (Linnaeus, 1758) GRUSVI

Type locality: ประเทศอินเดีย **การแพร่กระจาย :** ภาคเหนือ **อ้างอิงจาก :** จารุจินต์ และคณะ (2550)

วงศ์นกฟินฟุต (Family Heliornithidae)

268. นกฟินฟุต (Masked Finfoot) *Heliopais personata* (Gray, 1849) HELIPE

Type locality: ประเทศมาเลเซีย **การแพร่กระจาย :** ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออกและภาคใต้ **อ้างอิงจาก :** โอภาส (2542); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

วงศ์นกอัญชัน (Family Rallidae)

269. นกอัญชันปากแดง (Red-legged Crake) *Rallina fasciata* (Raffles, 1822) RALLFA

Type locality: เกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย **การแพร่กระจาย :** ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก และภาคใต้ **อ้างอิงจาก :** โอภาส (2542); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

270. นกอัญชันปากเทา (Slaty-legged Crake) *Rallina eurizonoides* (Lafresnaye, 1845)

RALLEU

Type locality: ประเทศฟิลิปปินส์ **การแพร่กระจาย :** ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก และภาคใต้ **อ้างอิงจาก :** โอภาส (2542); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

271. นกอัญชันอกสีไพล (Water Rail) *Rallus aquaticus* Linnaeus, 1758 RALLAQ

Type locality: สหราชอาณาจักร **การแพร่กระจาย :** ภาคเหนือ และภาคกลาง **อ้างอิงจาก :** โอภาส (2542); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

272. นกอัญชันอกเทา (Slaty-breasted Rail) *Gallirallus striatus* (Linnaeus, 1766) GALLST

Type locality: ประเทศฟิลิปปินส์ **การแพร่กระจาย :** ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ **อ้างอิงจาก :** โอภาส (2542); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

273. นกกัก (White-breasted Waterhen) *Amaurornis phoenicurus* (Pennant, 1769)
AMAUPH
Type locality: ประเทศศรีลังกา *การแพร่กระจาย* :ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ *อ้างอิงจาก* :โอภาส (2542); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)
274. นกอัญชันหางดำ (Black-tailed Crake) *Porzana bicolor* (Walden, 1872) **PORZBI**
Type locality: ประเทศอินเดีย *การแพร่กระจาย* :ภาคเหนือ *อ้างอิงจาก* :โอภาส (2542); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)
275. นกอัญชันเล็ก (Baillon's Crake) *Porzana pusilla* (Pallas, 1776) **PORZPU**
Type locality: Duria *การแพร่กระจาย* :ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก และภาคใต้ *อ้างอิงจาก* :จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008); โอภาส (2542)
276. นกอัญชันเล็กลายจุด (Spotted Crake) *Porzana porzana* (Linnaeus, 1766) **PORZPO**
Type locality: ประเทศฝรั่งเศส *การแพร่กระจาย* :ภาคกลาง *อ้างอิงจาก* :โอภาส (2542); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)
277. นกหนูนแดง (Ruddy-breasted Crake) *Porzana fusca* (Linnaeus, 1766) **PORZFU**
Type locality: ประเทศฟิลิปปินส์ *การแพร่กระจาย* :ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออกและภาคใต้ *อ้างอิงจาก* :โอภาส (2542); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)
278. นกอัญชันจีน (Band-bellied Crake) *Porzana paykullii* (Ljungh, 1813) **PORZPA**
Type locality: ประเทศอินโดนีเซีย *การแพร่กระจาย* :ภาคกลาง *อ้างอิงจาก* :จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008); โอภาส (2542)
279. นกอัญชันคิ้วขาว (White-browed Crake) *Porzana cinerea* (Vieillot, 1819) **PORZCI**
Type locality: เกาะชวา ประเทศอินโดนีเซีย *การแพร่กระจาย* : ภาคกลาง ภาคตะวันตก และภาคใต้ *อ้างอิงจาก* :โอภาส (2542); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)
280. นกอีลุ้ม (Watercock) *Gallicrex cinerea* (Gmelin, 1789) **GALLCI**

Type locality: เกาะชวา ประเทศอินโดนีเซีย **การแพร่กระจาย :**ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออกและภาคใต้ **อ้างอิงจาก :**โอภาส (2542); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

281. นกอีโก้ง (Purple Swampphen) *Porphyrio porphyrio* (Linnaeus, 1758) PORHPO

Type locality: ประเทศอินเดีย **การแพร่กระจาย :**ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก และภาคใต้ **อ้างอิงจาก :**โอภาส (2542); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

282. นกอีล้ำ (Common Moorhen) *Gallinula chloropus* (Linnaeus, 1758) GALLCH

Type locality: ประเทศอังกฤษ **การแพร่กระจาย :**ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออกและภาคใต้ **อ้างอิงจาก :**โอภาส (2542); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

283. นกคูด (Common Coot) *Fulica atra* Linnaeus, 1758 FULIAT

Type locality: ประเทศสวีเดน **การแพร่กระจาย :**ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออกและภาคใต้ **อ้างอิงจาก :**โอภาส (2542); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

อันดับนกกระสา (Order Ciconiiformes)

วงศ์นกชายเลนและนกปากซ่อม (Family Scolopacidae)

284. นกปากซ่อมดง (Eurasian Woodcock) *Scolopax rusticola* Linnaeus, 1758 SCOLRU

Type locality: ประเทศสวีเดน **การแพร่กระจาย :**ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก และภาคใต้ **อ้างอิงจาก :**โอภาส (2543); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

285. นกปากซ่อมพง (Wood Snipe) *Gallinago nemoricola* Hodgson, 1836 GALLINE

Type locality: ประเทศเนปาล **การแพร่กระจาย :**ภาคเหนือ และ ภาคตะวันตก **อ้างอิงจาก :**โอภาส (2543); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

286. นกปากซ่อมหางเข้มน (Pintail Snipe) *Gallinago stenura* (Bonaparte, 1830) GALLST

Type locality: ประเทศอินโดนีเซีย **การแพร่กระจาย** :ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออกและภาคใต้ **อ้างอิงจาก** :โอภาส (2543);จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

287. นกปากซ่อมสวินโฮ (Swinhoe's Snipe) *Gallinago megala* Swinhoe, 1861 GALLME

Type locality: กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน **การแพร่กระจาย** :ภาคกลาง **อ้างอิงจาก** :โอภาส (2543);จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

288. นกปากซ่อมหางพัด (Common Snipe) *Gallinago gallinago* (Linnaeus, 1758)

GALLGA

Type locality: ประเทศสวีเดน **การแพร่กระจาย** :ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออกและภาคใต้ **อ้างอิงจาก** :โอภาส (2543);จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

289. นกปากซ่อมเล็ก (Jack Snipe) *Lymnocyptes minimus* (Bruennich, 1764) LYMNMI

Type locality: ประเทศเดนมาร์ก **การแพร่กระจาย** :ภาคเหนือ ภาคกลาง และ ภาคตะวันตก **อ้างอิงจาก** :โอภาส (2543);จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

290. นกอีโก้ยจิ๋ว (Little Curlew) *Numenius minutus* Gould, 1841 NUMEMI

Type locality: ไชบีเรีย **การแพร่กระจาย** :ภาคกลาง **อ้างอิงจาก** :โอภาส (2543);จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

291. นกอีโก้ยเล็ก (Whimbrel) *Numenius phaeopus* (Linnaeus, 1758) NUMEPH

Type locality: ประเทศฟิลิปปินส์ **การแพร่กระจาย** :ภาคกลาง ภาคตะวันออกและภาคใต้ **อ้างอิงจาก** :โอภาส (2543);จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

292. นกอีโก้ยใหญ่ (Eurasian Curlew) *Numenius arquata* (Linnaeus, 1758) NUMEAR

Type locality: ประเทศอินโดนีเซีย **การแพร่กระจาย** :ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ **อ้างอิงจาก** :โอภาส (2543);จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

293. นกอีโก้ยตะโพกสีน้ำตาล (Eastern Curlew) *Numenius madagascariensis* (Linnaeus, 1766) NUMEMA

Type locality: เกาะมาดากัสการ์ (Madagascar) *การแพร่กระจาย:* ภาคกลาง และภาคใต้
อ้างอิงจาก: จารูจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008); โอภาส (2543)

294. นกปากแอนหางดำ (Black-tailed Godwit) *Limosa limosa* (Linnaeus, 1758) LIMOLI

Type locality: ประเทศออสเตรเลีย *การแพร่กระจาย:* ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออกและภาคใต้ *อ้างอิงจาก:* โอภาส (2543); จารูจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

295. นกปากแอนหางลาย (Bar-tailed Godwit) *Limosa lapponica* (Linnaeus, 1758)

LIMOLA

Type locality: Lapland ทางตอนเหนือกลุ่มประเทศสแกนดิเนเวีย (Scandinavia) *การแพร่กระจาย:* ภาคกลาง และภาคใต้ *อ้างอิงจาก:* โอภาส (2543); จารูจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

296. นกข้อมทะเลปากยาว (Long-billed Dowitcher) *Limnodromus scolopaceus* (Say, 1823)

LIMNSC

Type locality: ทวีปอเมริกาเหนือ *การแพร่กระจาย:* ภาคกลาง *อ้างอิงจาก:* โอภาส (2543); จารูจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

297. นกข้อมทะเลอกแดง (Asian Dowitcher) *Limnodromus semipalmatus* (Blyth, 1848)

LIMNSE

Type locality: เมืองกัลกัตตา ประเทศอินเดีย *การแพร่กระจาย:* ภาคกลาง และภาคใต้
อ้างอิงจาก: โอภาส (2543); จารูจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

298. นกทะเลขาแดงลายจุด (Spotted Redshank) *Tringa erythropus* (Pallas, 1764)

TRINER

Type locality: ประเทศเนเธอร์แลนด์ *การแพร่กระจาย:* ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออกและภาคใต้ *อ้างอิงจาก:* โอภาส (2543); จารูจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

299. นกทะเลขาแดงธรรมดา (Common Redshank) *Tringa totanus* (Linnaeus, 1758)

TRINTO

Type locality: ประเทศสวีเดน *การแพร่กระจาย:* ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออกและภาคใต้ *อ้างอิงจาก:* โอภาส (2543); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

300. นกทะเลขาเขียว (Common Greenshank) *Tringa nebularia* (Gunnerus, 1767)

TRINNE

Type locality: ประเทศนอร์เวย์ *การแพร่กระจาย:* ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคตะวันออกและภาคใต้ *อ้างอิงจาก:* โอภาส (2543); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

301. นกทะเลขาเขียวลายจุด (Nordmann's Greenshank) *Tringa guttifer* (Nordmann, 1835)

TRINGU

Type locality: ประเทศรัสเซีย *การแพร่กระจาย:* ภาคกลาง และภาคใต้ *อ้างอิงจาก:* โอภาส (2543); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

302. นกชายเลนบึง (Marsh Sandpiper) *Tringa stagnatilis* (Bechstein, 1803) TRINST

Type locality: ประเทศเยอรมันนี *การแพร่กระจาย:* ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออกและภาคใต้ *อ้างอิงจาก:* โอภาส (2543); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

303. นกชายเลนเขียว (Green Sandpiper) *Tringa ochropus* Linnaeus, 1758 TRINOC

Type locality: ประเทศสวีเดน *การแพร่กระจาย:* ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ *อ้างอิงจาก:* โอภาส (2543); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

304. นกชายเลนน้ำจืด (Wood Sandpiper) *Tringa glareola* Linnaeus, 1758 TRINGL

Type locality: ประเทศสวีเดน *การแพร่กระจาย:* ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออกและภาคใต้ *อ้างอิงจาก:* โอภาส (2543); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

305. นกชายเลนปากแฉ่น (Terek Sandpiper) *Xenus cinereus* (Gueldenstadt, 1775)

XENUSCI

Type locality:แม่น้ำ Terex บริเวณทะเลสาบแคสเปียน *การแพร่กระจาย* :ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ *อ้างอิงจาก* :โอภาส (2543);จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

306. นกเต้าดิน (Common Sandpiper) *Actitis hypoleucos* (Linnaeus, 1758) ACTIHY

Type locality:ประเทศสวีเดน *การแพร่กระจาย* :ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาค ตะวันตก ภาคตะวันออกและภาคใต้ *อ้างอิงจาก* :โอภาส (2543);จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

307. นกตีนเหลือง (Grey-tailed Tattler) *Heteroscelus brevipes* (Vieillot, 1816) HETEBR

Type locality:ไซบีเรีย *การแพร่กระจาย* :ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ *อ้างอิงจาก* :โอภาส (2543);จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

308. นกพลิกหิน (Ruddy Turnstone) *Arenaria interpres* (Linnaeus, 1758) ARENIN

Type locality:ประเทศสวีเดน *การแพร่กระจาย* :ภาคกลาง และภาคใต้ *อ้างอิงจาก* :โอภาส (2543);จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

309. นกน้อตใหญ่ (Great Knot) *Calidris tenuirostris* (Horsfield, 1821) CALITE

Type locality:เกาะชวา ประเทศอินโดนีเซีย *การแพร่กระจาย* :ภาคกลาง และภาคใต้ *อ้างอิงจาก* :โอภาส (2543);จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

310. นกน้อตเล็ก (Red Knot) *Calidris canutus* (Linnaeus, 1758) CALICA

Type locality:ประเทศสวีเดน *การแพร่กระจาย* :ภาคกลาง และภาคใต้ *อ้างอิงจาก* :โอภาส (2543);จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

311. นกคอสั้นตีนขาว (Sanderling) *Calidris alba* (Pallas, 1764) CALIALB

Type locality:ชายฝั่งทะเลเหนือ ประเทศเนเธอร์แลนด์ *การแพร่กระจาย* :ภาคกลาง และภาคใต้ *อ้างอิงจาก* :โอภาส (2543);จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

312. นกชายเลนปากช้อน (Spoon-billed Sandpiper) *Calidris pygmeus* (Linnaeus, 1758)

CALIPY

Type locality: สุรินัม เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ *การแพร่กระจาย*: ภาคกลาง และภาคใต้ *อ้างอิงจาก*: โอภาส (2543); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

313. นกสตินที่เล็ก (Little Stint) *calidris minuta* (Leisler, 1812) CALIMI

Type locality: ประเทศเยอรมันนี *การแพร่กระจาย*: ภาคกลาง *อ้างอิงจาก*: โอภาส (2543); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

314. นกสตินที่คอแดง (Rufous-necked Stint) *Calidris ruficollis* (Pallas, 1776) CALIRU

Type locality: รัสเซีย *การแพร่กระจาย*: ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ *อ้างอิงจาก*: โอภาส (2543); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

315. นกสตินที่อกเทา (Temminck's Stint) *Calidris temminckii* (Leisler, 1812) CALITE

Type locality: ประเทศเยอรมันนี *การแพร่กระจาย*: ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออกและภาคใต้ *อ้างอิงจาก*: โอภาส (2543); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

316. นกสตินที่นิ้วยาว (Long-toed Stint) *Calidris subminuta* (Middendorff, 1853)

CALISU

Type locality: ไชบีเรีย *การแพร่กระจาย*: ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออกและภาคใต้ *อ้างอิงจาก*: โอภาส (2543); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

317. นกชายเลนกระหม่อมแดง (Sharp-tailed Sandpiper) *Calidris acuminata* (Horsfield, 1821) CALIAC

Type locality: เกาะชวา ประเทศอินโดนีเซีย *การแพร่กระจาย*: ภาคกลาง และภาคใต้ *อ้างอิงจาก*: โอภาส (2543); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

318. นกชายเลนท้องดำ (Dunlin) *Calidris alpina* (Linnaeus, 1758) CALIALP

Type locality:ประเทศไทย ศรีสะเกษ **การแพร่กระจาย :**ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ **อ้างอิงจาก :**โอภาส (2543);จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

319. นกชายเลนปากโค้ง (Curlew Sandpiper) *Calidris ferruginea* (Pontoppidan, 1763)

CALIFE

Type locality:ประเทศเคนมาธิร์ก **การแพร่กระจาย :**ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออกและภาคใต้ **อ้างอิงจาก :**โอภาส (2543);จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

320. นกชายเลนปากกว้าง (Broad-billed Sandpiper) *Limicola falcinellus* (Pontoppidan, 1763) LIMIFA

Type locality:ประเทศเคนมาธิร์ก **การแพร่กระจาย :**ภาคกลาง และภาคใต้ **อ้างอิงจาก :**โอภาส (2543);จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

321. นกรัฟ (Ruff) *Philomachus pugnax* (Linnaeus, 1758) PHILPU

Type locality: ประเทศสวีเดน **การแพร่กระจาย :**ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ **อ้างอิงจาก :**โอภาส (2543);จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

วงศ์นกโป่งวิด (Family Rostratulidae)

322. นกโป่งวิด (Greater Painted-snipe) *Rostratula benghalensis* (Linnaeus, 1758)

ROSTBE

Type locality:เมืองBenghal รัฐเบงกอล ประเทศอินเดีย **การแพร่กระจาย :**ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก และภาคใต้ **อ้างอิงจาก :**โอภาส (2543);จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

วงศ์นกอีแจว (Family Jacanidae)

323. นกอีแจว (Pheasant-tailed Jacana) *Hydrophasianus chirurgus* (Scopoli, 1786)

HYDRAS

Type locality:ประเทศฟิลิปปินส์ **การแพร่กระจาย :**ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออกและภาคใต้ **อ้างอิงจาก :**โอภาส (2543);จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

324. นกพริก (Bronze-winged Jacana) *Metopidius indicus* (Latham, 1790) METOIN

Type locality: ประเทศอินเดีย *การแพร่กระจาย* : ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก และภาคใต้ *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2543); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

วงศ์นกกระแตผี (Family Burhinidae)

325. นกกระแตผีเล็ก (Eurasian Thick-knee) *Burhinus oedienemus* (Linnaeus, 1758)

BURHOE

Type locality: ประเทศอังกฤษ *การแพร่กระจาย* : ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก และภาคใต้ *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2543); จารุจินต์ และคณะ (2550); Pratumthong *et al.*, (2007); Robson (2008)

326. นกกระแตผีใหญ่ (Great Thick-knee) *Esacus recurvirostris* (Cuvier, 1829) ESACRE

Type locality: ประเทศเนปาล *การแพร่กระจาย* : ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2543); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

327. นกกระแตผีชายหาด (Beach Thick-knee) *Esacus neglectus* Mathews, 1912 ESACNE

Type locality: ประเทศออสเตรเลีย *การแพร่กระจาย* : ภาคใต้ *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2543); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

วงศ์นกตีนเทียน (Family Recurvirostridae)

328. นกตีนเทียน (Black-winged Stilt) *Himantopus himantopus* (Linnaeus, 1758) HIMAHI

Type locality: ยุโรปใต้ *การแพร่กระจาย* : ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก และภาคใต้ *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2543); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

329. นกชายเลนปากงอน (Pied Avocet) *Recurvirostra avosetta* Linnaeus, 1758 RECUAV

Type locality: ประเทศอิตาลี *การแพร่กระจาย* : ภาคเหนือ และภาคกลาง *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2543); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

วงศ์นกหัวโตกินปู (Family Dromadidae)

330. นกหัวโตกินปู (Crab-plover) *Dromas ardeola* Paykull, 1805 DROMAR
Type locality: ประเทศอินเดีย *การแพร่กระจาย* : ภาคใต้ *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2543); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

วงศ์นกแอ่นทุ่ง (Family Glareolidae)

331. นกลอยทะเลคอแดง (Red-necked Phalarope) *Phalaropus lobatus* (Linnaeus, 1758)

PHALLO

Type locality: อ่าวฮัดสัน ประเทศแคนาดา *การแพร่กระจาย* : ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้
อ้างอิงจาก : โอภาส (2543); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

332. นกลอยทะเลสีเทา (Grey Phalarope) *Phalaropus fulicarius* (Linnaeus, 1758)

PHALFU

Type locality: อ่าวฮัดสัน ประเทศแคนาดา (Hudson Bay, Canada) *การแพร่กระจาย* : ภาคกลาง
อ้างอิงจาก : จารุจินต์ และคณะ (2550)

333. นกแอ่นทุ่งเล็ก (Small Pratincole) *Glareola lactea* Temminck, 1820 GLARLA

Type locality: รัฐเบงกอล ประเทศอินเดีย *การแพร่กระจาย* : ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก และภาคตะวันออก *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2543); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

334. นกแอ่นทุ่งใหญ่ (Oriental Pratincole) *Glareola maldivarum* Forster, 1795 GLARMA

Type locality: หมู่เกาะมัลดีฟส์ *การแพร่กระจาย* : ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออกและภาคใต้ *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2543); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

วงศ์นกหัวโตและนกกระแต (Family Charadriidae)

335. นกหัวโตสีเทา (Grey Plover) *Pluvialis squatarola* (Linnaeus, 1758) PLUVSQ

Type locality: ประเทศสวีเดน *การแพร่กระจาย* : ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคตะวันออกและภาคใต้ *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2543); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

336. นกหัวโตนหลังจุดสีทอง (Pacific Golden Plover) *Pluvialis fulva* (Gmelin, 1789)

PLUVFU

Type locality: ตาฮิติ *การแพร่กระจาย:* ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคตะวันออกและภาคใต้

อ้างอิงจาก: โอภาส (2543); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

337. นกหัวโตนเล็กขาตี๋ม (Common Ringed Plover) *Charadrius hiaticula* Linnaeus, 1758

CHARHI

Type locality: ประเทศสวีเดน *การแพร่กระจาย:* ภาคเหนือ และ ภาคกลาง *อ้างอิงจาก:* โอภาส

(2543); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

338. นกหัวโตนปากยาว (Long-billed Plover) *Charadrius placidus* Gray and Gray, 1863

CHARPL

Type locality: ประเทศเนปาล *การแพร่กระจาย:* ภาคเหนือ และ ภาคกลาง *อ้างอิงจาก:* โอภาส

(2543); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

339. นกหัวโตนเล็กขาเหลือง (Little Ringed Plover) *Charadrius dubius* Scopoli, 1786

CHARDU

Type locality: ประเทศศรีลังกา *การแพร่กระจาย:* ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง

ภาคตะวันตก ภาคตะวันออกและภาคใต้ *อ้างอิงจาก:* โอภาส (2543); จารุจินต์ และคณะ (2550);

Robson (2008)

340. นกหัวโตนเล็กขาคำ (Kentist Plover) *Charadrius alexandrinus* Linnaeus, 1758

CHARAL

Type locality: Alexandria ประเทศอียิปต์ *การแพร่กระจาย:* ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคกลาง ภาคตะวันออกและภาคใต้ *อ้างอิงจาก:* โอภาส (2543); จารุจินต์ และคณะ (2550);

Robson (2008)

341. นกหัวโตนมลายู (Malaysian Plover) *Charadrius peronii* Schlegel, 1865 CHARPE

Type locality: เกาะบอร์เนียว ประเทศอินโดนีเซีย *การแพร่กระจาย:* ภาคกลาง ภาคตะวันออก

และภาคใต้ *อ้างอิงจาก:* โอภาส (2543); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

342. นกหัวโตทรายเล็ก (Lesser Sand Plover) *Charadrius mongolus* Pallas, 1776

CHARMO

Type locality: รัฐเบงกอล ประเทศอินเดีย *การแพร่กระจาย:* ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคตะวันออกและภาคใต้ *อ้างอิงจาก:* โอภาส (2543); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

343. นกหัวโตทรายใหญ่ (Greater Sand Plover) *Charadrius leschenaultia* Lesson, 1826

CHARLE

Type locality: เมือง Pondicherry ประเทศอินเดีย *การแพร่กระจาย:* ภาคกลาง ภาคตะวันออกและภาคใต้ *อ้างอิงจาก:* โอภาส (2543); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

344. นกหัวโตขาขาว (Oriental Plover) *Charadrius veredus* Gould, 1848 CHARDU

Type locality: ทางตอนเหนือ ประเทศออสเตรเลีย *การแพร่กระจาย:* ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคตะวันออกและภาคใต้ *อ้างอิงจาก:* โอภาส (2543); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

345. นกกระแตหอน (Northern Lapwing) *Vanellus vanellus* (Linnaeus, 1758) VANEVA

Type locality: ประเทศสวีเดน *การแพร่กระจาย:* ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และ ภาคตะวันออก *อ้างอิงจาก:* จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008); โอภาส (2543)

346. นกกระแตหาด (River Lapwing) *Vanellus duvaucelii* (Lesson, 1826) VANEDU

Type locality: ประเทศอียิปต์ *การแพร่กระจาย:* ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคตะวันออกและภาคใต้ *อ้างอิงจาก:* โอภาส (2543); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

347. นกกระแตหัวเทา (Grey-headed Lapwing) *Vanellus cinereus* (Blyth, 1842) VANECI

Type locality: เมืองกัลกัตตา ประเทศอินเดีย *การแพร่กระจาย:* ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตกและภาคใต้ *อ้างอิงจาก:* โอภาส (2543); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

348. นกกระแตแต้แว๊ด (Red-wattled Lapwing) *Vanellus indicus* (Boddaert, 1783)

VANEIN

Type locality: ประเทศเทศพม่า *การแพร่กระจาย* :ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคตะวันออกและภาคใต้ *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2543);จารุจินต์ และคณะ (2550); Pratumthong *et al.*, (2007);Robson (2008)

วงศ์นกสก๊วก (Family Stercorariidae)

349. นกสก๊วกหางช้อน (Pomarine Jaeger) *Stercorarius pomarinus* (Temminck, 1815)

STERPO

Type locality:เขตขั้วโลก ของทวีปยุโรป *การแพร่กระจาย* :ภาคกลาง และภาคใต้ *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2543);จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

350. นกสก๊วกขี้โลกเหนือ (Parasitic Jaeger) *Stercorarius parasiticus* (Linnaeus, 1758)

STERPA

Type locality:ประเทศสวีเดน *การแพร่กระจาย* :ภาคกลาง *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2543);จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

351. นกสก๊วกหางยาว (Long-tailed Jaeger) *Stercorarius longicaudus* Vieillot, 1819

STERLO

Type locality:ประเทศสวีเดน *การแพร่กระจาย* :ภาคใต้ *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2543);จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

วงศ์นกกรีดน้ำ (Family Rynchopidae)

352. นกกรีดน้ำ (Indian Skimmer) *Rynchops albicollis* Swainson, 1838 RYNCAL

Type locality:ประเทศอินเดีย *การแพร่กระจาย* :ภาคกลาง *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2543);จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

วงศ์นกนางนวลและนกนางนวลแกลบ (Family Laridae)

353. นกนางนวลหางดำ (Black-tail Gull) *Larus Crassirostris* Vieillot, 1818 LARUCR

Type locality:ประเทศญี่ปุ่น *การแพร่กระจาย* :ภาคกลาง *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2543);จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

354. นกนางนวลปากเหลือง (Mew Gull) *Larus canus* Linnaeus, 1758 LARUCA
Type locality: ประเทศสวีเดน *การแพร่กระจาย :* ภาคกลาง *อ้างอิงจาก :* จารุจินต์ และคณะ (2550)
355. นกนางนวลหลังดำเล็ก (Lesser Black-backed Gull) *Larus fuscus* Linnaeus, 1758
 LARUFU
Type locality: ประเทศสวีเดน *การแพร่กระจาย :* ภาคกลาง *อ้างอิงจาก :* จารุจินต์ และคณะ (2550)
356. นกนางนวลหลังดำพันธุรัสเซีย (Heuglin Gull) *Larus heuglini* Bree, 1786 LARUHE
Type locality: โซมาลีแลนด์ (Somaliland) *การแพร่กระจาย :* ภาคกลาง *อ้างอิงจาก :* โอภาส (2544ข); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)
357. นกนางนวลพันธุมองโกเลีย (Mongolian Gull) *Larus mongolicus* Pontoppidan, 1763
 LARUMO
Type locality: ประเทศเดนมาร์ก (Denmark) *การแพร่กระจาย :* ภาคกลาง *อ้างอิงจาก :* จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson, (2002)
358. นกนางนวลหัวดำใหญ่ (Pallas's Gull) *Larus ichthyaetus* Pallas, 1773 LARUIC
Type locality: ทะเลสาปแคสเปียน *การแพร่กระจาย :* ภาคเหนือ และภาคกลาง *อ้างอิงจาก :* โอภาส (2543); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)
359. นกนางนวลธรรมดา (Brown-headed Gull) *Larus brunnicephalus* Jerdon, 1840.
 LARUBR
Type locality: ประเทศอินเดีย *การแพร่กระจาย :* ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก และภาคใต้ *อ้างอิงจาก :* โอภาส (2543); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)
360. นกนางนวลขอบปีกขาว (Black-headed Gull) *Larus ridibundus* Linnaeus, 1766
 LARURI
Type locality: ประเทศอังกฤษ *การแพร่กระจาย :* ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ *อ้างอิงจาก :* โอภาส (2543); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

361. นกนางนวลปากเรียว (Slender-billed Gull) *Larus genei* Breme, 1839 LARUGE
Type locality: เกาะซาร์ดีเนีย ประเทศอิตาลี *การแพร่กระจาย:* ภาคกลาง *อ้างอิงจาก:* โอภาส (2543); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)
362. นกนางนวลเล็ก (Little Gull) *Larus minutus* Pallas, 1776 LARUMI
Type locality: ไชบีเรีย (river of Siberia) *การแพร่กระจาย:* ภาคกลาง *อ้างอิงจาก:* จารุจินต์ และคณะ (2550)
363. นกนางนวลหลังเทา (Slaty-backed Gull) *Larus schistisagus* Stejneger, 1884 LARUSC
Type locality: คาบสมุทร Kamchatka ประเทศรัสเซีย (Kamchatka Peninsula in the far east of Russia) *การแพร่กระจาย:* ภาคกลาง *อ้างอิงจาก:* จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2002)
364. นกนางนวลสีดำ (Sooty Gull) *Ichthyaeetus hemprichii* (Bruch, 1853) ICHTHE
Type locality: ทะเลแดง (Red Sea) *การแพร่กระจาย:* ภาคกลาง *อ้างอิงจาก:* จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2002)
365. นกคิตติวอกขาดำ (Black-legged Kittiwake) *Rissa tridactyla* (Linnaeus, 1758) RISSTR
Type locality: ประเทศไอซ์แลนด์ *การแพร่กระจาย:* ภาคกลาง *อ้างอิงจาก:* โอภาส (2543); จารุจินต์ และคณะ (2550)
366. นกนางนวลกลบปากหนา (Gull-billed Tern) *Gelochelidon nilotica* (Gmelin, 1789) GELONI
Type locality: ประเทศอียิปต์ *การแพร่กระจาย:* ภาคกลาง และภาคใต้ *อ้างอิงจาก:* โอภาส (2543); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)
367. นกนางนวลกลบแคสเปียน (Caspian Tern) *Sterna caspia* Pallas, 1770 STERCA
Type locality: ทะเลสาบแคสเปียน *การแพร่กระจาย:* ภาคกลาง และภาคใต้ *อ้างอิงจาก:* โอภาส (2543); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)
368. นกนางนวลกลบแม่น้ำ (River Tern) *Sterna aurantia* Gray, 1831 STERAU

Type locality:ประเทศอินเดีย **การแพร่กระจาย :**ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก **อ้างอิงจาก :**โอภาส (2543);จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

**369. นกนางนวลแกลบหงอนเล็ก (Lesser Crested Tern) *Sterna bengalensis* Lesson, 1831
STERBEN**

Type locality:รัฐเบงกอล ประเทศอินเดีย **การแพร่กระจาย :**ภาคกลาง และภาคใต้ **อ้างอิงจาก :**โอภาส (2543);จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

**370. นกนางนวลแกลบหงอนใหญ่ (Great Crested Tern) *Sterna bergii*Lichtenstein, 1823
STERBERG**

Type locality:แหลมกู๊ดโฮป ประเทศแอฟริกาใต้ **การแพร่กระจาย :**ภาคกลาง ภาคตะวันออกและภาคใต้ **อ้างอิงจาก :**โอภาส (2543);จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

**371. นกนางนวลแกลบจีน (Chinese Crested Tern) *Sterna bernsteini* Schlegel, 1863
STERBERN**

Type locality:มณฑลซานตง ประเทศจีน **การแพร่กระจาย :**ภาคใต้ **อ้างอิงจาก :**โอภาส (2543);จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

**372. นกนางนวลแกลบสีกุหลาบ (Roseate Tern) *Sterna dougallii* Montagu, 1813
STERDO**

Type locality:ประเทศจีน **การแพร่กระจาย :**ภาคกลาง ภาคตะวันออกและภาคใต้ **อ้างอิงจาก :**โอภาส (2543);จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

**373. นกนางนวลแกลบท้ายทอยดำ (Black-naped Tern) *Sterna sumatrana* Raffles, 1822
STERSU**

Type locality:เกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย **การแพร่กระจาย :**ภาคตะวันออกและภาคใต้ **อ้างอิงจาก :**โอภาส (2543);จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

**374. นกนางนวลแกลบธรรมดา (Common Tern) *Sterna hirundo* Linnaeus, 1758
STERHI**

Type locality:ประเทศสวีเดน **การแพร่กระจาย :**ภาคกลาง และภาคใต้ **อ้างอิงจาก :**โอภาส (2543);จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

375. นกนางนวลแกลบเล็ก (Little Tern) *Sterna albifrons* Pallas, 1764 STERAL
Type locality: ประเทศเนเธอร์แลนด์ *การแพร่กระจาย* : ภาคกลาง ภาคตะวันออกและภาคใต้ *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2543); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)
376. นกนางนวลแกลบท้องดำ (Black-bellied Tern) *Sterna acuticauda* Gray, 1832.
 STERAC
Type locality: ประเทศอินเดีย *การแพร่กระจาย* : ภาคเหนือ *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2543); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)
377. นกนางนวลแกลบคิ้วขาว (Bridled Tern) *Sterna anaethetus* Scopoli, 1786 STERAN
Type locality: ประเทศฟิลิปปินส์ *การแพร่กระจาย* : ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก และภาคใต้ *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2543); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)
378. นกนางนวลแกลบดำ (Sooty Tern) *Sterna fuscata* Linnaeus, 1766 STERFU
Type locality: หมู่เกาะอินดีสตะวันตก (West Indies) *การแพร่กระจาย* : ภาคกลาง และภาคใต้ *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2543); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)
379. นกนางนวลแกลบเคราขาว (Whiskered Tern) *Chlidonias hybridus* (Pallas, 1811)
 CHLIHY
Type locality: ประเทศศรีลังกา *การแพร่กระจาย* : ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2543); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)
380. นกนางนวลแกลบดำปีกขาว (White – winged Tern) *Sterna leucopterus*
 Temminck, 1815 STERLE
Type locality: ชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียน *การแพร่กระจาย* : ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2543); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)
381. นกนอด้ (Brown Noddy) *Anous stolidus* (Linnaeus, 1758) ANOUST

Type locality: หมู่เกาะอินดีส์ตะวันตก (West Indies) **การแพร่กระจาย :** ภาคกลาง และภาคใต้ **อ้างอิงจาก :** โอภาส (2543); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

วงศ์เหยี่ยวและนกอินทรี (Family Accipitridae)

382. เหยี่ยวกิ้งก่าสีน้ำตาล (Jerdon's Baza) *Aviceda jerdoni* (Blyth, 1842) AVICJE

Type locality: ประเทศมาเลเซีย **การแพร่กระจาย :** ภาคเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออกและภาคใต้ **อ้างอิงจาก :** โอภาส (2543); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

383. เหยี่ยวกิ้งก่าสีดำ (Black Baza) *Aviceda leuphotes* (Dumont, 1820) AVICLE

Type locality: ประเทศเนปาล **การแพร่กระจาย :** ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคตะวันออกและภาคใต้ **อ้างอิงจาก :** โอภาส (2543); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

384. เหยี่ยวขาว (Black-shouldered Kite) *Elanus caeruleus* (Desfontaines, 1789)

ELANCA

Type locality: ประเทศแอลจีเรีย **การแพร่กระจาย :** ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคตะวันออกและภาคใต้ **อ้างอิงจาก :** โอภาส (2543); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

385. เหยี่ยวดำ (Black Kite) *Milvus migrans* (Boddaert, 1783) MILVMI

Type locality: ประเทศฝรั่งเศส **การแพร่กระจาย :** ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก และภาคใต้ **อ้างอิงจาก :** โอภาส (2543); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

386. เหยี่ยวแดง (Brahminy Kite) *Haliastur indus* (Boddaert, 1783) HALIIN

Type locality: ประเทศอินเดีย **การแพร่กระจาย :** ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคตะวันออกและภาคใต้ **อ้างอิงจาก :** โอภาส (2543); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

387. นกออก (White-bellied Sea Eagle) *Haliaeetus leucogaster* (Gmelin, 1788) HALILE

Type locality: เกาะ Prince's Island ประเทศอินโดนีเซีย **การแพร่กระจาย :** ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคตะวันออกและภาคใต้ **อ้างอิงจาก :** โอภาส (2543); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

388. นกอินทรีหัวสีนวล (Pallas's Fish Eagle) *Haliaeetus leucoryphus* (Pallas, 1771)

HALILE

Type locality: คุ่มน้ำ Urals ประเทศรัสเซีย *การแพร่กระจาย* : ภาคเหนือ *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2543); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

389. นกอินทรีหางขาว (White-tailed Eagle) *Haliaeetus albicilla* (Linnaeus, 1758)

HALIAL

Type locality: ประเทศสวีเดน *การแพร่กระจาย* : ภาคกลาง *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2543); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

390. เขี้ยวปลาเล็กหัวเทา (Lesser Fish Eagle) *Ichthyophaga humilis* (Mueller & Schlegel, 1841) **ICHTHU**

Type locality: บริเวณคอกขุนตาล จังหวัดลำปาง – ลำพูน *การแพร่กระจาย* : ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก และภาคใต้ *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2543); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

391. เขี้ยวปลาใหญ่หัวเทา (Grey-headed Fish Eagle) *Ichthyophaga ichhyaetus* (Horsfield, 1821) **ICHTIC**

Type locality: เกาะชวา ประเทศอินโดนีเซีย *การแพร่กระจาย* : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก และภาคใต้ *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2543); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

392. อีแร้งทาลังขาว (White-rumped Vulture) *Gyps bengalensis* (Gmelin, 1788)

GYPSE

Type locality: รัฐเบงกอล ประเทศอินเดีย *การแพร่กระจาย* : ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก และภาคใต้ *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2543); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

393. อีแร้งสีน้ำตาล (Slender-billed Vulture) *Gyps tenuirostris* Gray, 1844 **GYPSTE**

Type locality: ประเทศเนปาล *การแพร่กระจาย :* ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกและภาคใต้ *อ้างอิงจาก :* โอบาส (2543); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

394. อีแร้งน้ำตาดหิมาลัย (Himalayan Griffon) *Gyps himalayensis* Hume, 1869 GYP SHI

Type locality: ที่อกเขาหิมาลัย *การแพร่กระจาย :* ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ *อ้างอิงจาก :* โอบาส (2543); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

395. อีแร้งสีน้ำตาลอินเดีย, อีแร้งสีน้ำตาล (Long-billed Vulture) *Gyps indicus* (Scopoli, 1786)

AEGYMO

Type locality: เมือง Pondicherry ประเทศอินเดีย *การแพร่กระจาย :* ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคตะวันออกและภาคใต้ *อ้างอิงจาก :* โอบาส (2543); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

396. อีแร้งดำหิมาลัย (Cinereous Vulture) *Aegypius monachus* (Linnaeus, 1766)

AEGYMO

Type locality: แหลมอาระเบีย (ทางตะวันออกเฉียงใต้ของเอเชีย) *การแพร่กระจาย :* ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคตะวันออกและภาคใต้ *อ้างอิงจาก :* โอบาส (2543); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

397. พญาแร้ง (Red-headed Vulture) *Sarcogyps calvus* (Scopoli, 1786) SARCCA

Type locality: เมือง Pondicherry ประเทศอินเดีย *การแพร่กระจาย :* ภาคตะวันตก *อ้างอิงจาก :* จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008); โอบาส (2543)

398. เหยี่ยวนิ้วสั้น (Short-toed Snake Eagle) *Circaetus gallicus* (Gmelin, 1788) CRICGA

Type locality: ประเทศฝรั่งเศส *การแพร่กระจาย :* ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก และภาคใต้ *อ้างอิงจาก :* โอบาส (2543); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

399. เหยี่ยวรุ้ง (Crested Serpent Eagle) *Spilornis cheela* (Latham, 1790) SPILCH

Type locality: เมือง Lucknow ประเทศอินเดีย *การแพร่กระจาย :* ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออกและภาคใต้ *อ้างอิงจาก :* โอบาส (2543); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

400. เหยี่ยวผึ้ง (Oriental Honey-buzzard) *Pernis ptilorhyncus* (Temminck, 1821)

PERNPT

Type locality: เกาะชวา ประเทศอินโดนีเซีย *การแพร่กระจาย :* ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคตะวันออกและภาคใต้ *อ้างอิงจาก :* โอภาส (2543); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

401. เหยี่ยวทุ่งพันธุเรเซีย (Eurasian Marsh Harrier) *Circus aeruginosus* (Linnaeus, 1758)

CIRCAE

Type locality: ประเทศฟิลิปปินส์ *การแพร่กระจาย :* ภาคกลาง *อ้างอิงจาก :* โอภาส (2543); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

402. เหยี่ยวทุ่งพันธุเอเซียตะวันออก (Eastern Marsh-Harrier) *Circus spilonotus* Kaup, 1847

CIRCSP

Type locality: ประเทศฟิลิปปินส์ *การแพร่กระจาย :* ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคตะวันออกและภาคใต้ *อ้างอิงจาก :* โอภาส (2543); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

403. เหยี่ยวทุ่งแถบเหนือ (Hen Harrier) *Circus cyaneus* (Linnaeus, 1766) CIRCCY

Type locality: นครลอนดอน ประเทศอังกฤษ *การแพร่กระจาย :* ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ *อ้างอิงจาก :* โอภาส (2543); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

404. เหยี่ยวทุ่งสีจาง (Pallid Harrier) *Circus macrourus* (Gmelin, 1770) CIRCMA

Type locality: ประเทศรัสเซีย *การแพร่กระจาย :* ภาคใต้ *อ้างอิงจาก :* โอภาส (2544ข); จารุจินต์ และคณะ (2550)

405. เหยี่ยวต่างดำขาว (Pied Harrier) *Circus melanoleucos* (Pennant, 1769) CIRCME

Type locality: ประเทศศรีลังกา *การแพร่กระจาย :* ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกและภาคใต้ *อ้างอิงจาก :* โอภาส (2543); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

406. เหยี่ยวนกเขาชิดรา (Shikra) *Accipiter badius* (Gmelin, 1788) ACCIBA

Type locality: ประเทศศรีลังกา *การแพร่กระจาย* : ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคตะวันออกและภาคใต้ *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2543); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

407. เหยี่ยวนกระจอกเล็ก (Besra) *Accipiter virgatus* (Temminck, 1822) ACCIVI

Type locality: เกาะชวา ประเทศอินโดนีเซีย *การแพร่กระจาย* : ภาคเหนือ ภาคตะวันตก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2543); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

408. เหยี่ยวนกระจอกจีน (Chinese Sparrowhawk) *Accipiter soloensis* (Horsfield, 1821) ACCISO

Type locality: เมืองSolo (Surakarta) บนเกาะชวา ประเทศอินโดนีเซีย *การแพร่กระจาย* : ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคตะวันออกและภาคใต้ *อ้างอิงจาก* : จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008); โอภาส (2543)

409. เหยี่ยวนกระจอกญี่ปุ่น (Japanese Sparrowhawk) *Accipiter gularis* (Temminck & Schlegel, 1844) ACCIGU

Type locality: ประเทศญี่ปุ่น *การแพร่กระจาย* : ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคตะวันออกและภาคใต้ *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2543); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

410. เหยี่ยวนกระจอกหงอน (Crested Goshawk) *Accipiter trivergatus* (Temminck, 1824) ACCITR

Type locality: เกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย *การแพร่กระจาย* : ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออกและภาคใต้ *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2543); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

411. เหยี่ยวนกระจอกใหญ่ (Eurasian Sparrowhawk) *Accipiter nisus* (Linnaeus, 1758) ACCINI

Type locality: ประเทศสวีเดน *การแพร่กระจาย* : ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2543); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

412. เหยี่ยวนกเขาท้องขาว (Northern Goshawk) *Accipiter gentilis* (Linnaeus, 1758)

ACCIGE

Type locality: ประเทศสวีเดน *การแพร่กระจาย* : ภาคเหนือ *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2543); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

วงศ์เหยี่ยวและนกอินทรี (Family Accipitridae)

413. เหยี่ยวทะเลทราย (Common Buzzard) *Buteo buteo* (Linnaeus, 1758) **BUTEBU**

Type locality: ประเทศสวีเดน *การแพร่กระจาย* : ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคตะวันออกและภาคใต้ *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2543); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

414. เหยี่ยวหน้าเทา (Grey-faced Buzzard) *Butastur indicus* (Gmelin, 1788) **BUTAIN**

Type locality: เกาะชวา ประเทศอินโดนีเซีย *การแพร่กระจาย* : ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคตะวันออกและภาคใต้ *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2543); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

415. เหยี่ยวปีกแดง (Rufous-winged Buzzard) *Butastur liventer* (Temminck, 1827) **BUTALI**

Type locality: เกาะสุลาเวซี ประเทศอินโดนีเซีย *การแพร่กระจาย* : ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ ภาคตะวันตก *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2543); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008); Pratumthong *et al.*, (2007)

416. นกอินทรีดำ (Black Eagle) *Ictinaetus malayensis* (Temminck, 1822) **ICTIMA**

Type locality: เกาะชวา ประเทศอินโดนีเซีย *การแพร่กระจาย* : ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออกและภาคใต้ *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2543); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

417. นกอินทรีแถบปีกดำ (Bonelli's Eagle) *Hieraetus fasciatus* (Vieillot, 1822) **HIERFA**

Type locality: Montpellier ทางภาคใต้ของประเทศฝรั่งเศส *การแพร่กระจาย* : ภาคเหนือ *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2543); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

- 418. นกอินทรีเล็ก (Booted Eagle) *Hieraaetus pennatus* (Gmelin, 1788) HIERPE**
*Type locality:*ประเทศสเปน *การแพร่กระจาย :*ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก และภาคใต้ *อ้างอิงจาก :*โอภาส (2543);จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)
- 419. เหยี่ยวท้องแดง (Rufous-bellied Eagle) *Hieraaetus kienerii* (Geoffroy Saint-Hilaire, 1835) HIERKI**
*Type locality:*เทือกเขาหิมาลัย *การแพร่กระจาย :*ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออกและภาคใต้ *อ้างอิงจาก :*โอภาส (2543);จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)
- 420. นกอินทรีปีกลาย (Greater Spotted Eagle) *Aquila clanga* Pallas, 1811 AQUICL**
*Type locality:*ไซบีเรีย ประเทศรัสเซีย *การแพร่กระจาย :*ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก และภาคใต้ *อ้างอิงจาก :*โอภาส (2543);จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)
- 421. นกอินทรีทุ่งหญ้าสเตปป์ (Steppe Eagle) *Aquila nipalensis* (Hodgson, 1833) AQUINI**
*Type locality:*ประเทศเนปาล *การแพร่กระจาย :*ภาคกลาง และภาคใต้ *อ้างอิงจาก :*โอภาส (2543);จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)
- 422. นกอินทรีหัวไหล่ขาว (Imperial Eagle) *Aquila heliaca* Savigny, 1809 AQUIHE**
*Type locality:*ตอนบนของประเทศอียิปต์*การแพร่กระจาย :*ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก และภาคตะวันออก *อ้างอิงจาก :*จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008); โอภาส (2543)
- 423. เหยี่ยวต่างสี (Changeable Hawk Eagle) *Spizaetus cirrbatus* (Gmelin,1788) SPIZLI**
*Type locality:*ประเทศศรีลังกา *การแพร่กระจาย :*ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออกและภาคใต้ *อ้างอิงจาก :*โอภาส (2543);จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)
- 424. เหยี่ยวภูเขา (Mountain Hawk Eagle) *Spizaetus nipalensis* (Hodgson, 1836) SPIZNI**
*Type locality:*ประเทศเนปาล *การแพร่กระจาย :*ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก และภาคใต้ *อ้างอิงจาก :*โอภาส (2543);จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

425. เหยี่ยวดำท้องขาว (Blyth's Hawk Eagle) *Spizaetus alboniger* (Blyth, 1845) SPIZAL
Type locality: ประเทศมาเลเซีย *การแพร่กระจาย* :ภาคใต้ *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2543); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

426. เหยี่ยวสีน้ำตาลท้องขาว (Wallace's Hawk – Eagle) *Spizaetus nanus* Wallace, 1868
 SPIZNA

Type locality: รัฐซาราวัก ประเทศมาเลเซีย *การแพร่กระจาย* :ภาคใต้ *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2543); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

วงศ์เหยี่ยวออสเปร (Pandionidae)

427. เหยี่ยวออสเปร (Osprey) *Pandion haliaetus* (Linnaeus, 1758) PANDHA
Type locality: ประเทศสวีเดน *การแพร่กระจาย* :ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคตะวันออกและภาคใต้ *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2543); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

วงศ์เหยี่ยวเล็ก (Family Falconidae)

428. เหยี่ยวแมลงปอขาแดง (Collared Falconet) *Microhierax caerulescens* (Linnaeus, 1758)
 MICRCA

Type locality: รัฐเบงกอล ประเทศอินเดีย *การแพร่กระจาย* :ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก และภาคตะวันออก *จาก* : โอภาส (2543); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

429. เหยี่ยวแมลงปอขาดำ (Black-thighed Falconet) *Microhierax fringillarius* (Drapiez, 1824)
 MICRFR

Type locality: เกาะชวา ประเทศอินโดนีเซีย *การแพร่กระจาย* :ภาคตะวันตก และภาคใต้ *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2543); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

430. เหยี่ยวเล็กตะโพกขาว (White-rumped Falcon) *Polihierax insignis* Walden, 1872 POLIIN
Type locality: เมืองตองอู ประเทศพม่า *การแพร่กระจาย* :ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันตก *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2543); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

431. เหยี่ยวค้ำคาว (Bat Hawk) *Macheiramphus alcinus* Westerman, 1851 MACHAL

Type locality: ประเทศมาเลเซีย *การแพร่กระจาย:* ภาคใต้ *อ้างอิงจาก:* โอภาส (2543); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

432. เหยี่ยวkestrel (Common Kestrel) *Falco tinnunculus* Linnaeus, 1758 FALOTI

Type locality: ประเทศสวีเดน *การแพร่กระจาย:* ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคตะวันออกและภาคใต้ *อ้างอิงจาก:* โอภาส (2543); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

433. เหยี่ยวเมอร์ลิน (Merlin) *Falco columbarius* Linnaeus, 1758 FALCCO

การแพร่กระจาย: ภาคเหนือ *Type locality:* ประเทศสวีเดน *อ้างอิงจาก:* โอภาส (2543); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

434. เหยี่ยวตีแดง (Amur Falcon) *Falco amurensis* Radde, 1863 FALCAM

Type locality: ดินแดน Amur ทางตะวันออกของประเทศรัสเซีย *การแพร่กระจาย:* ภาคเหนือ ภาคตะวันตก และภาคตะวันออก *อ้างอิงจาก:* โอภาส (2543); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

435. เหยี่ยวฮอบบี้พันธุ์ยุโรป (Eurasian Hobby) *Falco subbuteo* Linnaeus, 1758 FALCSU

Type locality: ประเทศสวีเดน *การแพร่กระจาย:* ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง *อ้างอิงจาก:* โอภาส (2543); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

436. เหยี่ยวฮอบบี้พันธุ์เอเชีย (Oriental Hobby) *Falco severus* Horsfield, 1821 FALCSE

Type locality: เกาะชวา ประเทศอินโดนีเซีย *การแพร่กระจาย:* ภาคเหนือ ภาคตะวันตก และภาคใต้ *อ้างอิงจาก:* โอภาส (2543); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

437. เหยี่ยวเพเรกริน (Peregrine Falcon) *Falco peregrinus* Tunstall, 1771 FALCPE

Type locality: สหราชอาณาจักร *การแพร่กระจาย:* ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก และภาคใต้ *อ้างอิงจาก:* โอภาส (2543); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

วงศ์นกร่อนทะเล (Family Phaethontidae)

438. นกร่อนทะเลหางแดง (Red-tailed Tropicbird) *Phaethon rubricauda* Boddaert, 1783

PHAERU

Type locality: เกาะมอริเชียส *การแพร่กระจาย:* ภาคใต้ *อ้างอิงจาก:* โอบาส (2543); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

439. นกร่อนทะเลหางขาว (White-tailed Tropicbird) *Phaethon lepturus* Daudin, 1802**PHAELE**

Type locality: เกาะมอริเชียส *การแพร่กระจาย:* ภาคใต้ *อ้างอิงจาก:* โอบาส (2543); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

วงศ์นกบูบี (Family Sulidae)**440. นกบูบีหน้าดำ (Masked Booby) *Sula dactylatra* Lesson, 1831 SULADA**

Type locality: ทะเลแคริบเบียน *การแพร่กระจาย:* ภาคกลาง และภาคใต้ *อ้างอิงจาก:* โอบาส (2543); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

441. นกบูบีตีนแดง (Red-footed Booby) *Sula sula* (Linnaeus, 1766) SULASU

Type locality: ทะเลแคริบเบียน *การแพร่กระจาย:* ภาคใต้ *อ้างอิงจาก:* โอบาส (2543); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

442. นกบูบีสีน้ำตาล (Brown Booby) *Sula leucogaster* (Boddaert, 1783) SULALE

Type locality: ทะเลแคริบเบียน *การแพร่กระจาย:* ภาคกลาง และภาคใต้ *อ้างอิงจาก:* โอบาส (2543); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

วงศ์นกเป็ดผี (Family Podicipedidae)**443. เป็ดผีเล็ก (Little Grebe) *Tachybaptus ruficollis* (Pallas, 1764) TACHRU**

Type locality: ประเทศเนเธอร์แลนด์ *การแพร่กระจาย:* ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคตะวันออกและภาคใต้ *อ้างอิงจาก:* โอบาส (2543); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

444. เป็ดผีใหญ่ (Great Crested Grebe) *Podiceps cristatus* (Linnaeus, 1758) PODICR

Type locality: สวีเดน *การแพร่กระจาย:* ภาคเหนือ *อ้างอิงจาก:* โอบาส (2543); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

445. เป็ดคิอดดำ (Black-necked Grebe) *Podiceps nigricollis* C.L.Brehm, 1831 **PODINI**
Type locality: ประเทศเยอรมันการแพร่กระจาย : ภาคกลาง อ้างอิงจาก : จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

วงศ์นกอ้ายจ้าว (Family Anhingidae)

446. นกอ้ายจ้าว (Oriental Darter) *Anhinga melanogaster* Pennant, 1769 **ANHIME**
Type locality: ประเทศศรีลังกา การแพร่กระจาย : ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก และภาคตะวันออก อ้างอิงจาก : จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008); โอภาส (2543)

วงศ์นกกาน้ำ (Family Phalacrocoracidae)

447. นกกาน้ำเล็ก (Little Cormorant) *Phalacrocorax niger* (Vieillot, 1817) **PHALNI**
Type locality: รัฐเบงกอล ประเทศอินเดีย การแพร่กระจาย : ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคตะวันออกและภาคใต้ อ้างอิงจาก : โอภาส (2543); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

448. นกกาน้ำปากยาว (Indian Cormorant) *Phalacrocorax fuscicollis* Stephens, 1826 **PHALFU**

Type locality: ประเทศอินเดีย การแพร่กระจาย : ภาคกลาง อ้างอิงจาก : โอภาส (2543); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

449. นกกาน้ำใหญ่ (Great Cormorant) *Phalacrocorax carbo* (Linnaeus, 1758) **PHALCA**
Type locality: ประเทศสวีเดน การแพร่กระจาย : ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันตก อ้างอิงจาก : โอภาส (2543); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

วงศ์นกยาง (Family Ardeidae)

450. นกยางเปีย (Little Egret) *Egretta garzetta* (Linnaeus, 1758) **EGREGA**
Type locality: ประเทศอิตาลี การแพร่กระจาย : ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคตะวันออกและภาคใต้ อ้างอิงจาก : โอภาส (2543); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

451. นกยางจีน (Chinese Egret) *Egretta eulophotes* (Swinhoe, 1860) **EGREEU**

Type locality: ประเทศจีน *การแพร่กระจาย* : ภาคใต้ *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2543); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

452. นกยางทะเล (Pacific Reef Egret) *Egretta sacra* (Gmelin, 1789) **EGRESA**

Type locality: ประเทศตาลีตี *การแพร่กระจาย* : ภาคกลาง ภาคตะวันออกและภาคใต้ *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2543); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

453. นกยางโทนใหญ่ (Great Egret) *Casmerodius albus* (Linnaeus, 1758) **CASMAL**

Type locality: ประเทศสวีเดน *การแพร่กระจาย* : ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก และภาคใต้ *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2543); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

454. นกยางควาย (Cattle Egret) *Bubulcus ibis* (Linnaeus, 1758) **BUBUIB**

Type locality: ประเทศอียิปต์ *การแพร่กระจาย* : ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก และภาคใต้ *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2543); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

455. นกยางโทนน้อย (Intermediate Egret) *Mesophoyx intermedia* (Wagler, 1829) **MESOIN**

Type locality: เกาะชวา ประเทศอินโดนีเซีย *การแพร่กระจาย* : ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก และภาคใต้ *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2543); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

456. นกกระสาขาว (Grey Heron) *Ardea cinerea* Linnaeus, 1758 **ARDECI**

Type locality: ประเทศสวีเดน *การแพร่กระจาย* : ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก และภาคใต้ *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2543); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

457. นกกระสาใหญ่ (Great-billed Heron) *Ardea sumatrana* Raffles, 1822 **ARDESU**

Type locality: เกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย *การแพร่กระจาย* : ภาคตะวันออกและภาคใต้ *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2543); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

458. นกกระสาแดง (Purple Heron) *Ardea purpurea* Linnaeus, 1766 **ARDEPU**

Type locality:ประเทศฝรั่งเศส **การแพร่กระจาย :**ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคตะวันออกและภาคใต้ **อ้างอิงจาก :**โอภาส (2543);จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

459. นกยางกรอกพันธุ์อินเดีย (Indian Pond Heron) *Ardeola grayii* (Sykes, 1832) ARDEGR

Type locality:ประเทศอินเดีย**การแพร่กระจาย :**ภาคกลาง และภาคใต้ **อ้างอิงจาก :**โอภาส (2543);จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

460. นกยางกรอกพันธุ์จีน (Chinese Pond Heron) *Ardeola bacchus* (Bonaparte, 1855)

ARDEBA

Type locality:ประเทศมาเลเซีย **การแพร่กระจาย :**ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคตะวันออกและภาคใต้ **อ้างอิงจาก :**โอภาส (2543);จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

461. นกยางกรอกพันธุ์ชวา (Javan Pond Heron) *Ardeola speciosa* (Horsfield, 1821)

ARDESP

Type locality:เกาะชวา ประเทศอินโดนีเซีย **การแพร่กระจาย :**ภาคกลาง และภาคใต้ **อ้างอิงจาก :**โอภาส (2543);จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

462. นกยางเขียว (Little Heron) *Butorides striatus* (Linnaeus, 1758)

BUTOST

Type locality:สาธารณรัฐซูรินาม ทวีปอเมริกาใต้ **การแพร่กระจาย :**ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคตะวันออกและภาคใต้ **อ้างอิงจาก :**โอภาส (2543);จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

463. นกยางดำ (Black Bittern) *Dupetor flavicollis* (Latham, 1790)

DUPEFL

Type locality:ประเทศอินเดีย **การแพร่กระจาย :**ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตกและภาคใต้ **อ้างอิงจาก :**โอภาส (2543);จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

464. นกแขวก (Black-crowned Night Heron) *Aycticorax nycticorax* (Linnaeus, 1758)

AYCTNY

*Type locality:*ทางตอนใต้ของยุโรป *การแพร่กระจาย* :ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ *อ้างอิงจาก* :โอภาส (2543);จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

465. นกยางลายเสือ (Malayan Night Heron) *Gorsachius melanolophus* (Raffles, 1822)

GORSME

*Type locality:*เกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย *การแพร่กระจาย* :ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ *อ้างอิงจาก* :โอภาส (2543);จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

466. นกยางไฟหัวดำ (Yellow Bittern) *Ixobrychus sinensis* (Gmelin, 1789) IXOBSI

*Type locality:*ประเทศจีน *การแพร่กระจาย* :ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก และภาคใต้ *อ้างอิงจาก* :โอภาส (2543);จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

467. นกยางไฟหัวเทา (Von Schrenck's Bittern) *Ixobrychus eurhythmus* (Swinhoe, 1873)

IXOBEU

*Type locality:*ประเทศจีน*การแพร่กระจาย* :ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก และภาคใต้ *อ้างอิงจาก* :โอภาส (2543);จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

468. นกยางไฟธรรมดา (Cinnamon Bittern) *Ixobrychus cinnamomeus* (Gmelin, 1789)

IXOBCI

*Type locality:*ประเทศจีน *การแพร่กระจาย* :ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ *อ้างอิงจาก* :โอภาส (2543);จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

469. นกยางแดงใหญ่ (Great Bittern) *Botaurus stellaris* (Linnaeus, 1758) BOTAST

*Type locality:*ประเทศสวีเดน *การแพร่กระจาย* :ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันตก *อ้างอิงจาก* :โอภาส (2543);จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

วงศ์นกกุลลาและนกปากช้อน (Family Threskiornithidae)

470. นกช้อนหอยดำเหลือบ (Glossy Ibis) *Plegadis falcinellus* (Linnaeus, 1766) PLEGFA

*Type locality:*ประเทศออสเตรเลียและอิตาลี *การแพร่กระจาย* :ภาคกลาง และภาคใต้

อ้างอิงจาก : โอลภาส (2543); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

471. นกช้อนหอยขาว, นกกุลา (Black-headed Ibis) *Threskiornis melanocephalus* (Latham, 1790)

THREME

Type locality: ประเทศอินเดีย *การแพร่กระจาย* : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก และภาคใต้ *อ้างอิงจาก* : โอลภาส (2543); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

472. นกช้อนหอยดำ (White-shouldered Ibis) *Pseudibis davisoni* (Hume, 1875) PSEUDA

Type locality: บริเวณปากน้ำ Pak Chan, เมืองตะนาวศรี ประเทศพม่า (Pak Chan estuary, Tenasserim) *การแพร่กระจาย* : ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ *อ้างอิงจาก* : จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

473. นกช้อนหอยใหญ่ (Giant Ibis) *Pseudibis gigantea* (Oustalet, 1877) PSEUGI

Type locality: ประเทศเวียดนาม *การแพร่กระจาย* : ภาคตะวันตก และภาคใต้ *อ้างอิงจาก* : โอลภาส (2543); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

474. นกปากช้อนหน้าขาว (Eurasian Spoonbill) *Platalea leucorodia* Linnaeus, 1758 PLATLE

Type locality: ทวีปยุโรป *การแพร่กระจาย* : ภาคเหนือ *อ้างอิงจาก* : โอลภาส (2543); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

475. นกปากช้อนหน้าดำ (Black-faced Spoonbill) *Platalea minor* Temminck & Schlegel, 1849

PLATMI

Type locality: ประเทศญี่ปุ่น *การแพร่กระจาย* : ภาคกลาง และภาคใต้ *อ้างอิงจาก* : โอลภาส (2543); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

วงศ์นกกระทุง (Family Pelecanidae)

476. นกกระทุง (Spot-billed Pelican) *Pelecanus philippensis* Gmelin, 1789 PELEPH

Type locality: กรุงเทพมหานคร ประเทศฟิลิปปินส์ *การแพร่กระจาย* : ภาคกลาง และภาคใต้ *อ้างอิงจาก* : โอลภาส (2543); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

วงศ์นกกระสา และนกตะกรุม (Family Ciconiidae)

477. นกกระสาปากเหลือง (Milky Stork) *Mycteria cinerea* (Raffles, 1822) MYCTCI
Type locality: เกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย *การแพร่กระจาย*: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ *อ้างอิงจาก*: โอภาส (2543); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)
478. นกกาบบัว (Painted Stork) *Mycteria leucocephala* (Pennant, 1769) MYCTLE
Type locality: ประเทศศรีลังกา *การแพร่กระจาย*: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ *อ้างอิงจาก*: โอภาส (2543); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)
479. นกตะกรุม (Lesser Adjutant) *Leptoptilos javanicus* (Horsfield, 1821) LEPTJA
Type locality: เกาะชวา ประเทศอินโดนีเซีย *การแพร่กระจาย*: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ *อ้างอิงจาก*: โอภาส (2543); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)
480. นกตะกราม (Greater Adjutant) *Leptoptilos dubius* (Gmelin, 1789) LEPTDU
Type locality: ประเทศอินเดีย *การแพร่กระจาย*: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก และภาคใต้ *อ้างอิงจาก*: โอภาส (2543); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)
481. นกปากห่าง (Asian Openbill) *Anastomus oscitans* (Boddaert, 1783) ANASOS
Type locality: เมือง Pondicherry ประเทศอินเดีย *การแพร่กระจาย*: ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก และภาคใต้ *อ้างอิงจาก*: โอภาส (2543); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)
482. นกกระสาดำ (Black Stork) *Ciconia nigra* (Linnaeus, 1758) CICONI
Type locality: ประเทศสวีเดน *การแพร่กระจาย*: ภาคเหนือ *อ้างอิงจาก*: โอภาส (2543); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)
483. นกกระสาคอขาว (Woolly-necked Stork) *Ciconia episcopus* (Boddaert, 1783) CICOEP
Type locality: ชายฝั่งทะเล Coromandel *การแพร่กระจาย*: ภาคตะวันตก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ *อ้างอิงจาก*: โอภาส (2543); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

484. นกกระสาคอขาวปากแดง (Storm's Stork) *Ciconia stormi* (Blasius, 1896) **CICOST**

Type locality: เกาะบอร์เนียว ประเทศอินโดนีเซีย *การแพร่กระจาย* : ภูมิภาคใต้ *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2543); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

485. นกกระสาขาว (White Stork) *Ciconia ciconia* (Linnaeus, 1758) **CICOCI**

Type locality: ประเทศสวีเดน *การแพร่กระจาย* : ภาคกลาง *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2543); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

486. นกกระสาคอดำ (Black-necked Stork) *Ephippiorhynchus asiaticus* (Latham, 1790)

EPHIAS

Type locality: ประเทศอินเดีย *การแพร่กระจาย* : ภูมิภาคใต้ *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2543); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

วงศ์นกโจรสลัด (Family Fregatidae)

487. นกโจรสลัดใหญ่ (Great Frigatebird) *Fregata minor* (Gmelin, 1789) **FREGMI**

Type locality: ประเทศอินโดนีเซีย *การแพร่กระจาย* : ภาคกลาง และภาคใต้ *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2543); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

488. นกโจรสลัดเล็ก (Lesser Frigatebird) *Fregata ariel* (Gray, 1845) **FREGAR**

Type locality: เกาะคริสต์มาส มหาสมุทรอินเดีย *การแพร่กระจาย* : ภูมิภาคใต้ *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2543); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

489. นกโจรสลัดเกาะคริสต์มาส (Christmas Island Frigatebird) *Fregata andrewsi* Mathews, 1914 **FREGAN**

Type locality: เกาะคริสต์มาส มหาสมุทรอินเดีย *การแพร่กระจาย* : ภาคกลาง และภาคใต้ *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2543); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

วงศ์นกจุมกหลอด (Family Procellariidae)

490. นกจุมกหลอดลาย (Streaked Shearwater) *Calonectris leucomelas* (Temminck, 1835)

CALOLE

Type locality: ประเทศญี่ปุ่น *การแพร่กระจาย* : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2543); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

491. นกจุมพิตหางพลั่ว (Wedge-tailed Shearwater) *Puffinus pacificus* (Gmelin, 1789)

PUFFPA

Type locality: มหาสมุทรแปซิฟิก *การแพร่กระจาย* : ภาคกลาง *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2544ก); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

492. นกจุมพิตหางสั้น (Short-tailed Shearwater) *Puffinus tenuirostris* (Temminck, 1835)

PUFFTE

Type locality: ประเทศญี่ปุ่น *การแพร่กระจาย* : ภาคกลาง และภาคใต้ *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2543); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

วงศ์นกโต้คลื่น (Family Hydrobatidae)

493. นกโต้คลื่นสีคล้ำ (Swinhoe's Storm-petrel) *Oceanodroma monorhis* (Swinhoe, 1867)

OCEAMO

Type locality: ประเทศจีน *การแพร่กระจาย* : ภาคใต้ *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2543); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

อันดับนกจับคอน (Order Passeriformes)

วงศ์นกแต้วแร้ว (Family Pittidae)

494. นกแต้วแร้วหูยาว (Eared Pitta) *Pitta phayrei* (Blyth, 1863)

PITTPH

Type locality: เมืองพะโค ประเทศพม่า *การแพร่กระจาย* : ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก และภาคตะวันออก *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2544ก); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

495. นกแต้วแร้วใหญ่หัวสีน้ำเงิน (Blue-rumped Pitta) *Pitta sroror* Wardlaw-Ramsay, 1881

PITTSOR

Type locality: เมืองโฮจิมิน (ไซ่ง่อน) ทางตอนใต้ประเทศเวียดนาม *การแพร่กระจาย* : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2544ก); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

496. นกตัวแร้วใหญ่หัวสีน้ำตาล (Rusty-naped Pitta) *Pitta oatesi* (Hume, 1873) PITTOA

Type locality: เมืองพะโค ประเทศพม่า *การแพร่กระจาย* : ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก และภาคใต้ *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2544ก); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

497. นกตัวแร้วใหญ่ท้ายทอยสีฟ้า (Blue-naped Pitta) *Pitta nipalensis* (Hodgson, 1837) PITTNI

Type locality: ประเทศเนปาล *การแพร่กระจาย* : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ *อ้างอิงจาก* : สมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย (2554)

498. นกตัวแร้วยักษ์, นกขุ่มหมุย (Giant Pitta) *Pitta caerulea* (Raffles, 1822)

PITTCA

Type locality: เกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย *การแพร่กระจาย* : ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคตะวันออกและภาคใต้ *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2544ก); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

499. นกตัวแร้วสีน้ำเงิน (Blue Pitta) *Pitta cyanea* Blyth, 1843

PITTCY

Type locality: เมือง Arakan ประเทศพม่า *การแพร่กระจาย* : ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออกและภาคใต้ *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2544ก); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

500. นกตัวแร้วลาย (Banded Pitta) *Pitta guajana* (Mueller, 1776)

PITTGU

Type locality: จังหวัดตรัง ประเทศไทย *การแพร่กระจาย* : ภาคใต้ *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2544ก); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

501. นกตัวแร้วเขียวเขมร (Bar-bellied Pitta) *Pitta elliotii* Oustalet, 1874

PITTEL

Type locality: ประเทศกัมพูชา *การแพร่กระจาย* : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2544ก); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

502. นกตัวแร้วท้องดำ (Gurney's Pitta) *Pitta gurneyi* Hume, 1875

PITTGU

*Type locality:*เมืองตะนาวศรี ทางตอนใต้ของประเทศพม่า *การแพร่กระจาย* :ภาคใต้
อ้างอิงจาก :โอภาส (2544ก);จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

503. นกตัวแร้วอกเขียว (Hooded Pitta) *Pitta sordida* (Mueller, 1776) PITTSD

*Type locality:*ประเทศมาเลเซีย *การแพร่กระจาย* : ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง
 ภาคตะวันตก ภาคตะวันออกและภาคใต้ *อ้างอิงจาก* :โอภาส (2544ก);จารุจินต์ และคณะ (2550);
 Robson (2008)

504. นกตัวแร้วนางฟ้า (Fairy Pitta) *Pitta nympha* Temminck and Schlegel, 1850 PITTNY

Type locality: ประเทศเกาหลี *การแพร่กระจาย* : ภาคกลาง *อ้างอิงจาก* :สมาคมอนุรักษ์นกและ
 ธรรมชาติแห่งประเทศไทย (2554)

505. นกตัวแร้วแดงมลายู (Garnet Pitta) *Pitta granatina* Temminck, 1830 PITTGR

*Type locality:*เกาะบอร์เนียว ประเทศอินโดนีเซีย*การแพร่กระจาย* :ภาคใต้ *อ้างอิงจาก* :โอภาส
 (2544ก);จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

506. นกตัวแร้วธรรมดา,นกกอหลอ (Blue-winged Pitta) *Pitta moluccensis* (Mueller, 1776.
 PITTMO

*Type locality:*เมืองMalacca ประเทศมาเลเซีย, บ้างก็กล่าวว่าเป็นตะนาวศรี ทางตอนใต้ของ
 ประเทศพม่า*การแพร่กระจาย* :ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาค
 ตะวันออกและภาคใต้ *อ้างอิงจาก* :โอภาส (2544ก);จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

507. นกตัวแร้วป่าชายเลน (Mangrove Pitta) *Pitta megarhyncha* Schlegel, 1863 PITTME

*Type locality:*Bangka*การแพร่กระจาย* :ภาคใต้ *อ้างอิงจาก* :โอภาส (2544ก);จารุจินต์ และคณะ
 (2550); Robson (2008)

วงศ์นกพญาปากกว้าง (Family Eurylaimidae)

508. นกพญาปากกว้างสีดำ (Dusky Broadbill) *Corydon sumatranus* (Raffles, 1822) CORYSU

*Type locality:*เกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย *การแพร่กระจาย* :ภาคเหนือ ภาค
 ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออกและภาคใต้ *อ้างอิงจาก* :โอภาส (2544ก);จารุ
 จินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

509. นกพญาปากกว้างท้องแดง (Black-and-red Broadbill) *Cymbirhynchus macrorhynchos* (Gmelin, 1788) CYMBMA

Type locality: เกาะบอร์เนียว ประเทศอินโดนีเซีย *การแพร่กระจาย:* ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออกและภาคใต้ *อ้างอิงจาก:* โอภาส (2544ก); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

510. นกพญาปากกว้างลายเหลือง (Banded Broadbill) *Eurylaimus javanicus* Horsfield, 1821 EURYJA

Type locality: เกาะชวา ประเทศอินโดนีเซีย *การแพร่กระจาย:* ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออกและภาคใต้ *อ้างอิงจาก:* โอภาส (2544ก); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

511. นกพญาปากกว้างเล็ก (Black-and-yellow Broadbill) *Eurylaimus ochromalus* Raffles, 1822 EURYOC

Type locality: ประเทศสิงคโปร์ *การแพร่กระจาย:* ภาคตะวันตก และภาคใต้ *อ้างอิงจาก:* โอภาส (2544ก); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

512. นกพญาปากกว้างอกสีเงิน (Silver-breasted Broadbill) *Serilophus lunatus* (Gould, 1834) SERILU

Type locality: เมืองพะโล ประเทศพม่า *การแพร่กระจาย:* ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออกและภาคใต้ *อ้างอิงจาก:* โอภาส (2544ก); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

513. นกพญาปากกว้างหางยาว (Long-tailed Broadbill) *Psarisomus dalhousiae* (Jameson, 1835) PSARDA

Type locality: ประเทศอินเดียตอนเหนือ *การแพร่กระจาย:* ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออกและภาคใต้ *อ้างอิงจาก:* โอภาส (2544ก); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

514. นกเขียวปากงุ้ม (Green Broadbill) *Calyptomena viridis* Raffles, 1822 CALYVI

Type locality: เกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย *การแพร่กระจาย :* ภาคตะวันตก และภาคใต้
อ้างอิงจาก : โอภาส (2544ก); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

วงศ์นกเขี้ยวคราม (Family Irenidae)

515. นกเขี้ยวคราม (Asian Fairy Bluebird) *Irena puella* (Latham, 1790) IRENPU

Type locality: ประเทศอินเดีย *การแพร่กระจาย :* ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก
 ภาคตะวันออกและภาคใต้ *อ้างอิงจาก :* โอภาส (2544ก); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

วงศ์นกเขี้ยวก้านทอง (Family Chloropseidae)

**516. นกเขี้ยวก้านทองใหญ่ (Greater Green Leafbird) *Chloropsis sonnerati* Jardine and Selby,
 1827 CHLOSO**

Type locality: เกาะชวา ประเทศอินโดนีเซีย *การแพร่กระจาย :* ภาคตะวันตก และภาคใต้ *อ้างอิงจาก :*
 โอภาส (2544ก); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

**517. นกเขี้ยวก้านทองเล็ก (Lesser Green Leafbird) *Chloropsis cyanopogon* (Temminck, 1829
 CHLOCY**

Type locality: เกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย *การแพร่กระจาย :* ภาคตะวันตก และภาคใต้
อ้างอิงจาก : โอภาส (2544ก); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

**518. นกเขี้ยวก้านทองปีกสีฟ้า (Blue-winged Leafbird) *Chloropsis cochinchinensis* (Gmelin,
 1788 CHLOCO**

Type locality: Cochin China ทางตอนใต้ของประเทศเวียดนาม *การแพร่กระจาย :* ภาคเหนือ ภาค
 ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออกและภาคใต้ *อ้างอิงจาก :* โอภาส (2544ก); จารุจินต์
 และคณะ (2550); Robson, (2002)

**519. นกเขี้ยวก้านทองหน้าผากสีทอง (Golden-fronted Leafbird) *Chloropsis aurifrons*
 (Temminck, 1829) CHLOAU**

Type locality: ประเทศอินเดีย *การแพร่กระจาย :* ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก
 และภาคตะวันออก *อ้างอิงจาก :* โอภาส (2544ก); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

520. นกเขียวก้านตองท้องสีส้ม (Orange-bellied Leafbird) *Chloropsis hardwickii* Jardine & Selby, 1830 CHLOHA

Type locality: ประเทศเนปาล *การแพร่กระจาย* : ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ ภาคตะวันตก *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2544ก); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

วงศ์นกอีเสือ (Family Laniidae)

521. นกอีเสือลายเสือ (Tiger Shrike) *Lanius tigrinus* Drapiez, 1828 LANITI

Type locality: เกาะชวา ประเทศอินโดนีเซีย *การแพร่กระจาย* : ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ *อ้างอิงจาก* : จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008); โอภาส (2544)

522. นกอีเสือน้ำตาล (Brown Shrike) *Lanius cristatus* Linnaeus, 1858 LANICR

Type locality: รัฐเบงกอล ประเทศอินเดีย *การแพร่กระจาย* : ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2544ก); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

523. นกอีเสือหลังแดง (Burmese Shrike) *Lanius collurio* Lesson, 1834 LANICO

Type locality: เมืองพะโค ประเทศพม่า *การแพร่กระจาย* : ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันตก *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2544ก); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

524. นกอีเสือหัวดำ (Long-tailed Shrike) *Lanius schach* Linnaeus, 1758 LANISC

Type locality: ประเทศจีน *การแพร่กระจาย* : ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2544ก); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

525. นกอีเสือหลังเทา (Grey-backed Shrike) *Lanius tephronotus* (Vigors, 1831) LANITE

Type locality: เซิงเซาหิมาลัย ใกล้เมือง Darjeeling ประเทศอินเดีย *การแพร่กระจาย* : ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2544ก); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

วงศ์นกคอสามสี (Family Eupetidae)

526. นกคอสามสี (Rail-Babbler) *Eupetes macrocerus* Temminck, 1831 EUPEMA

Type locality: เกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย *การแพร่กระจาย* : ภาคใต้ *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2544ก); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008); โอภาส (2544)

วงศ์นกหัวโตป่าโกงกาง (Family Pachycephalidae)

527. นกโกงกางหัวโต (Mangrove Whistler) *Pachycephala grisola* (Blyht, 1843) PACHGR

Type locality: ประเทศอินเดีย *การแพร่กระจาย* : ภาคกลาง ภาคตะวันออกและภาคใต้ *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2544ก); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

วงศ์นกอีกาและนกกะลิงเขียว (Family Corvidae)

528. นกปีกลายสก็อต (Eurasian Jay) *Garrulus glandarius* (Linnaeus, 1758) GARRGL

Type locality: ประเทศสวีเดน *การแพร่กระจาย* : ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันตก *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2544ก); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

529. นกขุนแผน (Red-billed Blue Magpie) *Urocissa erythrorhyncha* (Boddaert, 1783)

UROCER

Type locality: ประเทศจีน *การแพร่กระจาย* : ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก และภาคตะวันออก *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2544ก); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

530. นกสาธิตาเขียว (Common Green Magpie) *Cissa chinensis* (Boddaert, 1783) CISSCH

Type locality: ไม่มีหลักฐานแน่นอน อาจเป็นทางตอนใต้ของประเทศไทย หรือ เมืองตะนาวศรี ทางตอนใต้ของประเทศพม่า *การแพร่กระจาย* : ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก และภาคใต้ *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2544ก); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

531. นกสาธิตาเขียวหางสั้น (Indochinese Green Magpie) *Cissa hypoleuca* Salvadori &

Giglioli, 1885 CISSHY

Type locality: ประเทศเวียดนาม *การแพร่กระจาย* : ภาคตะวันออก *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2544ก); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

532. นกกาหน้อยหงอนยาว (Crested Jay) *Platylophus galericulatus* (Cuvier, 1817) PLATGA

Type locality:ชวา ประเทศอินโดนีเซีย **การแพร่กระจาย :**ภาคตะวันตก และภาคใต้ **อ้างอิงจาก :** โอภาส (2544ก);จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

533. นกกาหน้าดำปีกขาว (Black Magpie) *Platysmurus leucopterus* (Temminck, 1824)

PLATLE

Type locality:เกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย **การแพร่กระจาย :**ภาคใต้ **อ้างอิงจาก :** โอภาส (2544ก);จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008); โอภาส (2544)

534. นกกะลิงเขียด,นกกะลิงเขียดสีน้ำตาล (Rufous Treepie) *Dendrocitta vagabunda* (Latham, 1790) DENDVA

Type locality:ประเทศอินเดีย **การแพร่กระจาย :**ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก และภาคตะวันออก **อ้างอิงจาก :** โอภาส (2544ก);จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

535. นกกะลิงเขียดสีเทา (Grey Treepie) *Dendrocitta formosae* Swinhoe, 1863 DENDFO

Type locality:เกาะฟอร์โมซา(ไต้หวัน) **การแพร่กระจาย :**ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันตก **อ้างอิงจาก :** โอภาส (2544ก);จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

536. นกกาแวน (Racket-tailed Treepie) *Crypsirina temia* (Daudin, 1800) CRYPTTE

Type locality:กรุงเทพมหานคร ประเทศอินโดนีเซีย **การแพร่กระจาย :**ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคตะวันออกและภาคใต้ **อ้างอิงจาก :** โอภาส (2544ก);จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

537. นกกะลิงเขียดหางหนาม (Ratchet-tailed Treepie) *Temnurus temnurus* (Temminck, 1825)

TEMNTE

Type locality:เมืองฮาวานา ประเทศคิวบา (Havana, Cuba)**การแพร่กระจาย :** ภาคตะวันตก **อ้างอิงจาก :** จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

538. นกสาธิตาปากดำ (Black-billed Magpie) *Pica pica* (Linnaeus) 1758 PICAPI

Type locality:ประเทศจีน **การแพร่กระจาย :**ภาคเหนือ และภาคกลาง **อ้างอิงจาก :** โอภาส (2544ก); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

539. อีกา (Large-billed Crow) *Corvus macrorhynchos* Wagler, 1827 CORVMA

Type locality: เกาะชวา ประเทศอินโดนีเซีย *การแพร่กระจาย* : ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคตะวันออกและภาคใต้ *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2544ก); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

540. อีแก (House Crow) *Corvus splendens* Vieillot, 1817. CORVSP

Type locality: รัฐเบงกอล ประเทศอินเดีย *การแพร่กระจาย* : ภาคใต้ *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2544ก); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

วงศ์นกแอ่นพง (Family Artamidae)

541. นกแอ่นพง (Ashy Woodswallow) *Artamus fuscus* Vieillot, 1817 ARTAFU

Type locality: รัฐเบงกอล ประเทศอินเดีย *การแพร่กระจาย* : ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก และภาคตะวันออก *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2544ก); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

วงศ์นกขมิ้น (Family Oriolidae)

542. นกขมิ้นหัวดำเล็ก (Dark-throated Oriole) *Oriolus xanthonotus* Horsfield, 1821

ORIOXANTHON

Type locality: เกาะชวา ประเทศอินโดนีเซีย *การแพร่กระจาย* : ภาคใต้ *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2544ก); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

543. นกขมิ้นท้ายทอยดำ (Black-naped Oriole) *Oriolus chinensis* Linnaeus, 1766 ORIOCH

Type locality: ประเทศจีน *การแพร่กระจาย* : ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคตะวันออกและภาคใต้ *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2544ก); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

544. นกขมิ้นปากเรียว (Slender-billed Oriole) *Oriolus tenuirostris* Blyth, 1846 ORIOTE

Type locality: รัฐอัสสัม ประเทศอินเดีย *การแพร่กระจาย* : ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันตก *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2544ก); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

545. นกขมิ้นหัวดำใหญ่ (Black-hooded Oriole) *Oriolus xanthornus* (Linnaeus, 1758)

ORIOXANTHOR

Type locality: รัฐเบงกอล ประเทศอินเดีย *การแพร่กระจาย* : ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออกและภาคใต้ *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2544ก); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

546. นกขมิ้นแดง (Maroon Oriole) *Oriolus traillii* (Vigors, 1832)

ORIOTR

Type locality: รัฐเบงกอล ประเทศอินเดีย *การแพร่กระจาย* : ภาคเหนือ ภาคตะวันตก และภาคตะวันออก *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2544ก); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

547. นกขมิ้นขาว (Silver Oriole) *Oriolus mellianus* Stresemann, 1922. **ORIO ME**

Type locality: เมืองกวางตุ้ง ประเทศจีน *การแพร่กระจาย* : ภาคเหนือ ภาคตะวันตก และภาคตะวันออก *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2544ก); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

วงศ์นกขี้เถ้าและนกพญาไฟ (Family Campephagidae)

548. นกขี้เถ้าใหญ่ (Large Cuckooshrike) *Coracina macei* (Lesson, 1831)

CORAMA

Type locality: รัฐเบงกอล ประเทศอินเดีย *การแพร่กระจาย* : ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก และภาคตะวันออก *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2544ก); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

549. นกขี้เถ้าพันธุ์ชวา (Javan Cuckooshrike) *Coracina javensis* (Horsfield, 1821) **CORAJA**

Type locality: เกาะชวา ประเทศอินโดนีเซีย *การแพร่กระจาย* : ภาคใต้ *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2544ก); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

550. นกขี้เถ้าลายขวาง (Bar-bellied Cuckooshrike) *Coracina striata* (Boddaert, 1783)

CORAST

Type locality: เกาะบอร์เนียว ประเทศอินโดนีเซีย *การแพร่กระจาย* : ภาคใต้ *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2544ก); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

551. นกเขียวขี้เถ้าเล็ก (Lesser Cuckooshrike) *Coracina fimbriata* (Temminck, 1824) **CORAFI**

Type locality: เกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย *การแพร่กระจาย* : ภาคตะวันตก และภาคใต้

อ้างอิงจาก : โอภาส (2544ก); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

552. นกเจี๊วขี้กลาง (Indochinese cuckooshrike) *Coracina polioptera* (Sharpe, 1879)

CORAPO

Type locality: Cochin China ตอนใต้ของประเทศเวียดนาม **การแพร่กระจาย :** ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันตก **อ้างอิงจาก :** โอภาส (2544ก); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

553. นกเจี๊วขี้ใหญ่ (Black-winged Cuckooshrike) *Coracina melaschistos* (Hodgson, 1836)

CORAME

Type locality: ประเทศเนปาล **การแพร่กระจาย :** ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก และภาคใต้ **อ้างอิงจาก :** โอภาส (2544ก); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

554. นกพญาไฟสีกุหลาบ (Rosy Minivet) *Pericrocotus roseus* (Vieillot, 1818) PERIRO

Type locality: รัฐเบงกอล ประเทศอินเดีย **การแพร่กระจาย :** ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก และภาคใต้ **อ้างอิงจาก :** โอภาส (2544ก); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

555. นกพญาไฟตะโพกสีน้ำตาล (Brown-rumped Minivet) *Pericrocotus cantonensis* Swinhoe, 1861 CPERICA

Type locality: เมืองกวางตุ้ง ประเทศจีน **การแพร่กระจาย :** ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก และภาคใต้ **อ้างอิงจาก :** โอภาส (2544ก); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

556. นกพญาไฟสีเทา (Ashy Minivet) *Pericrocotus divaricatus* (Raffles, 1822) PERIDI

Type locality: ประเทศสิงคโปร์ **การแพร่กระจาย :** ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก และภาคใต้ **อ้างอิงจาก :** โอภาส (2544ก); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

557. นกพญาไฟเล็ก (Small Minivet) *Pericrocotus cinnamomeus* (Linnaeus, 1766) PERICI

Type locality:ประเทศศรีลังกา **การแพร่กระจาย :**ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก และภาคใต้ **อ้างอิงจาก :**โอภาส (2544ก);จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

558. นกพญาไฟเล็กคอดำ (Fiery Minivet) *Pericrocotus igneus* Blyth, 1846 PERIIG

Type locality:ประเทศมาเลเซีย **การแพร่กระจาย :**ภาคใต้ **อ้างอิงจาก :**โอภาส (2544ก);จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

559. นกพญาไฟคอเทา (Grey-chinned Minivet) *Pericrocotus solaris* Blyth, 1846 PERISO

Type locality:เมืองคาร์จีลิง ประเทศอินเดีย **การแพร่กระจาย :**ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ ภาคตะวันตก **อ้างอิงจาก :**โอภาส (2544ก);จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

560. นกพญาไฟพันธุ้เหนือ (Long-tailed Minivet) *Pericrocotus ethologus* Bangs & Phillips, 1914 PERIET

Type locality:ประเทศจีน **การแพร่กระจาย :**ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ **อ้างอิงจาก :**โอภาส (2544ก);จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008); โอภาส (2544)

561. นกพญาไฟแม่สะเรียง (Short-billed Minivet) *Pericrocotus brevirostris* (Vigors, 1831)PERIBR

Type locality:เทือกเขาหิมาลัย **การแพร่กระจาย :**ภาคเหนือ **อ้างอิงจาก :**โอภาส (2544ก);จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

562. นกพญาไฟใหญ่ (Scarlet Minivet) *Pericrocotus flammeus* (Forster, 1781) PERIFL

Type locality:ประเทศศรีลังกา **การแพร่กระจาย :**ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก และภาคใต้ **อ้างอิงจาก :**โอภาส (2544ก);จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

563. นกเขนน้อยคิ้วขาว (Pied Triller) *Lalage nigra* (Forster, 1781) LALANI

Type locality: เมืองมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ (Manila, Philippines)**การแพร่กระจาย :** ภาคใต้ **อ้างอิงจาก :**จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

564. นกเขนน้อยปีกแถบขาว (Bar-winged Flycatcher-shrike) *Hemipus picatus* (Sykes, 1832)

HEMIPI

Type locality: เมืองบอมเบย์ ประเทศอินเดีย *การแพร่กระจาย* : ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก และภาคใต้ *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2544ก); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

565. นกเขนน้อยปีกดำ (Black-winged Flycatcher-shrike) *Hemipus hirundinaceus* (Temminck, 1822) **HEMIHI**

Type locality: เกาะชวา ประเทศอินโดนีเซีย *การแพร่กระจาย* : ภาคใต้ *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2544ก); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

วงศ์นกอีแพรด (Family Rhipiduridae)

566. นกอีแพรดท้องเหลือง (Yellow-bellied Fantail) *Rhipidura hypoxantha* Blyth, 1843

RHIPHY

Type locality: รัฐเบงกอล ประเทศอินเดีย *การแพร่กระจาย* : ภาคเหนือ และภาคตะวันตก *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2544ก); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

567. นกอีแพรดคอขาว (White-throated Fantail) *Rhipidura albicollis* (Vieillot, 1818)

RHIPAL

Type locality: รัฐเบงกอล ประเทศอินเดีย *การแพร่กระจาย* : ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก และภาคใต้ *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2544ก); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

568. นกอีแพรดคิ้วขาว (White-browed Fantail) *Rhipidura aureola* Lesson, 1830 **RHIPAU**

Type locality: รัฐเบงกอล ประเทศอินเดีย *การแพร่กระจาย* : ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันตก *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2544ก); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

569. นกอีแพรดแถบอกดำ (Pied Fantail) *Rhipidura javanica* (Sparrman, 1788) **RHIPJA**

Type locality: เกาะชวา ประเทศอินโดนีเซีย *การแพร่กระจาย* : ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก และภาคใต้ *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2544ก); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

570. นกอีแพรดคอกลาย (Spotted Fantail) *Rhipidura perlata* Mueller, 1843 RHIPPE

Type locality: เกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย *การแพร่กระจาย* : ภาคใต้ *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2544ก); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

วงศ์นกแซงแซว (Family Dicuridae)

571. นกแซงแซวสีเทา (Ashy Drongo) *Dicrurus leucophaeus* Vieillot, 1817 DICRLE

Type locality: เกาะชวา ประเทศอินโดนีเซีย *การแพร่กระจาย* : ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก และภาคใต้ *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2544ก); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

572. นกแซงแซวหางปลา (Black Drongo) *Dicrurus macrocerus* (Vieillot, 1817) DICRMA

Type locality: ทางตอนใต้ของประเทศอินเดีย *การแพร่กระจาย* : ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก และภาคใต้ *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2544ก); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

573. นกแซงแซวปากกา (Crow-billed Drongo) *Dicrurus annectans* (Hodgson, 1836)

DICRAN

Type locality: ประเทศเนปาล *การแพร่กระจาย* : ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก และภาคใต้ *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2544ก); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

574. นกแซงแซวเล็กเหลือบ (Bronzed Drongo) *Dicrurus aeneus* Vieillot, 1817 DICRAE

Type locality: รัฐเบงกอล ประเทศอินเดีย *การแพร่กระจาย* : ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก และภาคใต้ *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2544ก); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

575. นกแซงแซวหางป๋วงเล็ก (Lesser Racket-tailed Drongo) *Dicrurus remifer* (Temminck, 1823) DICRRE

Type locality: เกาะชวา ประเทศอินโดนีเซีย *การแพร่กระจาย* : ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก และภาคใต้ *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2544ก); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

576. นกแขงแขวงหงอนขน (Spangled Drongo) *Dicrurus hottentottus* (Linnaeus, 1766)

DICRHO

Type locality: รัฐเบงกอล ประเทศอินเดีย *การแพร่กระจาย:* ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก และภาคตะวันออก *อ้างอิงจาก:* โอภาส (2544ก); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

577. นกแขงแขวงหางป่องใหญ่ (Greater Racket-tailed Drongo) *Dicrurus paradiseus* (Linnaeus, 1766) DICRPA

Type locality: เมืองตะนาวศรี ทางตอนใต้ของประเทศพม่า *การแพร่กระจาย:* ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก และภาคใต้ *อ้างอิงจาก:* โอภาส (2544ก); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

วงศ์นกแขวงสวรรค์ (Family Monarchidae)

578. นกจับแมลงจุกดำ (Black-naped Monarch) *Hypothymis azurea* (Boddaert, 1783)

HYPOAZ

Type locality: ประเทศฟิลิปปินส์ *การแพร่กระจาย:* ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก และภาคใต้ *อ้างอิงจาก:* โอภาส (2544ก); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

579. นกแขวงสวรรค์ (Asian Paradise-flycatcher) *Terpsiphone paradisi* (Linnaeus, 1758)

TERPPA

Type locality: ประเทศศรีลังกา *การแพร่กระจาย:* ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก และภาคใต้ *อ้างอิงจาก:* โอภาส (2544ก); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

580. นกแขวงสวรรค์หางดำ (Japanese Paradise-flycatcher) *Terpsiphone atrocaudata* (Eyton, 1839) TERPAT

Type locality: ประเทศมาเลเซีย *การแพร่กระจาย:* ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก และภาคใต้ *อ้างอิงจาก:* โอภาส (2544ก); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

วงศ์นกขมิ้นน้อย (Family Aegithinidae)

581. นกขมิ้นน้อยธรรมดา (Common Iora) *Aegithina tiphia* (Linnaeus, 1758) AEGITI

Type locality: ประเทศอินเดีย การแพร่กระจาย : ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก และภาคใต้ อ้างอิงจาก : โอภาส (2544ก); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

582. นกขมิ้นน้อยสีเขียว (Green Iora) *Aegithina viridissima* (Bonaparte, 1851) AEGIVI

Type locality: เกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย การแพร่กระจาย : ภาคตะวันตก และภาคใต้ อ้างอิงจาก : โอภาส (2544ก); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

583. นกขมิ้นน้อยปีกสีเขียว (Great Iora) *Aegithina lafresnayei* (Hartlaub, 1844) AEGILA

Type locality: ประเทศมาเลเซีย การแพร่กระจาย : ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก และภาคใต้ อ้างอิงจาก : โอภาส (2544ก); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

วงศ์นกเงี้ยววง (Family Malaconotidae)

584. นกจับแมลงปีกน้ำตาลแดง (Rufous-winged Philentoma) *Philentoma pyrhopterum* (Temminck, 1836) PHILPY

Type locality: เกาะบอร์เนียว ประเทศอินโดนีเซีย การแพร่กระจาย : ภาคตะวันตก และภาคใต้ อ้างอิงจาก : โอภาส (2544ก); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

585. นกจับแมลงอกแดง (Maroon-breasted Philentoma) *Philentoma velatum* (Temminck, 1825) PHILVE

Type locality: เกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย การแพร่กระจาย : ภาคตะวันตก และภาคใต้ อ้างอิงจาก : โอภาส (2544ก); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

586. นกเงี้ยววงหางสีน้ำตาล (Large Woodshrike) *Tephrodornis gularis* (Raffles, 1822)

TEPHGU

Type locality: เกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย การแพร่กระจาย : ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก และภาคใต้ อ้างอิงจาก : โอภาส (2544ก); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

587. นกเขียวดวงธรรมดา (Common Woodshrike) *Tephrodornis pondicerianus* (Gmelin, 1789)

TEPHPO

Type locality: เมือง Pondicherry ประเทศอินเดีย *การแพร่กระจาย* : ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันตก *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2544ก); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

วงศ์นกมุดน้ำ (Family Cinclidae)

588. นกมุดน้ำ (Brown Dipper) *Cinclus pallasii* Temminck, 1820 CINCPA

Type locality: ไชยบุรี ประเทศรัสเซีย *การแพร่กระจาย* : ภาคเหนือ *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2544ก); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

วงศ์นกเดินดง (Family Turdinae)

589. นกกระเบื้องคอขาว (White-throated Rock Thrush) *Monticola gularis* (Swinhoe, 1863)

MONTGU

Type locality: ประเทศจีน *การแพร่กระจาย* : ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก และภาคใต้ *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2544ก); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

590. นกกระเบื้องท้องแดง (Chestnut-bellied Rock Thrush) *Monticola rufiventris* (Jardine &

Selby, 1833) MONTRU

Type locality: เทือกเขาหิมาลัย *การแพร่กระจาย* : ภาคเหนือ *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2544ก); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

591. นกกระเบื้องฟ้า (Blue Rock-thrush) *Monticola solitarius* (Linnaeus, 1758) MONTSO

Type locality: ประเทศอิตาลี *การแพร่กระจาย* : ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก และภาคใต้ *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2544ก); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

592. นกเอี้ยงฟ้า (Blue Whistling Thrush) *Myophonus caeruleus* (Scopoli, 1786) MYOPCA

Type locality:มณฑลทกวางตุ้ง ประเทศจีน **การแพร่กระจาย :**ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก และภาคใต้ **อ้างอิงจาก :**โอภาส (2544ก);จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

593. นกเดินดงหัวน้ำตาลแดง (Chestnut-capped Thrush) *Zoothera interpres* (Temminck, 1826)

ZOOTIN

Type locality:เกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย **การแพร่กระจาย :**ภาคใต้ **อ้างอิงจาก :**โอภาส (2544ก);จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

594. นกเดินดงหัวสีส้ม (Orange-headed Thrush) *Zoothera citrina* (Latham, 1790) ZOOTCI

Type locality:ประเทศอินเดีย **การแพร่กระจาย :**ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก และภาคใต้ **อ้างอิงจาก :**โอภาส (2544ก);จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

595. นกเดินดงสีเทาดำ (Siberian Thrush) *Zoothera sibirica* (Pallas, 1776) ZOOTSI

Type locality:ไซบีเรีย ประเทศรัสเซีย **การแพร่กระจาย :**ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก และภาคใต้ **อ้างอิงจาก :**โอภาส (2544ก);จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

596. นกเดินดงหลังสีไพล (Long-tailed Thrush) *Zoothera dixonii* (Seebohm, 1881) ZOOTDI

Type locality:ประเทศอังกฤษ **การแพร่กระจาย :**ภาคเหนือ **อ้างอิงจาก :**โอภาส (2544ก);จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

597. นกเดินดงลายเสือ (Scaly Thrush) *Zoothera dauma* (Latham, 1790) ZOOTDA

Type locality:รัฐแคชเมียร์ ประเทศอินเดีย **การแพร่กระจาย :**ภาคเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก และภาคใต้ **อ้างอิงจาก :**โอภาส (2544ก);จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

598. นกเดินดงเล็กปากยาว (Dark-sided Thrush) *Zoothera marginata* Blyth, 1847

ZOOTMA

Type locality:เมืองArakan ประเทศพม่า **การแพร่กระจาย :**ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก และภาคตะวันออก **อ้างอิงจาก :**โอภาส (2544ก);จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

599. นกเดินดงอกดำ (Black-breasted Thrush) *Turdus dissimilis* Blyth, 1847 **TURDDI**
Type locality: ทางตอนใต้ของรัฐเบงกอล ประเทศอินเดีย *การแพร่กระจาย :* ภาคเหนือ
อ้างอิงจาก : โอภาส (2544ก); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)
600. นกเดินดงพันธุ์ญี่ปุ่น (Japanese Thrush) *Turdus cardis* Temminck, 1831 **TURDCA**
Type locality: ประเทศญี่ปุ่น *การแพร่กระจาย :* ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ *อ้างอิงจาก :*
 โอภาส (2544ก); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)
601. นกเดินดงดำปีกเทา (Grey-winged Blackbird) *Turdus boulboul* (Latham, 1790)
TURDBO
Type locality: ประเทศปากีสถาน *การแพร่กระจาย :* ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
อ้างอิงจาก : โอภาส (2544ก); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)
602. นกเดินดงสีดำ (Eurasian Blackbird) *Turdus merula* Linnaeus, 1758 **TURDME**
Type locality: ประเทศสวีเดน *การแพร่กระจาย :* ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ *อ้างอิงจาก :*
 โอภาส (2544ก); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)
603. นกเดินดงสีน้ำตาลแดง (Chestnut Thrush) *Turdus rubrocanus* Hodgson, 1846
TURDRUB
Type locality: เทือกเขาหิมาลัย *การแพร่กระจาย :* ภาคเหนือ *อ้างอิงจาก :* โอภาส (2544ก); จารุจินต์
 และคณะ (2550); Robson (2008)
604. นกเดินดงอกเทา (Grey-sided Thrush) *Turdus feae* (Salvadori) 1887 **TURDFE**
Type locality: เมืองตะนาวศรี ทางตอนใต้ของประเทศพม่า *การแพร่กระจาย :* ภาคเหนือ และภาค
 ตะวันตก *อ้างอิงจาก :* โอภาส (2544ก); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)
605. นกเดินดงสีคิ้ว (Eyebrowed Thrush) *Turdus obscurus* Gmelin, 1789 **TURDOB**
Type locality: ไชยบุรี ประเทศรัสเซีย *การแพร่กระจาย :* ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาค
 กลาง ภาคตะวันตก และภาคใต้ *อ้างอิงจาก :* โอภาส (2544ก); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson
 (2008)

606. นกเดินดงคอสีเข้ม (Dark-throated Thrush) *Turdus ruficollis* Pallas, 1776

TURDRUF

Type locality: เมือง Dauria ประเทศรัสเซีย *การแพร่กระจาย* : ภาคเหนือ *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2544ก); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

607. นกเดินดงอกลาย (Dusky Thrush) *Turdus naumanni* Temminck, 1820 **TURDNA**

Type locality: ยุโรปตะวันออก *การแพร่กระจาย* : ภาคเหนือ และภาคตะวันตก *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2544ก); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

608. นกปีกสั้นเล็ก (Lesser Shortwing) *Brachypteryx leucophrys* (Temminck, 1827)

BRACLE

Type locality: เกาะชวา ประเทศอินโดนีเซีย *การแพร่กระจาย* : ภาคเหนือ ภาคตะวันออก เฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก และภาคใต้ *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2544ก); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

609. นกปีกสั้นสีน้ำเงิน (White-browed Shortwing) *Brachypteryx montana* Horsfield, 1822

BRACMO

Type locality: เกาะชวา ประเทศอินโดนีเซีย *การแพร่กระจาย* : ภาคเหนือ และภาคตะวันตก *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2544ก); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

วงศ์นกจับแมลงและนกเขน (Family Muscicapinae)

610. นกจับแมลงอกสีน้ำตาลอ่อน (Brown-chested Jungle Flycatcher) *Rhinomyias brunneata*

(Slater, 1897) **RHINBR**

Type locality: ประเทศจีน *การแพร่กระจาย* : ภาคกลาง ภาคตะวันตก และภาคใต้ *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2544ก); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

611. นกจับแมลงอกสีเนื้อ (Fulvous-chested Jungle Flycatcher) *Rhinomyias olivacea* (Hume, 1877) **RHINOL**

Type locality: เมืองตะนาวศรี ทางตอนใต้ของประเทศพม่า *การแพร่กระจาย* : ภาคใต้ *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2544ก); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

612. นกจับแมลงอกเทา (Grey-chested Jungle Flycatcher) *Rhinomyias umbratilis* (Strickland, 1849) RHINUM

Type locality: เกาะบอร์เนียว ประเทศอินโดนีเซีย *การแพร่กระจาย:* ภาคใต้ *อ้างอิงจาก:* โอภาส (2544ก); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

613. นกจับแมลงสีคล้ำ (Dark-sided Flycatcher) *Muscicapa sibirica* Gmelin, 1789

MUSCSI

Type locality: ไชยบุรี ประเทศรัสเซีย *การแพร่กระจาย:* ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก และภาคใต้ *อ้างอิงจาก:* โอภาส (2544ก); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

614. นกจับแมลงสีน้ำตาล (Asian Brown Flycatcher) *Muscicapa dauurica* Pallas, 1811

MUSCDA

Type locality: เมืองDauria ทางตะวันออกเฉียงใต้ของไชยบุรี ประเทศรัสเซีย *การแพร่กระจาย:* ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก และภาคใต้ *อ้างอิงจาก:* โอภาส (2544ก); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

615. นกจับแมลงสีน้ำตาลท้องลาย (Brown-streaked Flycatcher) *Muscicapa williamsoni*

Deignan, 1957 MUSCWI

Type locality: บริเวณเขาพนมเบญจา จังหวัดกระบี่ *การแพร่กระจาย:* ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก และภาคใต้ *อ้างอิงจาก:* โอภาส (2544ก); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

616. นกจับแมลงอกสีน้ำตาล (Brown-breasted Flycatcher) *Muscicapa muttui* (Layard, 1854)

MUSCMU

Type locality: ประเทศศรีลังกา *การแพร่กระจาย:* ภาคเหนือ *อ้างอิงจาก:* โอภาส (2544ก); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

617. นกจับแมลงสีน้ำตาลแดง (Ferruginous Flycatcher) *Muscicapa ferruginea* (Hodgson, 1845)

MUSCFE

Type locality: ประเทศเนปาล *การแพร่กระจาย* : ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก และภาคใต้ *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2544ก); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

618. นกจับแมลงตะโพกเหลือง (Yellow-rumped Flycatcher) *Ficedula zanthopygia* (Hay, 1845)

FICEZA

Type locality: ประเทศมาเลเซีย *การแพร่กระจาย* : ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก และภาคใต้ *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2544ก); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

619. นกจับแมลงควิวเหลือง (Narcissus Flycatcher) *Ficedula narcissina* (Temminck, 1835)

FICENA

Type locality: ประเทศญี่ปุ่น *การแพร่กระจาย* : ภาคกลาง และภาคตะวันตก *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2544ก); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

620. นกจับแมลงหลังเขียว (Green-backed Flycatcher) *Ficedula elisae* (Weigold, 1922)

FICEEL

Type locality: ประเทศจีน *การแพร่กระจาย* : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ *อ้างอิงจาก* : จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson, (2002)

621. นกจับแมลงดำอกสีส้ม (Mugimaki Flycatcher) *Ficedula mugimaki* (Temminck, 1835)

FICEMU

Type locality: ประเทศญี่ปุ่น *การแพร่กระจาย* : ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก และภาคใต้ *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2544ก); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

622. นกจับแมลงหลังสีเทา (Slaty-backed Flycatcher) *Ficedula hodgsonii* (Verreaux, 1871)

FICEHO

Type locality: ประเทศจีน *การแพร่กระจาย* : ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันตก *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2544ก); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

623. นกจับแมลงแถบคอสีส้ม (Rufous-gorgetted Flycatcher) *Ficedula strophiiata* (Hodgson,

1837) FICEST

Type locality:ประเทศเนปาล **การแพร่กระจาย** :ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
อ้างอิงจาก : โอภาส (2544ก); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

624. นกจับแมลงคอแดง (Red-throated Flycatcher) *Ficedula parva* (Bechstein, 1792)

FICEPA

Type locality:ประเทศรัสเซีย **การแพร่กระจาย** :ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก และภาคใต้ **อ้างอิงจาก** : โอภาส (2544ก); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

625. นกจับแมลงสร้อยคอขาว (White-gorgeted Flycatcher) *Ficedula monileger* (Hodgson, 1845)

FICEMO

Type locality:ประเทศเนปาล **การแพร่กระจาย** :ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
อ้างอิงจาก : จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008); โอภาส (2544)

626. นกจับแมลงคอขาวหน้าแดง (Rufous-browed Flycatcher) *Ficedula solitaris* (Mueller, 1835)

FICESO

Type locality:เกาะสุมาตรา ด้านตะวันตก ประเทศอินโดนีเซีย **การแพร่กระจาย** :ภาคตะวันตก และภาคใต้ **อ้างอิงจาก** : โอภาส (2544ก); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

627. นกจับแมลงหน้าผากขาว (Snowy-browed Flycatcher) *Ficedula hyperythra* (Blyth, 1843)

FICEHY

Type locality:รัฐเบงกอล ประเทศอินเดีย **การแพร่กระจาย** :ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ **อ้างอิงจาก** : โอภาส (2544ก); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

628. นกจับแมลงอกสีส้ม (Rufous-chested Flycatcher) *Ficedula dumetoria* (Wallace, 1864)

FTCEDU

Type locality:เกาะชวา ประเทศอินโดนีเซีย **การแพร่กระจาย** :ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก และภาคใต้ **อ้างอิงจาก** : จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

629. นกจับแมลงเล็กขาวดำ (Little pied Flycatcher) *Ficedula westermanni* (Sharpe, 1888)

FICEWE

*Type locality:*รัฐเปรัก ประเทศมาเลเซีย *การแพร่กระจาย* :ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก และภาคใต้ *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2544ก); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

630. นกจับแมลงสีคราม (Ultramarine Flycatcher) *Ficedula superciliaris* (Jerdon, 1840)**FICESU**

*Type locality:*Ajunta,N.Ghats*การแพร่กระจาย* :ภาคเหนือ *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2544ก); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

631. นกจับแมลงหน้าดำคอกขาว (Slaty-blue Flycatcher) *Ficedula tricolor* (Hodgson, 1845)**FICETR**

*Type locality:*ประเทศเนปาล *การแพร่กระจาย* :ภาคเหนือ *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2544ก); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

632. นกจับแมลงหัวสีฟ้า (Sapphire Flycatcher) *Ficedula sapphira* (Blyth, 1843)**FICESA**

*Type locality:*ประเทศอินเดีย *การแพร่กระจาย* :ภาคเหนือ *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2544ก); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

633. นกจับแมลงสีฟ้าท้องขาว (Blue-and-white Flycatcher) *Cyanoptila cyanomelana* (Temminck, 1957) **CYANCY**

*Type locality:*ประเทศญี่ปุ่น *การแพร่กระจาย* :ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2544ก); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

634. นกจับแมลงสีฟ้า (Verditer Flycatcher) *Eumyias thalassina* Swainson, 1838 **EUMYTH**

*Type locality:*ประเทศอินเดีย *การแพร่กระจาย* :ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2544ก); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

635. นกนิลตวาใหญ่ (Large Niltava) *Niltava grandis* (Blyth, 1842) **NILTGR**

Type locality: รัฐเบงกอล ประเทศอินเดีย *การแพร่กระจาย* : ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก และ ภาคใต้ *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2544ก); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

636. นกนิลตวาเล็ก (Small Niltava) *Niltava macgrigoriae* (Burton, 1836) NILTMA

Type locality: ที่อกเขาหิมาลัย *การแพร่กระจาย* : ภาคเหนือ และภาคตะวันตก *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2544ก); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

637. นกนิลตวาท้องสีส้มพันธุ์จีน (Fujian Niltava) *Niltava davidi* La Touche, 1907

NILTDA

Type locality: ประเทศจีน *การแพร่กระจาย* : ภาคตะวันออก *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2544ก); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

638. นกนิลตวาท้องสีส้มคอดำ (Rufous-bellied Niltava) *Niltava sundara* Hodgson, 1837NILTSU

Type locality: ประเทศเนปาล *การแพร่กระจาย* : ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2544ก); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

639. นกนิลตวาท้องสีส้ม (Vivid Niltava) *Niltava vivida* (Swinhoe, 1864) NILTVI

Type locality: ประเทศจีน *การแพร่กระจาย* : ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2544ก); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

640. นกจับแมลงคอน้ำตาลแดง (Hill Blue Flycatcher) *Cyornis banyumas* (Horsfield, 1821)

CYORBA

Type locality: เมืองBanyumas ในเกาะชวา ประเทศอินโดนีเซีย *การแพร่กระจาย* : ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก และภาคใต้ *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2544ก); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

641. นกจับแมลงคอสีน้ำเงินเข้ม (Blue-throated Flycatcher) *Cyornis rubeculoides* (Vigors, 1831) CYORRUB

Type locality: ประเทศอินเดีย *การแพร่กระจาย* : ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก และภาคใต้ *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2544ก); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

642. นกจับแมลงพันธุ์จีน (Chiness Blue Flycatcher) *Cyornis glaucicomans* (Thayer & Bang, 1909) CYORGL

Type locality: ประเทศจีน *การแพร่กระจาย* : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก และภาคใต้ *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2544ก); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

643. นกจับแมลงป่าพรู (Malaysian Blue Flycatcher) *Cyornis turcosus* Brueggemann, 1877 CYORTU

Type locality: ประเทศมาเลเซีย *การแพร่กระจาย* : ภาคใต้ *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2544ก); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

644. นกจับแมลงอกส้มท้องขาว (Tickell's Blue Flycatcher) *Cyornis tickelli* Blyth, 1843 CYORTI

Type locality: ประเทศอินเดีย *การแพร่กระจาย* : ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก และภาคใต้ *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2544ก); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

645. นกจับแมลงป่าโกงกาง (Mangrove Blue Flycatcher) *Cyornis rufigastra* (Raffles, 1822) CYORRUF

Type locality: ประเทศมาเลเซีย *การแพร่กระจาย* : ภาคใต้ *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2544ก); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

646. นกจับแมลงสีค้ำหางแถบขาว (White-tailed Flycatcher) *Cyornis concretus* (Mueller, 1835) CYORCO

Type locality: เกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย *การแพร่กระจาย* : ภาคตะวันตก และภาคใต้ *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2544ก); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

647. นกจับแมลงอกสีฟ้า (Hainan Blue Flycatcher) *Cyornis hainanus* (Ogilvie-Grant, 1900) CYORHA

Type locality:เกาะไหหลำ (Hainan)**การแพร่กระจาย :**ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก และภาคตะวันออก **อ้างอิงจาก :**จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008); โอภาส (2544)

648. นกจับแมลงสีฟ้าอ่อน (Pale Blue Flycatcher) *Cyornis unicolor* Blyth, 1843

CYORUN

Type locality:ประเทศอินเดีย**การแพร่กระจาย :**ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก และภาคใต้ **อ้างอิงจาก :**โอภาส (2544ก); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

649. นกจับแมลงสีฟ้าจิ๋ว (Pygmy Blue Flycatcher) *Muscicapella hodgsoni* (Moore, 1854)

MUSCHO

Type locality:ประเทศเนปาล **การแพร่กระจาย :**ภาคเหนือ และภาคตะวันตก **อ้างอิงจาก :**โอภาส (2544ก); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

650. นกจับแมลงหัวเทา (Grey-headed Flycatcher) *Culicicapa ceylonensis* (Swainson, 1820)

CULICE

Type locality:ประเทศศรีลังกา **การแพร่กระจาย :**ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก และภาคใต้ **อ้างอิงจาก :**โอภาส (2544ก); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

651. นกเขนน้อยหางแดง (Rufous-tailed Robin) *Luscinia sibilans* (Swinhoe, 1863) LUSCSI

Type locality:ประเทศรัสเซีย **การแพร่กระจาย :**ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ **อ้างอิงจาก :**โอภาส (2544ก); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

652. นกคอทับทิม (Siberian rubythroat) *Luscinia calliope* (Pallas, 1776) LUSCCA

Type locality:ประเทศรัสเซีย **การแพร่กระจาย :**ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก และภาคตะวันออก **อ้างอิงจาก :**โอภาส (2544ก); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

653. นกคอทับทิมอกดำ (White-tailed Rubythroat) *Luscinia pectoralis* (Gould, 1837)

LUSCPE

Type locality:เทือกเขาหิมาลัย ด้านตะวันตก **การแพร่กระจาย :**ภาคเหนือ และภาคกลาง

อ้างอิงจาก : โอภาส (2544ก); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

654. นกคอมรกต (Bluethroat) *Luscinia svecica* (Linnaeus, 1758) LUSCSV

Type locality: ประเทศสวีเดน **การแพร่กระจาย :** ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง

อ้างอิงจาก : โอภาส (2544ก); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

655. นกเขนน้อยยอกดำ (Blackthroated) *Luscinia obscura* (Berezowsky & Bianchi, 1891)

LUSCOB

Type locality: Shensi **การแพร่กระจาย :** ภาคเหนือ **อ้างอิงจาก :** โอภาส (2544ก); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

656. นกเขนน้อยไซบีเรีย (Siberian Blue Robin) *Luscinia cyane* (Pallas, 1776)

LUSCCY

Type locality: ประเทศรัสเซีย **การแพร่กระจาย :** ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก และภาคใต้ **อ้างอิงจาก :** โอภาส (2544ก); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

657. นกเขนน้อยพันธุ์ญี่ปุ่น (Japanese Robin) *Erithacus akahige* (Temminck, 1835)

ERITAK

Type locality: เมืองฮอนโด ประเทศญี่ปุ่น (Hondo, Japan) **การแพร่กระจาย :** ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก **อ้างอิงจาก :** จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

658. นกเขนน้อยสีทอง (Golden Bush Robin) *Tarsiger chrysaeus* Hodgson, 1845 TARSCH

Type locality: ประเทศเนปาล **การแพร่กระจาย :** ภาคเหนือ **อ้างอิงจาก :** โอภาส (2544ก); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

659. นกเขนน้อยข้างสีส้ม (Orange-flanked Bush Robin) *Tarsiger cyanurus* (Pallas, 1773)

TARSCY

Type locality: ประเทศญี่ปุ่น **การแพร่กระจาย :** ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

อ้างอิงจาก : จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008); โอภาส (2544)

660. นกกางเขนบ้าน (Oriental Magpie Robin) *Copsychus saularis* (Linnaeus, 1758)**COPSSA**

Type locality: รัฐเบงกอล ประเทศอินเดีย *การแพร่กระจาย :* ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก และภาคใต้ *อ้างอิงจาก :* โอภาส (2544ก); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

661. นกกางเขนดง (White-rumped Shama) *Copsychus malabaricus* (Scopoli, 1788)**COPSSMA**

Type locality: เมืองและชายฝั่ง Malabar (Kerala) ประเทศอินเดีย *การแพร่กระจาย :* ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก และภาคใต้ *อ้างอิงจาก :* โอภาส (2544ก); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

662. นกกางเขนดงหางแดง (Rufous-tailed Shama) *Trichixos pyrropyga* Lesson, 1839**TRICIPY**

Type locality: ประเทศอินโดนีเซีย *การแพร่กระจาย :* ภาคใต้ *อ้างอิงจาก :* โอภาส (2544ก); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

663. นกเขนสีดำ (Black Redstart) *Phoenicurus ochruros* (Gmelin, 1774)**PHOEOC**

Type locality: เปอร์เซีย *การแพร่กระจาย :* ภาคเหนือ *อ้างอิงจาก :* โอภาส (2544ก); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

664. นกเขนน้อยท้องแดง (Daurian Redstart) *Phoenicurus aureoreus* (Pallas, 1776)**PHOEAU**

Type locality: เมืองDauria รัฐไซบีเรีย ประเทศรัสเซีย *การแพร่กระจาย :* ภาคเหนือ *อ้างอิงจาก :* โอภาส (2544ก); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

665. นกเขนสีฟ้าท้ายสีน้ำตาล (Blue-fronted Redstart) *Phoenicurus frontalis* Vigors, 1832**PHOEFR**

Type locality: เทือกเขาหิมาลัย *การแพร่กระจาย :* ภาคเหนือ *อ้างอิงจาก :* โอภาส (2544ก); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

666. นกเขนหัวขาวท้ายแดง (River Chat) *Chaimarrornis leucocephalus* (Vigors, 1831)

CHAILE

Type locality:เทือกเขาหิมาลัย *การแพร่กระจาย* :ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ *อ้างอิงจาก* :โอภาส (2544ก);จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

667. นกเขนเทาหางแดง (Plumbeous Redstart) *Rhyacornis fuliginosus* Vigors, 1831

RHYAFU

Type locality:เทือกเขาหิมาลัย *การแพร่กระจาย* :ภาคเหนือ *อ้างอิงจาก* :โอภาส (2544ก);จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

668. นกเขนเปล่ง (White-bellied Redstart) *Hodgsonius phaenicuroides* (Gray, 1846)

HODGPH

Type locality:ประเทศเนปาล *การแพร่กระจาย* :ภาคเหนือ *อ้างอิงจาก* :โอภาส (2544ก);จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

669. นกเขนสีฟ้าหางขาว (White-tailed Robin) *Myiomela leucura* (Hodgson, 1845)

MYIOLE

Type locality:ประเทศเนปาล *การแพร่กระจาย* :ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก และภาคใต้ *อ้างอิงจาก* :โอภาส (2544ก);จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

670. นกเขนน้าเงิน (Blue-fronted Robin) *Cinclidium frontale* Blyth, 1842 CINCFR

Type locality:ลิกขิมการแพร่กระจาย :ภาคเหนือ *อ้างอิงจาก* :โอภาส (2544ก);จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

671. นกกางเขนน้ำหลังแดง (Chestnut-naped Forktail) *Enicurus ruficapillus* Temminck, 1823

EUICRU

Type locality:เกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย *การแพร่กระจาย* :ภาคใต้ *อ้างอิงจาก* :โอภาส (2544ก);จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

672. นกกางเขนน้ำหลังดำ (Black-backed Forktail) *Enicurus immaculatus* (Hodgson, 1836)

ENICIM

Type locality:ประเทศเนปาล *การแพร่กระจาย* :ภาคเหนือ *อ้างอิงจาก* :โอภาส (2544ก);จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

673. นกกางเขนน้ำหลังเทา (Slaty-backed Forktail) *Enicurus schistaceus* (Hodgson, 1836)

ENICSC

Type locality:ประเทศเนปาล *การแพร่กระจาย* :ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก และภาคใต้ *อ้างอิงจาก* :โอภาส (2544ก);จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

674. นกกางเขนน้ำหัวขาว (White-crowned Forktail) *Enicurus leschenaulti* (Vieillot, 1818)

ENICLE

Type locality:เกาะชวา ประเทศอินโดนีเซีย *การแพร่กระจาย* :ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก และภาคใต้ *อ้างอิงจาก* :จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008); โอภาส (2544)

675. นกปีกแพรสีม่วง (Purple Cochoa) *Cochoa purpurea* Hodgson, 1836 **COCHPU**

Type locality:ประเทศเนปาล *การแพร่กระจาย* :ภาคเหนือ *อ้างอิงจาก* :โอภาส (2544ก);จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

676. นกปีกแพรสีเขียว (Green Cochoa) *Cochoa viridis* Hodgson, 1836 **COCHPU**

Type locality:ประเทศเนปาล *การแพร่กระจาย* :ภาคเหนือ ภาคตะวันตก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ *อ้างอิงจาก* :โอภาส (2544ก);จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

677. นกเขนทะเลทราย (Isabelline Wheatear) *Oenanthe isabellina* (Temminck, 1829)

OENASIS

Type locality:ประเทศนูเบีย, แอฟริกาเหนือ (Nubia, north Africa)*การแพร่กระจาย* : ภาคตะวันตก *อ้างอิงจาก* :จารุจินต์ และคณะ (2550)

678. นกยอดหญ้าหัวดำ (Siberian Stonechat) *Saxicola torquata* (Linnaeus, 1766) **SAXITO**

Type locality:แหลมกู๊ดโฮป ประเทศแอฟริกาใต้ *การแพร่กระจาย* :ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก และภาคใต้ *อ้างอิงจาก* :โอภาส (2544ก);จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

679. นกยอดหญ้าสีดำนกขี้หมา (Pied Bushchat) *Saxicola caprata* (Linnaeus, 1766)

SAXICA

Type locality: ประเทศฟิลิปปินส์ *การแพร่กระจาย* : ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันตก *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2544ก); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

680. นกยอดหญ้าหลังดำ (Jerdon's Bushchat) *Saxicola jerdoni* (Blyth, 1867) **SAXIJE**

Type locality: ประเทศอินเดีย *การแพร่กระจาย* : ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2544ก); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

681. นกยอดหญ้าสีเทา (Grey Bushchat) *Saxicola ferrea* Gray, 1846 **SAXIFE**

Type locality: ประเทศเนปาล *การแพร่กระจาย* : ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2544ก); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

วงศ์นกเอี้ยงและนกกิ้งโครง (Family Sturnidae)

682. นกเอี้ยงดำปากยี่ไต๋ (Asian Glossy Starling) *Aplonis panayensis* (Scopoli, 1783)

APLOPA

Type locality: เกาะปาโน ประเทศฟิลิปปินส์ *การแพร่กระจาย* : ภาคใต้ *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2544ก); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

683. นกกิ้งโครงปีกลายจุด (Spot-winged Starling) *Saroglossa spiloptera* (Vigors, 1831)

SAROSP

Type locality: เขตกเขาหิมาลัย *การแพร่กระจาย* : ภาคเหนือ และภาคตะวันตก *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2544ก); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

684. นกเอี้ยงพราหมณ์ (Brahminy Starling) *Sturnus pagodarum* (Gmelin, 1789)

STURPA

Type locality: ชายฝั่งทะเลและเมือง Malabar ประเทศอินเดีย *การแพร่กระจาย* : ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2544ก); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

685. นกกิ้งโครงแถบหัวเทา (Chestnut-tailed Starling) *Sturnus malabaricus* (Gmelin, 1789)

STURMA

Type locality: ชายฝั่งทะเลและเมืองMalabar ประเทศอินเดีย *การแพร่กระจาย*: ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก และภาคใต้ *อ้างอิงจาก*: โอภาส (2544ก); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

686. นกกิ่งไครงปากแดง (Red-billed Starling) *Sturnus sericeus* J. F. Gmelin, 1788 STURSE

Type locality: ประเทศจีน *การแพร่กระจาย*: ภาคใต้ *อ้างอิงจาก*: จารุจินต์ และคณะ (2550)

687. นกกิ่งไครงแกลบหลังม่วงดำ (Purple-backed Starling) *Sturnus sturninus* (Pallas, 1776)**STURST**

Type locality: เมือง Dauria ประเทศรัสเซีย *การแพร่กระจาย*: ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก และภาคใต้ *อ้างอิงจาก*: โอภาส (2544ก); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

688. นกกิ่งไครงแกลบแก้มสีน้ำตาลแดง (Chestnut-cheeked Starling) *Sturnus*

philippensis(Forster, 1781)

STURPH

Type locality: ประเทศฟิลิปปินส์ *การแพร่กระจาย*: ภาคใต้ *อ้างอิงจาก*: จารุจินต์ และคณะ (2550)

689. นกกิ่งไครงแกลบปีกขาว (White-shouldered Starling) *Sturnus sinensis* (Gmelin, 1788)**STURSI**

Type locality: ประเทศจีน *การแพร่กระจาย*: ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก และภาคใต้ *อ้างอิงจาก*: โอภาส (2544ก); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

690. นกกิ่งไครงพันธุ์ยุโรป (Common Starling) *Sturnus vulgaris* Linnaeus, 1758 STURVU

Type locality: ประเทศสวีเดน *การแพร่กระจาย*: ภาคเหนือ และภาคกลาง *อ้างอิงจาก*: โอภาส (2544ก); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

691. นกกิ่งไครงสีกุหลาบ (Rosy Starling) *Sturnus roseus* (Linnaeus, 1758) STURRO

Type locality: ประเทศสวีเดน *การแพร่กระจาย*: ภาคกลาง และภาคใต้ *อ้างอิงจาก*: โอภาส (2544ก); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

692. นกกิ่งไครงแก้มขาว (White-cheeked Starling) *Sturnus cineraceus* (Timminck, 1835)

STURCI

Type locality: ประเทศญี่ปุ่น *การแพร่กระจาย* : ภาคเหนือ และเหนือ ภาคกลาง *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2544ก); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

693. นกเอี้ยงต่าง (Asian Pied Starling) *Sturnus contra* Linnaeus, 1758

STURCO

Type locality: รัฐเบงกอล ประเทศอินเดีย *การแพร่กระจาย* : ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2544ก); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

694. นกกิ่งไครงคอดำ (Black-collared Starling) *Sturnus nigricollis* (Paykull, 1807)

STURNI *Type locality*: ประเทศจีน *การแพร่กระจาย* : ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2544ก); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

695. นกกิ่งไครงหัวสีนวล (Vinous-breasted Starling) *Sturnus burmannicus* (Jerdon, 1862)

STURBU

Type locality: ประเทศพม่า *การแพร่กระจาย* : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2544ก); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

696. นกเอี้ยงสาธิตา (Common Myna) *Acridotheres tristis* (Linnaeus, 1766)

ACRITR

Type locality: ประเทศอินเดีย *การแพร่กระจาย* : ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2544ก); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

697. นกเอี้ยงควาย (Jungle Myna) *Acridotheres fuscus* (Wagler, 1827)

ACRIFU

Type locality: ประเทศอินเดีย *การแพร่กระจาย* : ภาคกลาง และภาคใต้ *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2544ก); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

698. นกเอี้ยงหงอน (White-vented Myna) *Acridotheres grandis* Moore, 1858

ACRIGR

Type locality:ประเทศมาเลเซีย **การแพร่กระจาย :**ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก และภาคใต้ **อ้างอิงจาก :**โอภาส (2544ก);จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

699. นกเอี้ยงก้นลาย (Crested Myna) *Acridotheres cristatellus* (Linnaeus, 1766) ACRICR

Type locality:ประเทศจีน **การแพร่กระจาย :**ภาคกลาง **อ้างอิงจาก :**จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

700. นกเอี้ยงหัวสีทอง (Golden-crested Myna) *Ampeliceps coronatus* Blyth, 1842

AMPECO

Type locality:เมืองตะนาวศรี ทางตอนใต้ของประเทศพม่า **การแพร่กระจาย :**ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก และภาคใต้ **อ้างอิงจาก :**โอภาส (2544ก);จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

701. นกขุนทอง (Hill Myna) *Gracula religiosa* Linnaeus, 1758 GRACRE

Type locality:เกาะชวา ประเทศอินโดนีเซีย **การแพร่กระจาย :**ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก และภาคใต้ **อ้างอิงจาก :**โอภาส (2544ก);จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

วงศ์นกไต่ไม้ (Family Sittidae)

702. นกไต่ไม้โคนหางสีน้ำตาล (Chestnut-vented Nuthatch) *Sitta nagaensis* Godwin-Austen, 1874 SITTNA

Type locality:ประเทศสวีเดน **การแพร่กระจาย :**ภาคเหนือ **อ้างอิงจาก :**โอภาส (2544ก);จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

703. นกไต่ไม้ท้องสีเม็ดมะขาม (Chestnut-bellied Nuthatch) *Sitta castanea* Lesson, 1830

SITTCA

Type locality:ประเทศอินเดีย **การแพร่กระจาย :**ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ ภาคตะวันตก **อ้างอิงจาก :**โอภาส (2544ก);จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

704. นกไต่ไม้ใหญ่ (Giant Nuthatch) *Sitta magna* Ramsay, 1876 SITTMA

Type locality:ประเทศพม่า *การแพร่กระจาย* :ภาคเหนือ *อ้างอิงจาก* :โอภาส (2544ก);จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

705. นกไต่ไม้หน้าผากกำมะหยี่ (Velvet-fronted Nuthatch) *Sitta frontalis* Swainson, 1820

SITTFR

Type locality:ประเทศศรีลังกา *การแพร่กระจาย* :ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก และภาคใต้ *อ้างอิงจาก* :โอภาส (2544ก);จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

706. นกไต่ไม้สีน้ำเงิน (Blue Nuthatch) *Sitta azurea* Lesson, 1830

SITTAZ

Type locality:เกาะชวา ประเทศอินโดนีเซีย *การแพร่กระจาย* :ภาคใต้ *อ้างอิงจาก* :จารุจินต์ และคณะ (2550)

707. นกไต่ไม้สีสวย (Beautiful Nuthatch) *Sitta formosa* Blyth, 1843

SITTFO

Type locality:ประเทศอินเดีย *การแพร่กระจาย* :ภาคเหนือ *อ้างอิงจาก* :จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008); โอภาส (2544)

วงศ์นกเปลือกไม้ (Family Certhiidae)

708. นกเปลือกไม้ (Browb-throated Treecreeper) *Certhia discolor* Blyth, 1845

CERTDI

Type locality:ประเทศอินเดีย *การแพร่กระจาย* :ภาคเหนือ และ ภาคตะวันตก *อ้างอิงจาก* :โอภาส (2544ก);จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

วงศ์นกติดหน้าแดง (Family Remizidae)

709. นกติดหน้าแดง (Fire-capped Tit) *Cephalopyrus flammiceps*(Burton, 1836)

CEPHFL

Type locality:เทือกเขาหิมาลัย ประเทศเนปาล *การแพร่กระจาย* :ภาคเหนือ *อ้างอิงจาก* :โอภาส (2544ก);จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

วงศ์นกติด (Family Paridae)

710. นกติดใหญ่ (Great Tit) *Parus major* Linnaeus, 1758

PARUMA

Type locality:ประเทศสวีเดน *การแพร่กระจาย* :ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ *อ้างอิงจาก* :โอภาส (2544ก);จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

711. นกคิตแก้มเหลือง (Yellow-cheeked Tit) *Parus spilonotus* Bonaparte, 1850

PARUSP

Type locality: เขอกเขาหิมาลัย ประเทศเนปาล *การแพร่กระจาย* : ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ ภาคตะวันตก *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2544ก); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

712. นกคิตคิ้วเหลือง (Yellow-browed Tit) *Sylviparus modestus* Burton, 1836

SYLVMO

Type locality: ประเทศเนปาล *การแพร่กระจาย* : ภาคเหนือ *อ้างอิงจาก* : จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008) ; โอภาส (2544)

713. นกคิตสุลต่าน (Sultan Tit) *Melanochlora sultanea* (Hodgson, 1837)

MELASU

Type locality: ประเทศเนปาล *การแพร่กระจาย* : ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก และภาคใต้ *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2544ก); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

วงศ์นกคิตหัวแดง (Family Aegithalidae)

714. นกคิตหัวแดง (Black-throated Tit) *Aegithalos concinnus* (Gould) 1855. AEGICO

Type locality: ประเทศจีน *การแพร่กระจาย* : ภาคเหนือ *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2544ก); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

วงศ์นกนางแอ่น (Family Hirundinidae)

715. นกเจ้าฟ้าหญิงสิรินธร (White-eyed River-Martin) *Pseudochelidon sirintarae*

Thonglongya, 1968

PSEUSI

Type locality: บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ *การแพร่กระจาย* : ภาคกลาง *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2544ก); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

716. นกนางแอ่นทรายสร้อยคอดำ (Sand Martin) *Riparia riparia* (Linnaeus, 1758)

RIPARI

Type locality: เกาะ Sakhalin ประเทศรัสเซีย *การแพร่กระจาย* : ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก และภาคใต้ *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2544ก); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

717. นกนางแอ่นทรายสีน้ำตาล (Plain Martin) *Riparia paludicola* (Vieillot, 1817) RIPAPA

Type locality: ทางตอนใต้ของแอฟริกา *การแพร่กระจาย* : ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
อ้างอิงจาก : โอภาส (2544ก); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

718. นกนางแอ่นมาตินพันธุ์ไซบีเรีย (Northern House Martin) *Delichon urbica* (Linnaeus, 1758) DELIUR

Type locality: ประเทศสวีเดน *การแพร่กระจาย* : ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
อ้างอิงจาก : โอภาส (2544ก); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

719. นกนางแอ่นมาตินพันธุ์เอเชียใต้ (Asian House Martin) *Delichon dasypus* (Bonaparte, 1851) DELIDA

Type locality: เกาะบอร์เนียว ประเทศอินโดนีเซีย *การแพร่กระจาย* : ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก และภาคใต้ *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2544ก); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

720. นกนางแอ่นมาตินพันธุ์เนปาล (Nepal House Martin) *Delichon nipalensis* Horsfield & Moore, 1854 DELINI

Type locality: ประเทศเนปาล *การแพร่กระจาย* : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2544ก); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

721. นกนางแอ่นผาสีคล้ำ (Dusky Crag-Martin) *Hirundo concolor* Sykes, 1832 HIRUCO

Type locality: รัฐเบงกอล ประเทศอินเดีย *การแพร่กระจาย* : ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก และภาคใต้ *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2544ก); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

722. นกนางแอ่นบ้าน (Barn Swallow) *Hirundo rustica* Linnaeus, 1758 HIRURU

Type locality: ประเทศสวีเดน *การแพร่กระจาย* : ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก และภาคใต้ *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2544ก); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

723. นกนางแอ่นแปซิฟิก (Pacific Swallow) *Hirundo tahitica* Gmelin, 1789 HIRUTA

Type locality:ประเทศตาสิตี **การแพร่กระจาย :**ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ **อ้างอิงจาก :**โอบาส (2544ก); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

724. นกนางแอ่นหางลวด (Wire-tailed Swallow) *Hirundo smithii* Leach, 1818 HIRUSM

Type locality:ทางตะวันตกของแอฟริกา **การแพร่กระจาย :**ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ **อ้างอิงจาก :**โอบาส (2544ก); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

725. นกนางแอ่นตะโพกแดง (Red-rumped Swallow) *Cecropis daurica* Laxmann, 1769

CECRDA

Type locality:เมืองDaurian รัฐไซบีเรีย ประเทศรัสเซีย **การแพร่กระจาย :**ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก และภาคใต้ **อ้างอิงจาก :**โอบาส (2544ก); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

726. นกนางแอ่นลาย (Striated Swallow) *Cecropis striolata* Schlegel, 1844 CECRST

Type locality:เกาะชวา ประเทศอินโดนีเซีย **การแพร่กระจาย :**ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก และภาคใต้ **อ้างอิงจาก :**โอบาส (2544ก); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

วงศ์นกปรอด (Family Pycnonotidae)

727. นกปรอดหงอนปากหนา (Crested Finchbill) *Spizixos canifrons* Blyth, 1845 SPIZCA

Type locality:ประเทศอินเดีย **การแพร่กระจาย :**ภาคเหนือ **อ้างอิงจาก :**โอบาส (2544ข); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

728. นกปรอดแม่ทะ, ปรอดแม่พะ (Straw-headed Bulbul) *Pycnonotus zeylanicus* (Gmelin, 1789)

PYCNZE

Type locality:เกาะชวา ประเทศอินโดนีเซีย **การแพร่กระจาย :**ภาคใต้ **อ้างอิงจาก :**โอบาส (2544ข); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

729. นกปรอดลาย (Striated Bulbul) *Pycnonotus striatus* (Blyth, 1842) PYCNST

Type locality:ประเทศเนปาล **การแพร่กระจาย :**ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันตก **อ้างอิงจาก :**โอบาส (2544ข); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

730. นกปรอดดำปีกขาว (Black-and-white Bulbul) *Pycnonotus melanoleucos* (Eyton, 1839)

PYCNMELANO

Type locality: ประเทศมาเลเซีย *การแพร่กระจาย :* ภาคใต้ *อ้างอิงจาก :* โอภาส (2544ข); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

731. นกปรอดทอง (Black-headed Bulbul) *Pycnonotus atriceps* (Temminck, 1822)

PYCNAT

Type locality: เกาะชวา ประเทศอินโดนีเซีย *การแพร่กระจาย :* ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก และภาคใต้ *อ้างอิงจาก :* โอภาส (2544ข); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

732. นกปรอดเหลืองหัวจุก (Black-crested Bulbul) *Pycnonotus melanicterus* (Gmelin, 1789)

PYCNMELANI

Type locality: ประเทศศรีลังกา *การแพร่กระจาย :* ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก และภาคใต้ *อ้างอิงจาก :* โอภาส (2544ข); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

733. นกปรอดดอกลายเกล็ด (Scaly-breasted Bulbul) *Pycnonotus squamatus* (Temminck, 1828)

PYCNNSQ

Type locality: เกาะชวา ประเทศอินโดนีเซีย *การแพร่กระจาย :* ภาคใต้ *อ้างอิงจาก :* โอภาส (2544ข); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

734. นกปรอดท้องสีเทา (Grey-bellied Bulbul) *Pycnonotus cyaniventris* Blyth, 1842

PYCNNCY

Type locality: ประเทศสิงคโปร์ *การแพร่กระจาย :* ภาคใต้ *อ้างอิงจาก :* โอภาส (2544ข); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

735. นกปรอดหัวโขน (Red-whiskered Bulbul) *Pycnonotus jocosus* (Linnaeus, 1758)

PYCNJO

Type locality:ประเทศจีน **การแพร่กระจาย :**ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก และภาคใต้ **อ้างอิงจาก :**โอภาส (2544ข); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

736. นกปรอดหัวโขนก้นเหลือง (Brown-breasted Bulbul) *Pycnonotus zanthorrhous* Anderson, 1869 PYCNZA

Type locality:ประเทศจีน **การแพร่กระจาย :**ภาคเหนือ **อ้างอิงจาก :**โอภาส (2544ข); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

737. นกปรอดจีน (Light-vented Bulbul) *Pycnonotus sinensis* (Gmelin, 1789) PYCN SIN

Type locality:ประเทศจีน **การแพร่กระจาย :**ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ **อ้างอิงจาก :**โอภาส (2544ข); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

738. นกปรอดหัวสีเข้ม (Sooty-headed Bulbul) *Pycnonotus aurigaster* (Vieillot, 1818)

PYCNAU

Type locality:ประเทศจีน **การแพร่กระจาย :**ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก และภาคตะวันออก **อ้างอิงจาก :**โอภาส (2544ข); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

739. นกปรอดหงอนหลังลาย (Puff-backed Bulbul) *Pycnonotus eutilotus* (Jardine & Selby, 1837) PYCN EU

Type locality:ประเทศสิงคโปร์ **การแพร่กระจาย :**ภาคใต้ **อ้างอิงจาก :**โอภาส (2544ข); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

740. นกปรอดคอลาย (Stripe-throated Bulbul) *Pycnonotus finlaysoni* Strickland, 1844

PYCNFI

Type locality:ประเทศมาเลเซีย **การแพร่กระจาย :**ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก และภาคใต้ **อ้างอิงจาก :**โอภาส (2544ข); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

741. นกปรอดหัวตาขาว (Flavescent Bulbul) *Pycnonotus flavescentis* Blyth, 1845. PYCNFL

Type locality: ประเทศอินเดีย *การแพร่กระจาย* : ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก และภาคใต้ *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2544ข); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

742. นกปรอดหน้าขาว (Yellow-vented Bulbul) *Pycnonotus goiavier* (Scopoli) 1786

PYCNGO

Type locality: ประเทศฟิลิปปินส์ *การแพร่กระจาย* : ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก และภาคใต้ *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2544ข); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

743. นกปรอดสีไพลใหญ่ (Olive-winged Bulbul) *Pycnonotus plumosus* Blyth, 1845

PYCNPL

Type locality: ประเทศสิงคโปร์ *การแพร่กระจาย* : ภาคใต้ *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2544ข); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

744. นกปรอดสวน (Streak-eared Bulbul) *Pycnonotus blanfordi* Jerdon, 1862

PYCNBL

Type locality: ประเทศพม่า *การแพร่กระจาย* : ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก และภาคใต้ *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2544ข); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

745. นกปรอดสีน้ำตาลตาขาว (Cream-vented Bulbul) *Pycnonotus simplex* Lesson, 1839

PYCNSIM

Type locality: เกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย *การแพร่กระจาย* : ภาคใต้ *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2544ข); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

746. นกปรอดสีน้ำตาลตาแดง (Red-eyed Bulbul) *Pycnonotus brunneus* Blyth, 1845

PYCNBR

Type locality: ประเทศมาเลเซีย *การแพร่กระจาย* : ภาคใต้ *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2544ข); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

747. นกปรอดเล็กท้องเทา (Spectacled Bulbul) *Pycnonotus erythrophthalmos* (Hume, 1878)

PYCNER

Type locality:เมืองตะนาวศรี ทางตอนใต้ของประเทศพม่า **การแพร่กระจาย :**ภาคใต้ **อ้างอิงจาก :** โอลิวาส (2544ข); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

748. นกปรอดเล็กสีไพลตาแดง (Olive Bulbul) *Iole virescens* Blyth, 1845 LOLEVI

Type locality:เมืองArakan ประเทศพม่า **การแพร่กระจาย :**ภาคเหนือ และ ภาคตะวันตก
อ้างอิงจาก : โอลิวาส (2544ข); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

749. นกปรอดเล็กตาขาว (Grey-eyed Bulbul) *Iole propinqua* (Oustalet, 1903) IOLEPR

Type locality:ประเทศลาว **การแพร่กระจาย :**ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก
ภาคตะวันออก และภาคใต้ **อ้างอิงจาก :** โอลิวาส (2544ข); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

750. นกปรอดหงอนตาขาว (Buff-vented Bulbul) *Iole olivacea* Blyth, 1844 IOLEOL

Type locality:เกาะบอร์เนียว ประเทศอินโดนีเซีย**อ้างอิงจาก :** โอลิวาส (2544ข); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)**การแพร่กระจาย :**ภาคตะวันตก และภาคใต้

751. นกปรอดโองหน้าผากเทา (White-throated Bulbul) *Alophoixus flaveolus* (Gould, 1836)

ALOPFL

Type locality:ประเทศเนปาล **การแพร่กระจาย :**ภาคเหนือ ภาคตะวันตก **อ้างอิงจาก :** โอลิวาส (2544ข); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

752. นกปรอดโองเมืองเหนือ (Puff-throated Bulbul) *Alophoixus pallidus* (Swinhoe, 1870)

ALOPPA

Type locality:ประเทศจีน **การแพร่กระจาย :**ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ **อ้างอิงจาก :** โอลิวาส (2544ข); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

753. นกปรอดโองท้องสีน้ำตาล (Ochraceous Bulbul) *Alophoixus ochraceus* (Moore, 1854)

ALOPOC

Type locality:เมืองตะนาวศรี ทางตอนใต้ของประเทศพม่า **การแพร่กระจาย :**ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก และภาคใต้ **อ้างอิงจาก :** โอลิวาส (2544ข); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

754. นกปรอดโองแก้มเทา (Grey-cheeked Bulbul) *Alophoixus bres* (Lesson, 1832)

ALOPBR

Type locality: ประเทศญี่ปุ่น *การแพร่กระจาย :* ภาคใต้ *อ้างอิงจาก :* โอภาส (2544ข); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

755. นกปรอดโองไร้หงอน (Yellow-bellied Bulbul) *Alophoixus phaeocephalus* (Hartlaub, 1844)

ALOPPH

Type locality: ประเทศมาเลเซีย *การแพร่กระจาย :* ภาคใต้ *อ้างอิงจาก :* โอภาส (2544ข); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

756. นกปรอดสีลำไต้คอเหลือง (Finsch's Bulbul) *Alophoixus finschii* (Salvadori, 1871)

ALOPFI

Type locality: ประเทศอินโดนีเซีย *การแพร่กระจาย :* ภาคใต้ *อ้างอิงจาก :* โอภาส (2544ข); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

757. นกปรอดหลังฟู (Hairy-backed Bulbul) *Tricholestes criniger* (Blyth, 1845)

TRICCR

Type locality: ประเทศมาเลเซีย *การแพร่กระจาย :* ภาคตะวันตก และภาคใต้ *อ้างอิงจาก :* โอภาส (2544ข); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

758. นกปรอดหลังเขียวอกลาย (Streaked Bulbul) *Ixos malaccensis* Blyth, 1845

IXOSMA

Type locality: Malacca ประเทศมาเลเซีย *การแพร่กระจาย :* ภาคใต้ *อ้างอิงจาก :* โอภาส (2544ข); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

759. นกปรอดสีขี้เถ้า (Ashy Bulbul) *Hemixos flavala* (Blyth, 1845)

HEMIFL

Type locality: ที่อกเขาหิมาลัย ประเทศเนปาล *การแพร่กระจาย :* ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก และภาคใต้ *อ้างอิงจาก :* จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008); โอภาส (2544)

760. นกปรอดภูเขา (Mountain Bulbul) *Hypsipetes mccllellandii* Horsfield, 1840**HYPSCMC**

Type locality: รัฐอัสสัม ประเทศอินเดีย *การแพร่กระจาย :* ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก และภาคใต้ *อ้างอิงจาก :* โอภาส (2544ข); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

761. นกปรอดดำ (Black Bulbul) *Hypsipetes leucocephalus* (Gmelin, 1789) **HYPSSLE**

Type locality: ประเทศจีน *การแพร่กระจาย :* ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก และภาคใต้ *อ้างอิงจาก :* โอภาส (2544ข); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

762. นกปรอดเทาหัวขาว (White-headed Bulbul) *Hypsipetes thompsoni* (Bingham, 1900)**HYPSTH**

Type locality: รัฐฉาน ทางตอนเหนือของประเทศพม่า *การแพร่กระจาย :* ภาคเหนือ และภาคตะวันตก *อ้างอิงจาก :* โอภาส (2544ข); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008); โอภาส (2544)

วงศ์นกยอดข้าวและนกกระจิบหญ้า (Family Cisticolidae)**763. นกกระจิบหญ้าน้ำตาล (Brown Prinia) *Prinia polychroa* (Temminck, 1828)****PRINPO**

Type locality: เกาะชวา ประเทศอินโดนีเซีย *การแพร่กระจาย :* ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ *อ้างอิงจาก :* โอภาส (2544ข); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

764. นกกระจิบหญ้าหัวเขียว (Hill Prinia) *Prinia atrogularis* (Moore, 1854) **PRINAT**

Type locality: เมืองดาร์จีลิง ประเทศอินเดีย *การแพร่กระจาย :* ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ *อ้างอิงจาก :* โอภาส (2544ข); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

765. นกกระจิบหญ้าสีข้างแดง (Rufescent Prinia) *Prinia rufescens* Blyth, 1847 **PRINRU**

Type locality: Arracan (Arakan) ทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศพม่า *การแพร่กระจาย :* ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก และภาคใต้ *อ้างอิงจาก :* โอภาส (2544ข); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

766. นกกระจิบหญ้าอกเทา (Grey-breasted Prinia) *Prinia hodgsonii* Blyth, 1844**PRINHO**

Type locality: ประเทศอินเดีย **การแพร่กระจาย :** ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก และภาคตะวันออก **อ้างอิงจาก :** โอภาส (2544ข); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

767. นกกระจับหน้าท้องเหลือง (Yellow-bellied Prinia) *Prinia flaviventris* (Delessert, 1840)

PRINFL

Type locality: รัฐเบงกอล ประเทศอินเดีย **การแพร่กระจาย :** ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก และภาคใต้ **อ้างอิงจาก :** โอภาส (2544ข); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

768. นกกระจับหน้าสีเขียว (Plain Prinia) *Prinia inornata* Sykes, 1832 **PRININ**

Type locality: Dukhun ประเทศอินเดีย **การแพร่กระจาย :** ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก **อ้างอิงจาก :** โอภาส (2544ข); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

วงศ์นกแว่นตาขาว (Family Zosteropidae)

769. นกแว่นตาขาวข้างแดง (Chestnut-flanked White-eye) *Zosterops erythropleurus* Swinhoe, 1863 **ZOSTER**

Type locality: ประเทศจีน **การแพร่กระจาย :** ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ **อ้างอิงจาก :** โอภาส (2544ข); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

770. นกแว่นตาขาวสีทอง (Oriental White-eye) *Zosterops palpebrosus* (Temminck, 1824)

ZOSTPA

Type locality: ประเทศอินเดีย **การแพร่กระจาย :** ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก และภาคใต้ **อ้างอิงจาก :** โอภาส (2544ข); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

771. นกแว่นตาขาวหลังเขียว (Japanese White-eye) *Zosterops japonicus* Temminck & Schlegel, 1847 **ZOSTJA**

Type locality: ประเทศญี่ปุ่น **การแพร่กระจาย :** ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ **อ้างอิงจาก :** โอภาส (2544ข); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

772. นกแว่นตาขาวสีเหลืองปากขี้ได้ (Everett's White-eye) *Zosterops evereti* Tweeddale, 1878.

ZOSTEV

Type locality: เกาะเซบู ประเทศฟิลิปปินส์ *การแพร่กระจาย:* ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก และภาคใต้ *อ้างอิงจาก:* โอบาส (2544ข); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

วงศ์นกกระजิบ นกพง และนกกระจิด (Family Sylviidae)

773. นกจูนจู้หัวสีน้ำตาล (Chestnut-headed Tesia) *Tesia castaneocoronata* (Burton, 1836)

TESICA

Type locality: ที่อกเขาหิมาลัย *การแพร่กระจาย:* ภาคเหนือ *อ้างอิงจาก:* โอบาส (2544ข); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

774. นกจูนจู้, นกจูนจู้หัวเหลือง (Slaty-bellied Tesia) *Tesia olivæ* (McClelland, 1840)

TESIOL

Type locality: รัฐอัสสัม ประเทศอินเดีย *การแพร่กระจาย:* ภาคเหนือ และภาคตะวันตก *อ้างอิงจาก:* โอบาส (2544ข); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

775. นกจูนจู้ท้องเทา (Grey-bellied Tesia) *Tesia cyaniventer* Hodgson, 1837 **TESICY**

Type locality: ประเทศเนปาล *การแพร่กระจาย:* ภาคเหนือ *อ้างอิงจาก:* โอบาส (2544ข); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

776. นกกระจ้อยหัวลาย (Asian Stubtailed) *Urosphena squameiceps* (Swinhoe, 1863)

UROSSQ

Type locality: ประเทศจีน *การแพร่กระจาย:* ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก และภาคใต้ *อ้างอิงจาก:* โอบาส (2544ข); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

777. นกกระจ้อยสีไพล (Pale-footed Bush Warbler) *Cettia pallidipes* (Blanford, 1872)

CETTPA

Type locality: ประเทศอินเดีย *การแพร่กระจาย:* ภาคเหนือ *อ้างอิงจาก:* โอบาส (2544ข); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

778. นกกระจ๊อยนักร้อง (Manchurian Bush Warbler) *Cettia canturians* (Swinhoe, 1860)

CETTCA

Type locality: ประเทศญี่ปุ่น การแพร่กระจาย : ภาคเหนือ อ้างอิงจาก : โอภาส (2544ข); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

779. นกกระจ๊อยใหญ่ (Chestnut-crowned Bush Warbler) *Cettia major* (Horsfield and Moore, 1854) CETTMA

Type locality: ประเทศเนปาล การแพร่กระจาย : ภาคเหนือ อ้างอิงจาก : โอภาส (2544ข); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

780. นกกระจ๊อยเหลืองไฟ (Aberrant Bush Warbler) *Cettia flavolivacea* (Blyth, 1845)

CETTFL

Type locality: ประเทศเนปาล การแพร่กระจาย : ภาคเหนือ อ้างอิงจาก : โอภาส (2544ข); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

781. นกกระจ๊อยพันธุ์จีน (Chinese Bush Warbler) *Bradypterus tacsanowskii* (Swinhoe, 1871)

BRADTA

Type locality: ประเทศรัสเซีย การแพร่กระจาย : ภาคเหนือ อ้างอิงจาก : โอภาส (2544ข); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

782. นกกระจ๊อยอกเทา (Spotted Bush Warbler) *Bradypterus thoracicus* (Blyth, 1845)

CASMAL

Type locality: รัฐฉาน ประเทศพม่า การแพร่กระจาย : ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันตก อ้างอิงจาก : โอภาส (2544ข); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

783. นกกระจ๊อยสีน้ำตาล (Brown Bush Warbler) *Bradypterus luteoventris* (Hodgson, 1845)

BRADLU

Type locality: ประเทศเนปาล การแพร่กระจาย : ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อ้างอิงจาก : โอภาส (2544ข); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

784. นกกระจ๊อยเขาสูง (Russet Bush Warbler) *Bradypterus mandelli* (Brooks, 1875)

BRADMA

Type locality: สึกขิม *การแพร่กระจาย :* ภาคเหนือ *อ้างอิงจาก :* โอภาส (2544ข); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

785. นกยอดข้าวหางแพนลาย (Zitting Cisticola) *Cisticola juncidis* (Rafinesque, 1810)**CISTJU**

Type locality: ทวีปยุโรปตอนใต้ *การแพร่กระจาย :* ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก และภาคใต้ *อ้างอิงจาก :* โอภาส (2544ข); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

786. นกยอดข้าวหางแพนหัวแดง (Bright-capped Cisticola) *Cisticola exilis* (Vigors & Horsfield, 1827) CISTEX

Type locality: นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย *การแพร่กระจาย :* ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก และภาคตะวันออก *อ้างอิงจาก :* โอภาส (2544ข); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

787. นกพงตึกแต่นอกลาย (Lanceolated Warbler) *Locustella lanceolata* (Temminck, 1840)**LOCULA**

Type locality: ประเทศรัสเซีย *การแพร่กระจาย :* ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก และภาคใต้ *อ้างอิงจาก :* โอภาส (2544ข); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

788. นกพงตึกแต่นท้ายทอยสีเทา (Rusty-rumped Warbler) *Locustella certhiola* (Pallas, 1811)**LOCUCE**

Type locality: ทางตอนเหนือของเอเชีย *การแพร่กระจาย :* ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก และภาคใต้ *อ้างอิงจาก :* โอภาส (2544ข); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

789. นกพงคิ้วดำ (Black-browed Reed Warbler) *Acrocephalus bistrigiceps* Swinhoe, 1860**ACROBI**

Type locality:ประเทศจีน **การแพร่กระจาย :**ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก และภาคใต้ **อ้างอิงจาก :**โอภาส (2544ข);จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

790. นกพงนาหิมาลัย (Paddyfield Reed Warbler) *Acrocephalus agricola* (Jerdon, 1845)

ACROAG

Type locality:เทือกเขาหิมาลัย **การแพร่กระจาย :**ภาคเหนือ **อ้างอิงจาก :**โอภาส (2544ข);จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

791. นกพงนาพันธุ้แมนจูเรีย (Manchurian Reed Warbler) *Acrocephalus tangorum* La Touche, 1912

ACROTA

Type locality:ประเทศจีน (Chin-wang-tao, north east Heibei, China)**การแพร่กระจาย :**ภาคกลาง **อ้างอิงจาก :**จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

792. นกพงนาพันธุ้จีน (Blunt-winged Reed Warbler) *Acrocephalus concinens* (Swinhoe, 1870)

ACROCO

Type locality:ประเทศจีน **การแพร่กระจาย :**ภาคเหนือ และภาคกลาง **อ้างอิงจาก :**โอภาส (2544ข); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

793. นกพงนาพันธุ้อินเดีย (Blyth's Reed Warbler) *Acrocephalus dumetorum* Blyth, 1849

ACRODU

Type locality:ประเทศอินเดีย **การแพร่กระจาย :**ภาคเหนือ ภาคกลาง **อ้างอิงจาก :**สมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย (2554)

794. นกพงใหญ่พันธุ้อินเดีย (Clamorous Reed Warbler) *Acrocephalus stentoreus* (Ehrenberg, 1771)

ACROST

Type locality:ประเทศอียิปต์ **การแพร่กระจาย :**ภาคเหนือ และภาคกลาง **อ้างอิงจาก :**โอภาส (2544ข);จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

795. นกพงใหญ่พันธุ้ญี่ปุ่น (Oriental Reed Warbler) *Acrocephalus orientalis* (Temminck & Schlegel, 1847)

ACROORIE

Type locality:ประเทศไทยญี่ปุ่น **การแพร่กระจาย :**ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก และภาคใต้ **อ้างอิงจาก :**โอภาส (2544ข);จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

796. นกพงปากหนา (Thick-billed Reed Warbler) *Acrocephalus aedon* (Pallas, 1776)

ACROAE

Type locality:ประเทศรัสเซีย **การแพร่กระจาย :**ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก และภาคใต้ **อ้างอิงจาก :**โอภาส (2544ข);จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

797. นกพงปากยาว (Large-billed Reed Warbler) *Acrocephalus orinus* Oberholser, 1905

ACROORIN

Type locality:ประเทศอินเดีย (Himachal Pradesh, India) **การแพร่กระจาย :**ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก และภาคใต้ **อ้างอิงจาก :**สมาคมอนุรักษ์และธรรมชาติแห่งประเทศไทย (2554)

798. นกหางนาค (Striated Grassbird) *Megalurus palustris* Horsfield, 1821 MEGAPA

Type locality:เกาะชวา ประเทศอินโดนีเซีย **การแพร่กระจาย :**ภาคเหนือ และภาคกลาง **อ้างอิงจาก :**โอภาส (2544ข);จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

799. นกพงหญ้า (Rufous-rumped Warbler) *Graminicola bengalensis* Jerdon, 1863

GRAMBE

Type locality:เกาะไหหลำ **การแพร่กระจาย :**ภาคกลาง **อ้างอิงจาก :**โอภาส (2544ข); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

800. นกกระจิบภูเขา (Mountain Tailorbird) *Orthotomus cuculatus* Temminck, 1836

ORTHCU

Type locality:เกาะชวา ประเทศอินโดนีเซีย **การแพร่กระจาย :**ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก และภาคใต้ **อ้างอิงจาก :**โอภาส (2544ข); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

801. นกกระจิบธรรมดา (Common Tailorbird) *Orthotomus sutorius* (Pennant, 1769)**ORTHSU**

Type locality: ประเทศศรีลังกา *การแพร่กระจาย* : ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก และภาคใต้ *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2544ข); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

802. นกกระจิบคอดำ (Dark-necked Tailorbird) *Orthotomus atrogularis* Temminck, 1836**ORTHAT**

Type locality: ประเทศมาเลเซีย *การแพร่กระจาย* : ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก และภาคใต้ *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2544ข); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

803. นกกระจิบกระหม่อมแดง (Rufous-tailed Tailorbird) *Orthotomus sericeus* Temminck, 1836**ORTHSE**

Type locality: เกาะบอร์เนียว ประเทศอินโดนีเซีย *การแพร่กระจาย* : ภาคใต้ *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2544ข); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

804. นกกระจิบหัวแดง (Ashy Tailorbird) *Orthotomus ruficeps* (Lesson, 1830)**ORTHRU**

Type locality: Malacca ประเทศมาเลเซีย *การแพร่กระจาย* : ภาคใต้ *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2544ข); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

805. นกกระจัดท้องสีน้ำตาล (Buff-throated Warbler) *Phylloscopus subaffinis* Ogilvie-Grant, 1900**PHYLSU**

Type locality: ประเทศจีน *การแพร่กระจาย* : ภาคเหนือ และภาคกลาง *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2544ข); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

806. นกกระจัดสีคล้ำ (Dusky Warbler) *Phylloscopus fuscatus* (Blyth, 1842)**PHYLFU**

Type locality: รัฐเบงกอล ประเทศอินเดีย *การแพร่กระจาย* : ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก และภาคตะวันออก *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2544ข); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

807. นกกระจิ๊ดอกลายเหลือง (Yellow-streaked Warbler) *Phylloscopus armandii* (Milne-Edwards, 1865) PHYLAR

Type locality: ประเทศจีน *การแพร่กระจาย* : ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ ภาคตะวันออก *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2544ข); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

808. นกกระจิ๊ดปากหนา (Radde's Warbler) *Phylloscopus schwarzi* (Radde, 1863) PHYLSC

Type locality: ประเทศรัสเซีย *การแพร่กระจาย* : ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก และภาคตะวันออก *อ้างอิงจาก*: โอภาส (2544ข); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

809. นกกระจิ๊ดธรรมดา (Yellow-browed Warbler) *Phylloscopus inornatus* (Blyth, 1842) PHYLIN

Type locality: รัฐเบงกอล ประเทศอินเดีย *การแพร่กระจาย* : ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก และภาคใต้ *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2544ข); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008); โอภาส (2544)

810. นกกระจิ๊ดพันธุ์หิมาลัย (Hume's Warbler) *Phylloscopus humei* (Brooks, 1878) PHYLHU

Type locality: ตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศอินเดีย *การแพร่กระจาย* : ภาคเหนือ *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2544ข); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

811. นกกระจิ๊ดขั้วโลกเหนือ (Arctic Warbler) *Phylloscopus borealis* (Blasius) 1858. PHYLBO

Type locality: Naumannia (Sea of Okhotsk) *การแพร่กระจาย* : ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก และภาคใต้ *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2544ข); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

812. นกกระจิ๊ดเขียวคล้า (Greenish Warbler) *Phylloscopus trochiloides* (Sundevall, 1837) PHYLTR

Type locality: รัฐเบงกอล ประเทศอินเดีย *การแพร่กระจาย* : ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันตก *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2544ข); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

813. นกกระจัดเขียวปีกสองแถบ (Two-barred Warbler) *Phylloscopus plumbeitarsus* Swinhoe,

1861 PHYLPL

Type locality:เมืองHopeh ประเทศจีน *การแพร่กระจาย* :ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก และภาคใต้ *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2544ข); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

814. นกกระจัดขาสีอ่อน (Pale-legged Leaf Warbler) *Phylloscopus tenellipes* Swinhoe, 1860

PHYLTE

Type locality:เมืองFukien ประเทศจีน *การแพร่กระจาย* :ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก และภาคใต้ *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2544ข); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

815. นกกระจัดหัวมงกุฎ (Eastern Crowned Warbler) *Phylloscopus coronatus* (Temminck and Schlegel, 1847) PHYLCO

Type locality:ประเทศญี่ปุ่น *การแพร่กระจาย* :ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก และภาคใต้ *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2544ข); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

816. นกกระจัดหางขาวใหญ่ (Blyth's Leaf Earbler) *Phylloscopus reguloides* (Blyth, 1842)

PHYLRE

Type locality:ประเทศอินเดีย *การแพร่กระจาย* :ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก และภาคตะวันออก *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2544ข); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

817. นกกระจัดหางขาวเล็ก (Davison's Leaf-Warbler) *Phylloscopus davisoni* (Oates, 1889)

PHYLDA

Type locality:เมืองตะนาวศรี ทางตอนใต้ของประเทศพม่า *การแพร่กระจาย* :ภาคเหนือ ภาคตะวันตก และภาคตะวันออก *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2544ข); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

818. นกกระจิ๊ดคิ้วดำท้องขาว (Yellow-vented Warbler) *Phylloscopus cantator* (Tickell) 1833.

PHYLCA

Type locality:เทือกเขาหิมาลัย *การแพร่กระจาย* :ภาคเหนือ และ ภาคตะวันตก *อ้างอิงจาก* :
โอบาส (2544ข); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

819. นกกระจิ๊ดคิ้วดำท้องเหลือง (Sulphur-breasted Warbler) *Phylloscopus ricketti* (Slater, 1897) PHYLRI

Type locality:เมืองกวางตุ้ง ประเทศจีน *การแพร่กระจาย* :ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคกลาง ภาคตะวันตก และภาคตะวันออก *อ้างอิงจาก* : โอบาส (2544ข); จารุจินต์ และคณะ
(2550); Robson (2008)

820. นกกระจิ๊ดภูเขา (Mountain Leaf Warbler) *Phylloscopus trivirgatus* Strickland, 1849
PHYLTRI

Type locality:เกาะชวา ประเทศอินโดนีเซีย *การแพร่กระจาย* : ภาคเหนือ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก และภาคใต้ *อ้างอิงจาก* : จารุจินต์
และคณะ (2550)

821. นกกระจิ๊ดแถบปีกสีส้ม (Buff-barred Warbler) *Phylloscopus pulcher* Blyth, 1845
PHYLPUR

Type locality:ประเทศเนปาล *การแพร่กระจาย* :ภาคเหนือ และ ภาคตะวันตก *อ้างอิงจาก* :
โอบาส (2544ข); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson, (2008)

822. นกกระจิ๊ดคอสีเทา (Ashy-throated Warbler) *Phylloscopus maculipennis* (Blyth) 1867.
PHYLMA

Type locality:ประเทศเนปาล *การแพร่กระจาย* :ภาคเหนือ *อ้างอิงจาก* : โอบาส (2544ข); จารุจินต์
และคณะ (2550); Robson (2008)

823. นกกระจิ๊ดตะโพกเหลืองคิ้วเหลือง (Pallas's Leaf Warbler) *Phylloscopus proregulus* (Pallas, 1811) PHYLPR

*Type locality:*ที่อกเขาหิมาลัย *การแพร่กระจาย :*ภาคเหนือ *อ้างอิงจาก :* โอภาส (2544ข); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

824. นกกระจัดตะโพกเหลืองคิ้วขาว (Lemmon-rumped Warbler) *Phylloscopus chloronotus* (Gray, 1846) PHYLCH

*Type locality:*ประเทศเนปาล *การแพร่กระจาย :*ภาคเหนือ *อ้างอิงจาก :* โอภาส (2544ข); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

825. นกกระจัดพันธุ์จีน (Chinese Leaf Earbler) *Phylloscopus sichuanensis* Alstorm, Olsson and Colston, 1992 BPHYLSI

*Type locality:*มณฑลเสฉวน ประเทศจีน *การแพร่กระจาย :*ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ *อ้างอิงจาก :* โอภาส (2544ข); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

826. นกแว่นตาเหลืองหัวเทา (Grey-crowned Warbler) *Seicercys tephrocephalus* Anderson, 1871 SEICTE

*Type locality:*ประเทศพม่า *การแพร่กระจาย :*ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ *อ้างอิงจาก :* โอภาส (2544ข); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

827. นกแว่นตาเหลืองพันธุ์จีน (Omei Warbler) *Seicercus omeiensis* Martens Eck, Packert & Sun, 1999 SEICOM

*Type locality:*ที่อกเขาหิมาลัย *การแพร่กระจาย :*ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก และภาคใต้ *อ้างอิงจาก :* โอภาส (2544ข); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

828. นกแว่นตาเหลืองคิ้วสั้น (Plain-tailed Warbler) *Seicercus soror* Alstrom & Olsson, 1999 SEICSO

*Type locality:*ไม่ทราบสถานที่พบครั้งแรก *การแพร่กระจาย :*ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก และภาคใต้ *อ้างอิงจาก :* โอภาส (2544ข); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

829. นกแว่นตาเหลืองปีกแถบขวาง (Bianchi's Warbler) *Seicercus valentine* E. Hartert, 1907

SEICVA

*Type locality:*ทางตอนใต้ของประเทศจีน *การแพร่กระจาย* : ภาคเหนือ *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2544ข); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

830. นกกระจ๊อยแก้มเทา (Grey-cheeked Warbler) *Seicercus poliogenys* (Blyth, 1847)**SEICPO**

*Type locality:*เมืองDarjeeling ประเทศอินเดีย *การแพร่กระจาย* : ภาคเหนือ *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2544ข); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

831. นกกระจ๊อยคอขาว (Yellow-bellied Warbler) *Abroscopus superciliaris* (Blyth, 1859)**ABROSU**

Type locality: เมืองตะนาวศรี ทางตอนใต้ของประเทศพม่า *การแพร่กระจาย* : ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก และภาคใต้ *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2544ข); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

832. นกกระจ๊อยกระหม่อมแดง (Chestnut-crowned Warbler) *Seicercus castaniceps* (Hodgson, 1845) SEICCA

*Type locality:*ประเทศเนปาล *การแพร่กระจาย* : ภาคเหนือ ภาคตะวันตก และภาคใต้ *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2544ข); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

833. นกกระจ๊อยคอดำ (Rufous-faced Warbler) *Abroscopus albogularis* (Hodgson, 1854)**ABROAL**

*Type locality:*ประเทศเนปาล *การแพร่กระจาย* : ภาคเหนือ *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2544ข); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

834. นกคอขาวน้อย (Lesser Whitethroat) *Sylvia curruca*(Linnaeus, 1758) SYLVUCU

*Type locality:*ประเทศสวีเดน (south Sweden)*การแพร่กระจาย* : ภาคเหนือ และภาคกลาง *อ้างอิงจาก* : จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

วงศ์นกกระจ๊อยป่าโก่งกาง (Family Acanthizidae)

835. นกกระจ๊อยป่าโคงกาง (Golden-bellied Gerygone) *Gerygone sulphurea* Wallace, 1864

GERYSU

Type locality: เกาะ Solor ในหมู่เกาะ Lesser Sunda ประเทศอินโดนีเซีย (Solor Island, Lesser Sunda Island, Indonesia) *การแพร่กระจาย :* ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ *อ้างอิงจาก :* จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

วงศ์นกกินแมลงและนกกะราง (Family Timaliidae)

836. นกกระรางหัวหงอก (White-crested Laughingthrush) *Garrulax leucolophus* (Hardwicke, 1815) GARRLE

Type locality: เขอกเขาหิมาลัย *การแพร่กระจาย :* ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก และภาคตะวันออก *อ้างอิงจาก :* โอภาส (2544ข); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

837. นกกระรางสร้อยคอเล็ก (Lesser Necklaced Laughingthrush) *Garrulax monileger* (Hodgson, 1836) GARRMO

Type locality: ประเทศเนปาล *การแพร่กระจาย :* ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก และภาคตะวันออก *อ้างอิงจาก :* โอภาส (2544ข); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

838. นกกระรางสร้อยคอใหญ่ (Greater Necklaced Laughingthrush) *Garrulax pectoralis* (Gould, 1836) GARRPE

Type locality: ประเทศเนปาล *การแพร่กระจาย :* ภาคเหนือ และ ภาคตะวันตก *อ้างอิงจาก :* โอภาส (2544ข); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

839. นกกระรางสีดำ (Black Laughingthrush) *Garrulax lugubris* (Mueller) 1835. GARRLU

Type locality: เกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย *การแพร่กระจาย :* ภาคใต้ *อ้างอิงจาก :* โอภาส (2544ข); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

840. นกกระรางอกสีน้ำตาลไหม้ (White-necked Laughingthrush) *Garrulax strepitans* Blyth, 1855 GARRST

Type locality: ประเทศพม่า *การแพร่กระจาย :* ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันตก *อ้างอิงจาก :* โอภาส (2544ข); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

841. นกกระรางคอดำ, นกขอู้ (Black-throated Laughingthrush) *Garrulax chinensis* (Scopoli, 1786) GARRCH

Type locality: ประเทศจีน *การแพร่กระจาย* : ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันตก
อ้างอิงจาก : โอภาส (2544ข); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

842. นกกระรางวงตาขาว (Chestnut-capped Laughingthrush) *Garrulax mitratus* (Mueller, 1835) GARRMI

Type locality: เกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย *การแพร่กระจาย* : ภาคใต้ *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2544ข); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

843. นกกระรางอกลาย (Spot-breasted Laughingthrush) *Garrulax merulinus* Blyth, 1851 GARRME

Type locality: Khasia Hills รัฐอัสสัม ทางตอนเหนือประเทศอินเดีย *การแพร่กระจาย* : ภาคเหนือ
อ้างอิงจาก : โอภาส (2544ข); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

844. นกกระรางลิ่วขาว (White-browed Laughingthrush) *Garrulax sannio* Swinhoe, 1867 GARRSA

Type locality: ประเทศจีน *การแพร่กระจาย* : ภาคเหนือ *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2544ข); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

845. นกกระรางหัวแดง (Chestnut-crowned Laughingthrush) *Garrulax erythrocephalus* (Vigors, 1832) GARRER

Type locality: เทือกเขาหิมาลัย *การแพร่กระจาย* : ภาคเหนือ ภาคตะวันตก และภาคใต้
อ้างอิงจาก : โอภาส (2544ข); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

846. นกกระรางหางแดง (Red-tailed Laughingthrush) *Garrulax milnei* (David, 1874) GARRMI

Type locality: ประเทศจีน *การแพร่กระจาย* : ภาคเหนือ *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2544ข); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

847. นกกระรางแก้มแดง (Red-faced Liocichla) *Liocichla phoenicea* (Gould, 1837) LIOCPH

Type locality:ประเทศเนปาล **การแพร่กระจาย :**ภาคเหนือ **อ้างอิงจาก :** โอภาส (2544ข); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

848. นกกินแมลงป่าสีน้ำตาลแดง (Ferruginous Babbler) *Trichastoma bicolor* (Lesson, 1839)

TRICBI

Type locality:เกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย **การแพร่กระจาย :**ภาคใต้ **อ้างอิงจาก :** โอภาส (2544ข); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

849. นกกินแมลงป่าชายเลน (White-chested Babbler) *Trichastoma rostratum* Blyth, 1842

TRICRO

Type locality:ประเทศสิงคโปร์ **การแพร่กระจาย :**ภาคใต้ **อ้างอิงจาก :** โอภาส (2544ข); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

850. นกกินแมลงป่าฝน (Abbott's Babbler) *Malacocincla abbotti* Blyth, 1845 MALAAB

Type locality:ประเทศพม่า **การแพร่กระจาย :**ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ **อ้างอิงจาก :** โอภาส (2544ข); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

851. นกกินแมลงปากหนา (Horsfield's Babbler) *Malacocincla sepiarium* (Horsfield, 1821)

MALASE

Type locality:ประเทศมาเลเซีย **การแพร่กระจาย :**ภาคใต้ **อ้างอิงจาก :** โอภาส (2544ข); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

852. นกกินแมลงป่าหางสั้น (Short-tailed Babbler) *Malacocincla malaccensis* (Hartlaub, 1844)

MALAMA

Type locality: Malacca ประเทศมาเลเซีย **การแพร่กระจาย :**ภาคใต้ **อ้างอิงจาก :** โอภาส (2544ข); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

853. นกกินแมลงป่าอกสีน้ำตาล (Buff-breasted Babbler) *Pellorneum tickelli* Blyth, 1859

PELLTI

Type locality:ประเทศพม่า **การแพร่กระจาย :**ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก และภาคใต้ **อ้างอิงจาก :** โอภาส (2544ข); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

854. นกจาบดินสีน้ำตาลคอย (Spot-throated Babbler) *Pellorneum albiventre* (Godwin-Austen) 1877. PELLAL

Type locality: หุบเขา Manipur ประเทศอินเดีย *การแพร่กระจาย:* ภาคเหนือ *อ้างอิงจาก:* โอภาส (2544ข); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

855. นกจาบดินนอกลาย (Puff-throated Babbler) *Pellorneum ruficeps* Swainson, 1832 PELLRU

Type locality: ประเทศอินเดีย *การแพร่กระจาย:* ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก และภาคใต้ *อ้างอิงจาก:* โอภาส (2544ข); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

856. นกจาบดินหัวดำ (Black-capped Babbler) *Pellorneum capistratum* (Temminck, 1823)

PELLCA

Type locality: เกาะชวา ประเทศอินโดนีเซีย *การแพร่กระจาย:* ภาคใต้ *อ้างอิงจาก:* โอภาส (2544ข); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

857. นกกินแมลงหัวสีน้ำตาล (Moustached Babbler) *Malacopteron magnirostre* (Moore, 1854)

MALAMAGNI

Type locality: ประเทศมาเลเซีย *การแพร่กระจาย:* ภาคใต้ *อ้างอิงจาก:* โอภาส (2544ข); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

858. นกกินแมลงหัวสีคล้ำ (Sooty-capped Babbler) *Malacopteron affine* (Blyth, 1842)

MALAAF

Type locality: ประเทศสิงคโปร์ *การแพร่กระจาย:* ภาคใต้ *อ้างอิงจาก:* จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008); โอภาส (2544)

859. นกกินแมลงหัวแดงเล็ก (Scaly-crowned Babbler) *Malacopteron cinereum* Eyton, 1839

MALACI

Type locality: ประเทศมาเลเซีย *การแพร่กระจาย:* ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้ *อ้างอิงจาก:* โอภาส (2544ข); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

860. นกกินแมลงหัวแดงใหญ่ (Rufous-crowned Babbler) *Malacopteron magnum* Eyton, 1839

MALAMAGNU

Type locality: ประเทศมาเลเซีย *การแพร่กระจาย :* ภาคใต้ *อ้างอิงจาก :* โอภาส (2544ข); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

861. นกกระจังไฟพรปากยาว (Large Scimitar Babbler) *Pomatorhinus hypoleucos* (Blyth, 1844)**POMAHY**

Type locality: เมืองArakan ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศพม่า *การแพร่กระจาย :* ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก และภาคใต้ *อ้างอิงจาก :* โอภาส (2544ข); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

862. นกกระจังไฟพรแก้มสีน้ำตาล (Rusty-checked Scimitar Babbler) *Pomatorhinus erythrognys*

Vigors, 1832 **POMAER**

Type locality: ประเทศเนปาล *การแพร่กระจาย :* ภาคเหนือ *อ้างอิงจาก :* โอภาส (2544ข); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

863. นกกระจังไฟพรปากเหลือง (White-browed Scimitar Babbler) *Pomatorhinus schisticeps*

Hodgson, 1836 **POMASC**

Type locality: ประเทศเนปาล *การแพร่กระจาย :* ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก และภาคใต้ *อ้างอิงจาก :* โอภาส (2544ข); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

864. นกกระจังไฟพรหลังแดง (Chestnut-backed Scimitar Babbler) *Pomatorhinus montanus*

Horsfield, 1821 **POMAMO**

Type locality: เกาะชวา ประเทศอินโดนีเซีย *การแพร่กระจาย :* ภาคใต้ *อ้างอิงจาก :* โอภาส (2544ข); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

865. นกกระจังไฟพรปากแดงยาว (Red-billed Scimitar-Babbler) *Pomatorhinus ochraceiceps*

Walden, 1873 **POMAOC**

Type locality: ประเทศพม่า *การแพร่กระจาย :* ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันตก *อ้างอิงจาก :* โอภาส (2544ข); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

866. นกกระจ่างไพรปากแดงสั้น (Coral-billed Scimitar Babbler) *Pomatorhinus ferruginosus*

Blyth, 1845 POMAFE

Type locality: ประเทศอินเดีย การแพร่กระจาย : ภาคเหนือ และภาคตะวันตก อ้างอิงจาก : โอภาส (2544ข); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

867. นกจิ้งตัวลาย (Striped Wren Babbler) *Kenopia striata* (Blyth, 1842) KENOST

Type locality: ประเทศสิงคโปร์ การแพร่กระจาย : ภาคใต้ อ้างอิงจาก : โอภาส (2544ข); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

868. นกจิ้งตัวหางยาว (Long-tailed Wren Babbler) *Spelaeornis chocolatinus* (Godwin-Austen & Walden, 1875) SPELCH

Type locality: เมือง Manipur ประเทศอินเดีย การแพร่กระจาย : ภาคตะวันตก อ้างอิงจาก : โอภาส (2544ข); จารุจินต์ และคณะ (2550)

869. นกจิ้งตัวจิ๋ว (Pygmy Wren Babbler) *Pnoepyga pusilla* Hodgson, 1845 PNOEPU

Type locality: ประเทศเนปาล การแพร่กระจาย : ภาคเหนือ ภาคตะวันตก และภาคใต้ อ้างอิงจาก : โอภาส (2544ข); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

870. นกจิ้งตัวตีนใหญ่ (Large Wren Babbler) *Napothera macrodactyla* (Strickland, 1844)

NAPOMA

Type locality: จังหวัดตรัง ประเทศไทย การแพร่กระจาย : ภาคใต้ อ้างอิงจาก : โอภาส (2544ข); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

871. นกจิ้งตัวคิ้วยาว (Eyebrowed Wren Babbler) *Napothera epilepidota* (Temminck, 1827)

NAPOEP

Type locality: เกาะชวา ประเทศอินโดนีเซีย การแพร่กระจาย : ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก และภาคใต้ อ้างอิงจาก : โอภาส (2544ข); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

872. นกจิ้งตัวเขาคู่น (Limestone Wren Babbler) *Napothera crispifrons* (Blyth, 1855)

NAPOCR

Type locality:เมืองตะนาวศรี ทางตอนใต้ของประเทศพม่า *การแพร่กระจาย* :ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันตก *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2544ข); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

873. นกจู้เต๋นหางสั้น (Streaked Wren Babbler) *Napothera brevicaudata* (Blyth, 1855)

NAPOBR

Type locality:เมืองตะนาวศรี ทางตอนใต้ของประเทศพม่า *การแพร่กระจาย* :ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก และภาคใต้ *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2544ข); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

874. นกจู้เต๋นลายจุด (Spotted Wren Babbler) *Elachura formosa* Baker&E.C.Stuart,1930

ELACFO

Type locality:เมืองดาร์จีลิง ประเทศอินเดีย (Darjeeling, India)*การแพร่กระจาย* : ภาคเหนือ *อ้างอิงจาก* : จารุจินต์ และคณะ (2550)

875. จู้เต๋นท้องเทา (Grey-bellied Wren Babbler) *Spelaeornis reptatus* Bingham,1903

SPELRE

Type locality:ทางตอนใต้ของรัฐฉาน ประเทศพม่า (Southern Shan State,Upper Myanmar)
การแพร่กระจาย : ภาคเหนือ *อ้างอิงจาก* : จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

876. นกกินแมลงเด็กแนน (Deignan's Babbler) *Stachyris rodolphei* Deignan, 1939 STACRO

Type locality:คอยเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ *การแพร่กระจาย* :ภาคเหนือ *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2544ข); จารุจินต์ และคณะ (2550)

877. นกกินแมลงหน้าผากน้ำตาล (Rufous-fronted Babbler) *Stachyris rufifrons* Hume, 1873

STACRU

Type locality:เมืองพะโล ประเทศพม่า *การแพร่กระจาย* :ภาคเหนือ ภาคตะวันตก และภาคใต้ *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2544ข); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

878. นกกินแมลงหัวสีทอง (Golden Babbler) *Stachyris chrysaea* Blyth, 1844

STACCH

Type locality:ประเทศเนปาล **การแพร่กระจาย :**ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก และภาคใต้ **อ้างอิงจาก :** โอภาส (2544ข); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

879. นกกินแมลงคอเทา (Grey-throated Babbler) *Stachyris nigriceps* Blyth, 1844

STACNI

Type locality:ประเทศเนปาล **การแพร่กระจาย :**ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก และภาคใต้ **อ้างอิงจาก :** โอภาส (2544ข); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

880. นกกินแมลงตาขาว (Grey-headed Babbler) *Stachyris poliocephala* (Temminck, 1836)

STACPO

Type locality:เกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย **การแพร่กระจาย :**ภาคใต้ **อ้างอิงจาก :** โอภาส (2544ข); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

881. นกกินแมลงคอลาย (Spot-necked Babbler) *Stachyris striolata* (Mueller, 1835)

STACST

Type locality:เกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย **การแพร่กระจาย :**ภาคเหนือ ภาคตะวันตก และภาคใต้ **อ้างอิงจาก :** โอภาส (2544ข); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

882. นกกินแมลงหูขาว (White-necked Babbler) *Stachyris leucotis* (Strickland, 1848)

STACLE

Type locality:ประเทศมาเลเซีย **การแพร่กระจาย :**ภาคใต้ **อ้างอิงจาก :** โอภาส (2544ข); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

883. นกกินแมลงคอดำ (Black-throated Babbler) *Stachyris nigricollis* (Temminck) 1836.

STACNI

Type locality:เกาะบอร์เนียว ประเทศอินโดนีเซีย **การแพร่กระจาย :**ภาคใต้ **อ้างอิงจาก :** โอภาส (2544ข); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

884. นกกินแมลงตะโพกแดง (Chestnut-rumped Babbler) *Stachyris maculata* (Temminck, 1836) STACMA

Type locality:เกาะบอร์เนียว ประเทศอินโดนีเซีย **การแพร่กระจาย :**ภาคใต้ **อ้างอิงจาก :** โอภาส (2544ข); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

885. นกกินแมลงปีกแดง (Chestnut-winged Babbler) *Stachyris erythroptera* (Blyth, 1842)

STACER

Type locality:ประเทศสิงคโปร์ **การแพร่กระจาย :**ภาคใต้ **อ้างอิงจาก :** โอภาส (2544ข); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

886. นกกินแมลงอกเหลือง (Striped Tit Babbler) *Macronous gularis* (Horsfield, 1822)

MACRGU

Type locality:เกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย **การแพร่กระจาย :**ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก และภาคใต้ **อ้างอิงจาก :** โอภาส (2544ข); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

887. นกกินแมลงหลังฟู (Fluffy-backed Tit Babbler) *Macronous ptilosus* Jardine & Selby,

1835 MACRPT

Type locality:ประเทศมาเลเซีย **การแพร่กระจาย :**ภาคใต้ **อ้างอิงจาก :** จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008); โอภาส (2544)

888. นกกินแมลงกระหม่อมแดง (Chestnut-capped Babbler) *Timalia pileata* Horsfield, 1821

TIMAPI

Type locality:เกาะชวา ประเทศอินโดนีเซีย **การแพร่กระจาย :**ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก และภาคตะวันออก **อ้างอิงจาก :** โอภาส (2544ข); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

889. นกกินแมลงตาเหลือง (Yellow-eyed Babbler) *Chrysomma sinense* (Gmelin, 1789)

CHRYSI

Type locality:มณฑลกว่างตุง ประเทศจีน **การแพร่กระจาย :**ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก และภาคตะวันออก **อ้างอิงจาก :** โอภาส (2544ข); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

890. นกกระรอกทองแก้มขาว(Silver-eared mesia) *Leiothrix argentauris* (Hodgson, 1837)

LEIOAR

Type locality: ประเทศเนปาล *การแพร่กระจาย* : ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันตก *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2544ข); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

891. นกขัติยา (Cutia) *Cutia nipalensis* Hodgson, 1837

CUTINI

Type locality: ประเทศเนปาล *การแพร่กระจาย* : ภาคเหนือ *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2544ข); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

892. นกเสื้อแมลงคอสีตาล (Black-eared Shrike Babbler) *Pteruthius melanotis* Hodgson, 1847

PTERME

Type locality: ประเทศเนปาล *การแพร่กระจาย* : ภาคเหนือ และภาคใต้ *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2544ข); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

893. นกเสื้อแมลงหน้าสีตาล (Chestnut-fronted Shrike Babbler) *Pteruthius aenobarbus*

(Temminck, 1835)

PTERAE

Type locality: รัฐอัสสัม ประเทศอินเดีย *การแพร่กระจาย* : ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันตก *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2544ข); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

894. นกเสื้อแมลงปีกแดง (White-browed Shrike Babbler) *Pteruthius flaviscapicis* (Temminck, 1835)

PTERFL

Type locality: เกาะชวา ประเทศอินโดนีเซีย *การแพร่กระจาย* : ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก และภาคใต้ *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2544ข); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

895. นกเสื้อแมลงหัวขาว (White-hooded Babbler) *Gampsorhynchus rufulus* Blyth, 1844

GAMPRU

Type locality: ประเทศอินเดีย *การแพร่กระจาย* : ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก และภาคใต้ *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2544ข); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

896. นกมุ่นรกหัวน้ำตาลแดง (Rufous-winged Fulvetta) *Alcippe castaneiceps* (Hodgson) 1837.

ALCICA

Type locality: ประเทศเนปาล *การแพร่กระจาย* : ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก และภาคใต้ *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2544ข); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

897. นกมุ่นรอกอแดง (Rufous-throated Fulvetta) *Alcippe rufogularis* (Mandelli, 1873)**ALCIRU**

Type locality: ภูฏาน *การแพร่กระจาย* : ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2544ข); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

898. นกมุ่นรอกหน้าผากน้ำตาล (Rusty-capped Fulvetta) *Alcippe dubia* (Hume, 1847)**ALCIDU**

Type locality: Mt. Mulayit ประเทศพม่า *การแพร่กระจาย* : ภาคตะวันตก *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2544ข); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

899. นกมุ่นรอกสีน้ำตาล (Brown Fulvetta) *Alcippe brunneicauda* (Salvadori, 1879)**ALCIBR**

Type locality: เกาะชวา ประเทศอินโดนีเซีย *การแพร่กระจาย* : ภาคใต้ *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2544ข); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

900. นกมุ่นรอกตาขาว (Brown-cheeked Fulvetta) *Alcippe poioicephala* (Jerdon, 1844)**ALCIPO**

Type locality: ประเทศอินโดนีเซีย *การแพร่กระจาย* : ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก และภาคใต้ *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2544ข); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

901. นกมุ่นรอกภูเขา (Mountain Fulvetta) *Alcippe peracensis* Sharpe, 1887 ALCIPE

Type locality: รัฐเประ ประเทศมาเลเซีย *การแพร่กระจาย* : ภาคใต้ *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2544ข); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

902. นกมุ่นรอกคิ้วดำ (Black-browed Fulvetta) *Alcippe grotei* Delacour, 1946 ALCIGR

Type locality: ประเทศเวียดนาม *การแพร่กระจาย* : ภาคตะวันออก *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2544ข); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

903. นกมุ่นรกตาแดง (Grey-checked Fulvetta) *Alcippe morrisonia* Swinhoe, 1863 ALCIMO

Type locality: Mount Morrison (Hsin Kao Shan) ประเทศไต้หวัน *การแพร่กระจาย* : ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันตก *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2544ข); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

904. นกหางร่ำหลังแดง (Rufous-backed Sibia) *Heterophasia annectens* (Blyth, 1847)

HETEAN

Type locality: ประเทศอินเดีย *การแพร่กระจาย* : ภาคเหนือ และ ภาคตะวันตก *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2544ข); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

905. นกหางร่ำดำ (Dark – backed Sibia) *Heterophasia melanoleuca* (Blyth, 1859) HETEME

Type locality: ประเทศพม่า *การแพร่กระจาย* : ภาคเหนือและภาคตะวันตก *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2544ข); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

906. นกหางร่ำหางยาว (Long-tailed Sibia) *Heterophasia picaoides* (Hodgson, 1839)

HETEPI

Type locality: ประเทศเนปาล *การแพร่กระจาย* : ภาคเหนือ และ ภาคตะวันตก *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2544ข); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

907. นกปีกลายตาขาว (Spectacled Barwing) *Actinodura ramsayi* (Walden, 1875)

ACTIRA

การแพร่กระจาย : ภาคเหนือ *Type locality:* ประเทศพม่า *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2544ข); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

908. นกคิ้วปีกสีฟ้า (Blue-winged Minla) *Minla cyanouroptera* (Hodgson, 1838)

MINLCY

Type locality: ประเทศเนปาล *การแพร่กระจาย* : ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก และ ภาคใต้ *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2544ข); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

909. นกคิ้วหางสีตาล (Chestnut-tailed Minla) *Minla strigula* (Hodgson, 1837) MINLST

Type locality: ประเทศเนปาล **การแพร่กระจาย :** ภาคเหนือและภาคตะวันตก **อ้างอิงจาก :** โอภาส (2544ข); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

910. นกอุหงอนหัวน้ำตาลแดง (Striated Yuhina) *Yuhina castaniceps* (Moore, 1854)

YUHICA

Type locality: ประเทศอินเดีย **การแพร่กระจาย :** ภาคเหนือและภาคตะวันตก **อ้างอิงจาก :** โอภาส (2544ข); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

911. นกอุหงอนวงตาขาว (Whiskered Yuhina) *Yuhina flavicollis* Hodgson, 1836 **YUHIFL**

Type locality: ประเทศเนปาล **การแพร่กระจาย :** ภาคเหนือ **อ้างอิงจาก :** โอภาส (2544ข); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

912. นกอุหงอนพม่า (Burmese Yuhina) *Yuhina humilis* (Hume, 1877) **YUHIHU**

Type locality: เมืองตะนาวศรี ทางตอนใต้ของประเทศพม่า **การแพร่กระจาย :** ภาคตะวันตก **อ้างอิงจาก :** โอภาส (2544ข); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

913. นกอุหงอนท้องขาว (White-bellied Yuhina) *Yuhina zantholeuca* (Blyth, 1844)

YUHIZA

Type locality: ประเทศเนปาล **การแพร่กระจาย :** ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก และภาคใต้ **อ้างอิงจาก :** โอภาส (2544ข); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

วงศ์นกปากนกแก้ว (Paradoxornithidae)

914. นกปากนกแก้วหัวเทา (Grey-headed Parrotbill) *Paradoxornis gularis* Gray, 1845

PARAGUL

Type locality: ภูฏาน **การแพร่กระจาย :** ภาคเหนือ **อ้างอิงจาก :** โอภาส (2544ข); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

915. นกปากนกแก้วอกลาย (Spot-breasted Parrotbill) *Paradoxornis guttaticollis* David, 1871

HPARAGUT

Type locality: ประเทศจีน **การแพร่กระจาย :** ภาคเหนือ **อ้างอิงจาก :** โอภาส (2544ข); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

916. นกปากนกแก้วหูเทา (Black-throated Parrotbill) *Paradoxornis nipalensis* (Hodgson, 1837)

PARANI

Type locality: ประเทศเนปาล *การแพร่กระจาย* : ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันตก *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2544ข); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008); โอภาส (2544)

917. นกปากนกแก้วหางสั้น (Short-tailed Parrotbill) *Paradoxornis davidianus* (Slater, 1897)

PARADA

Type locality: ประเทศจีน *การแพร่กระจาย* : ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2544ข); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

918. นกปากนกแก้วคิ้วดำ (Lesser Rufous-headed Parrotbill) *Paradoxornis atrosuperciliaris* (Godwin-Austen, 1877) **PARAAT**

Type locality: รัฐอัสสัม ประเทศอินเดีย *การแพร่กระจาย* : ภาคเหนือ *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2544ข); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

วงศ์นกจาบฝน (Family Alaudidae)

919. นกจาบฝนเสียงใส (Australasian Bushlark) *Mirafra javanica* Horsfield, 1821

MIRAJA

Type locality: เกาะชวา ประเทศอินโดนีเซีย *การแพร่กระจาย* : ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันตก *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2544ข); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

920. นกจาบฝนปีกแดง (Indochinese Bushlark) *Mirafra marionae* Salvadori & Giglioli, 1885

MIRAMA

Type locality: รัฐอัสสัม ประเทศอินเดีย *การแพร่กระจาย* : ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2544ข); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

921. นกจาบฝนเสียงสวรรค์ (Oriental Skylark) *Alauda gulgula* Franklin, 1831 **ALDUGU**

Type locality: ประเทศอินเดีย **การแพร่กระจาย :** ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาค ตะวันตก **อ้างอิงจาก :** โอภาส (2544ข); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

วงศ์นกกาฝาก (Family Dicaeidae)

922. นกกาฝากอกเหลือง (Yellow-breasted Flowerpecker) *Prionochilus maculates* (Temminck & Laugier, 1836) PRIOMA

Type locality: เกาะบอร์เนียว ประเทศอินโดนีเซีย **การแพร่กระจาย :** ภาคตะวันตก และภาคใต้ **อ้างอิงจาก :** โอภาส (2544ข); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

923. นกกาฝากอกสีเลือดหมู (Crimson-breasted Flowerpecker) *Prionochilus percussus* (Temminck & Laugier, 1826) PRIOPE

Type locality: เกาะชวา ประเทศอินโดนีเซีย **การแพร่กระจาย :** ภาคใต้ **อ้างอิงจาก :** โอภาส (2544ข); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

924. นกกาฝากอกแดง (Scarlet-breasted Flowerpecker) *Prionochilus thoracicus* (Temminck & Laugier, 1836) PRIOTH

Type locality: เกาะบอร์เนียว ประเทศอินโดนีเซีย **การแพร่กระจาย :** ภาคใต้ **อ้างอิงจาก :** จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008); โอภาส (2544)

925. นกกาฝากปากหนา (Thick-billed Flowerpecker) *Dicaeum agile* (Tickell, 1833)

DICAAG

Type locality: รัฐเบงกอล ประเทศอินเดีย **การแพร่กระจาย :** ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก และภาคใต้ **อ้างอิงจาก :** โอภาส (2544ข); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

926. นกกาฝากก้นเหลือง (Yellow-vented Flowerpecker) *Dicaeum chrysorrheum* Temminck & Laugier, 1829 DICACH

Type locality: เกาะชวา ประเทศอินโดนีเซีย **การแพร่กระจาย :** ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก และภาคใต้ **อ้างอิงจาก :** โอภาส (2544ข); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

927. นกกาฝากท้องเหลือง (Yellow-bellied Flowerpecker) *Dicaeum melanoxanthum* (Blyth, 1843) **DICAME**

Type locality: ประเทศเนปาล *การแพร่กระจาย* : ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

อ้างอิงจาก : โอภาส (2544ข); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

928. นกกาฝากสีเขียว (Plain Flowerpecker) *Dicaeum concolor* Jerdon, 1840 **DICACO**

Type locality: ประเทศอินเดีย *การแพร่กระจาย* : ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันตก *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2544ข); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

929. นกกาฝากท้องสีส้ม (Orange-bellied Flowerpecker) *Dicaeum trigonostigma* (Scopoli, 1786) **DICATR**

Type locality: ประเทศมาเลเซีย *การแพร่กระจาย* : ภาคตะวันตก และภาคใต้ *อ้างอิงจาก* : โอภาส

(2544ข); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

930. นกกาฝากอกเพลิง (Fire-breasted Flowerpecker) *Dicaeum ignipectus* (Blyth, 1843) **DICAIG**

Type locality: ประเทศเนปาล *การแพร่กระจาย* : ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก และภาคใต้ *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2544ข); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008); โอภาส (2544)

931. นกสีชมพูสวน (Scarlet-backed Flowerpecker) *Dicaeum cruentatum* (Linnaeus, 1758) **DICACR**

Type locality: รัฐเบงกอล ประเทศอินเดีย *การแพร่กระจาย* : ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก และภาคใต้ *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2544ข); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

วงศ์นกกินป्लीและนกปลีกกล้วย (Family Nectariniidae)

932. นกกินป्लीสีเขียว (Plain Sunbird) *Anthreptes simplex* (Mueller, 1843) **ANTHSIM**

Type locality: เกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย *การแพร่กระจาย* : ภาคตะวันตก และภาคใต้

อ้างอิงจาก : โอภาส (2544ข);จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

933. นกกินปลีคอสีน้ำตาล (Brown-throated Sunbird) *Anthreptes malacensis* (Scopoli, 1786)

ANTHMA

Type locality:เมืองMalacca ประเทศมาเลเซีย *การแพร่กระจาย* :ภาคกลาง ภาคตะวันออก เนียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก และภาคใต้ *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2544ข);จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

934. นกกินปลีคอสีน้ำตาลแดง (Red-throated Sunbird) *Anthreptes rhodolaema* Shelley, 1878

ANTHRH

Type locality:เมืองMalacca ประเทศมาเลเซีย *การแพร่กระจาย* :ภาคใต้ *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2544ข);จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

935. นกกินปลีแก้มสีทับทิม (Ruby-cheeked Sunbird) *Anthreptes singalensis* (Gmelin, 1788)

ANTHSIN

Type locality:ประเทศศรีลังกา *การแพร่กระจาย* :ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเนียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก และภาคใต้ *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2544ข);จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

936. นกกินปลีท้ายทอยสีน้ำเงิน (Purple-naped Sunbird) *Hypogramma hypogrammicum*

Mueller, 1843

HYPOHY

Type locality:เกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย *การแพร่กระจาย* :ภาคเหนือ ภาคตะวันตก และภาคใต้ *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2544ข);จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

937. นกกินปลีคอสีม่วง (Purple-throated Sunbird) *Nectarinia sperata* (Linnaeus, 1766)

NECTSP

Type locality:เกาะชวา ประเทศอินโดนีเซีย *การแพร่กระจาย* :ภาคตะวันออกเนียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2544ข);จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

938. นกกินปลีคอสีทองแดง (Copper-throated Sunbird) *Nectarinia calcostetha* Jardine, 1843

NECTCA

Type locality: เกาะชวา ประเทศอินโดนีเซีย *การแพร่กระจาย* : ภาคตะวันออก และภาคใต้
อ้างอิงจาก : โอภาส (2544ข); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

939. นกกินปลีอกเหลือง (Olive-backed Sunbird) *Nectarinia jugularis* (Linnaeus, 1766)

NECTJU

Type locality: ฟิลิปปินส์ *การแพร่กระจาย* : ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก และภาคใต้ *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2544ข); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

940. นกกินปลีดำม่วง (Purple Sunbird) *Nectarinia asiatica* (Latham, 1790) NECTAS

Type locality: ประเทศอินเดีย *การแพร่กระจาย* : ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันตก *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2544ข); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

941. นกกินปลีหางยาวคอสีฟ้า (Mrs Gould's Sunbird) *Aethopyga gouldiae* (Vigors, 1831)

AETHGO

Type locality: เทือกเขาหิมาลัย *การแพร่กระจาย* : ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
อ้างอิงจาก : โอภาส (2544ข); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

942. นกกินปลีหางยาวคอดำ (Black-throated Sunbird) *Aethopyga saturata* (Hodgson, 1836)

AETHSA

Type locality: ประเทศเนปาล *การแพร่กระจาย* : ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก และภาคใต้ *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2544ข); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

943. นกกินปลีหางยาวเขียว (Green-tailed Sunbird) *Aethopyga nipalensis* (Hodgson, 1837)

AETHNI

Type locality: ประเทศเนปาล *การแพร่กระจาย* : ภาคเหนือ ภาคตะวันตก และภาคใต้ *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2544ข); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

944. นกกินปลีคอแดง (Crimson Sunbird) *Aethopyga siparaja* (Raffles, 1822)

AETHSI

Type locality:เกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย **การแพร่กระจาย :**ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก และภาคใต้ **อ้างอิงจาก :** โอภาส (2544ข); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

945. นกกินปลีแดง (Temminck's Sunbird) *Aethopyga temminckii* Mueller, 1834

AETHTE

Type locality:เกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย **การแพร่กระจาย :**ภาคใต้ **อ้างอิงจาก :** โอภาส (2544ข); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

946. นกกินปลีแดงหัวไฟลิ้น (Fire-tailed Sunbird) *Aethopyga ignicauda* (Hodgson, 1837)

AETHIG

Type locality:ประเทศเนปาล **การแพร่กระจาย :**ภาคเหนือ **อ้างอิงจาก :** โอภาส (2544ข); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

947. นกกินปลีกล้วยเล็ก (Little Spiderhunter) *Arachnothera longirostra* (Latham, 1790)

ARACLO

Type locality:ประเทศปากีสถาน **การแพร่กระจาย :**ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก และภาคใต้ **อ้างอิงจาก :** โอภาส (2544ข); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

948. นกปลีกล้วยปากหนา (Thick-billed Spiderhunter) *Arachnothera crassirostris*

(Reichenback, 1854)

ARACCR

Type locality:ประเทศมาเลเซีย **การแพร่กระจาย :**ภาคใต้ **อ้างอิงจาก :** โอภาส (2544ข); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

949. นกปลีกล้วยปากยาว (Long-billed Spiderhunter) *Arachnothera robusta* Mueller &

Schlegel, 1845

ARACRO

Type locality:เกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย **การแพร่กระจาย :**ภาคใต้ **อ้างอิงจาก :** โอภาส (2544ข); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

950. นกปลีกล้วยลาย (Streaked Spiderhunter) *Arachnothera magna* (Hodgson, 1837)

ARACMA

Type locality: ประเทศเนปาล *การแพร่กระจาย* : ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก และภาคใต้ *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2544ข); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

951. นกปลีกด้วยหูเหลืองใหญ่ (Spectacled Spiderhunter) *Arachnothera flavigaster* (Eyton, 1839) ARACFL

Type locality: ประเทศมาเลเซีย *การแพร่กระจาย* : ภาคตะวันตก และภาคใต้ *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2544ข); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

952. นกปลีกด้วยหูเหลืองเล็ก (Yellow-eared Spiderhunter) *Arachnothera chrysogenys* (Temminck, 1826) ARACCH

Type locality: เกาะชวา ประเทศอินโดนีเซีย *การแพร่กระจาย* : ภาคตะวันตก และภาคใต้ *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2544ข); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

953. นกปลีกด้วยท้องเทา (Grey-breasted Spiderhunter) *Arachnothera affinis* (Horsfield, 1822) ARACAF

Type locality: เกาะชวา ประเทศอินโดนีเซีย *การแพร่กระจาย* : ภาคตะวันตก และภาคใต้ *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2544ข); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson(2008)

วงศ์นกเต้าลมและนกเต้าดิน (Family Motacillidae)

954. นกเต้าลมดง (Forest Wagtail) *Dendronanthus indicus* (Gmelin, 1789) DENDIN

Type locality: ประเทศอินเดีย *การแพร่กระจาย* : ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก และภาคใต้ *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2544ข); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

955. นกอุ้มบาตร (White Wagtail) *Motacilla alba* Linnaeus, 1758 MOTAAL

Type locality: ประเทศสวีเดน *การแพร่กระจาย* : ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก และภาคใต้ *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2544ข); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

956. นกเต้าลมแม่น้ำโขง (Mekong Wagtail) *Motacilla samveasnae* Duckworth, Alström, Davidson, Evans, Poole, Setha & Timmins, 2001 MOTASA
Type locality: ประเทศกัมพูชา (San River, Stung Teng Province, Campodia) *การแพร่กระจาย* : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ *อ้างอิงจาก* : จารุจินต์ และคณะ (2550)
957. นกเต้าลมหัวเหลือง (Citrine Wagtail) *Motacilla citreola* Pallas, 1776 MOTACIT
Type locality: ประเทศรัสเซีย *การแพร่กระจาย* : ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันตก *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2544ข); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)
958. นกเต้าลมเหลือง (Yellow Wagtail) *Motacilla flava* Linnaeus, 1758 MOTAFL
Type locality: ประเทศสวีเดน *การแพร่กระจาย* : ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก และภาคใต้ *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2544ข); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)
959. นกเต้าลมหลังเทา (Grey Wagtail) *Motacilla cinerea* Tunstall, 1771 MOTACIN
Type locality: ประเทศอังกฤษ *การแพร่กระจาย* : ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก และภาคใต้ *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2544ข); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)
960. นกเต้าดินทุ่งใหญ่ (Richard's Pipit) *Anthus richardi* Vieillot, 1818 ANTHRI
Type locality: ประเทศฝรั่งเศส *การแพร่กระจาย* : ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก และภาคใต้ *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2544ข); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)
961. นกเต้าดินทุ่งเล็ก (Paddyfield Pipit) *Anthus rufulus* Vieillot, 1818 ANTHRUF
Type locality: รัฐเบงกอล ประเทศอินเดีย *การแพร่กระจาย* : ภาคเหนือ ภาคตะวันออก เนียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก และภาคใต้ *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2544ข); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)
962. นกเต้าดินทุ่งพันธุรัสเซีย (Blyth's Pipit) *Anthus godlewskii* (Taczanowski, 1876) ANTHGO

Type locality: Duria ทางตอนใต้ของไซบีเรีย **การแพร่กระจาย :** ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ **อ้างอิงจาก :** โอภาส (2544ข);จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

963. นกเด้าดินสวน (Olive-backed Pipit) *Anthus hodgsoni* Richmond, 1907 ANTHHO

Type locality: ประเทศอินเดีย **การแพร่กระจาย :** ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ **อ้างอิงจาก :** โอภาส (2544ข);จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

964. นกเด้าดินอกแดง (Red-throated Pipit) *Anthus cervinus* (Pallas, 1811) ANTHCE

Type locality: ไซบีเรีย ประเทศรัสเซีย **การแพร่กระจาย :** ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ **อ้างอิงจาก :** โอภาส (2544ข);จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

965. นกเด้าดินอกสีชมพู (Rosy Pipit) *Anthus roseatus* Blyth, 1847 ANTHRO

Type locality: ประเทศเนปาล **การแพร่กระจาย :** ภาคเหนือ และภาคกลาง **อ้างอิงจาก :** โอภาส (2544ข);จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

966. นกเด้าดินพันธุ์ไซบีเรีย (Buff-bellied Pipit) *Anthus rubescens* (Tunstall, 1771)

ANTHRUB

Type locality: รัฐไซบีเรีย ประเทศรัสเซีย **การแพร่กระจาย :** ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ **อ้างอิงจาก :** โอภาส (2544ข);จารุจินต์ และคณะ (2550)

วงศ์นกกระจอก (Family Passeridae)

967. นกกระจอกใหญ่ (House Sparrow) *Passer domesticus* (Linnaeus, 1758) PASSDO

Type locality: ประเทศสวีเดน **การแพร่กระจาย :** ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ **อ้างอิงจาก :** โอภาส (2544ข);จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

968. นกกระจอกป่าท้องเหลือง (Russet Sparrow) *Passer rutilans* (Temminck, 1835)

PASSRU

Type locality: ประเทศญี่ปุ่น **การแพร่กระจาย :** ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ **อ้างอิงจาก :** โอภาส (2544ข);จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

969. นกกระจอกตาล (Plain-backed Sparrow) *Passer flaveolus* Blyth, 1844 PASSFL

*Type locality:*เมืองพะโล (Pegu) ประเทศพม่า *การแพร่กระจาย* :ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก และภาคใต้ *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2544ข);จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

970. นกกระจอกบ้าน (Eurasian Tree Sparrow) *Passer montanus* (Linnaeus, 1758)**PASSMO**

*Type locality:*ตอนเหนือของประเทศอิตาลี *การแพร่กระจาย* :ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก และภาคใต้ *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2544ข);จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

วงศ์นกกระจาบ (Family Ploceidae)**971. นกกระจาบอกลาย (Streaked Weaver) *Ploceus manyar* (Horsfield, 1821) PLOCMA**

*Type locality:*เกาะชวา ประเทศอินโดนีเซีย *การแพร่กระจาย* :ภาคเหนือ และภาคกลาง *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2544ข);จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

972. นกกระจาบธรรมดา (Baya Weaver) *Ploceus philippinus* (Linnaeus, 1766) PLOCPH

*Type locality:*ประเทศศรีลังกา *การแพร่กระจาย* :ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก และภาคใต้ *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2544ข);จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

973. นกกระจาบทอง (Asian Golden Weaver) *Ploceus hypoxanthus* (Sparrman, 1788)**PLOCHY**

*Type locality:*เกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย *การแพร่กระจาย* :ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันตก *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2544ข);จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

วงศ์นกกระติ๊ด (Family Estrildidae)**974. นกกระติ๊ดแดง (Red Avadavat) *Amandava amandava* (Linnaeus, 1758) AMANAM**

*Type locality:*รัฐเบงกอล ประเทศอินเดีย *การแพร่กระจาย* :ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันตก *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2544ข);จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

975. นกกระตีดเขียว, นกไผ่ (Pin-tailed Parrotfinch) *Erythrura prasina* (Sparman, 1788)

ERYTPR

Type locality: เกาะชวา ประเทศอินโดนีเซีย *การแพร่กระจาย* : ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก และภาคใต้ *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2544ข); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

976. นกกระจอกชวา (Java Sparrow) *Padda oryzivora* (Linnaeus, 1758) PADDOR

Type locality: เกาะชวา ประเทศอินโดนีเซีย *การแพร่กระจาย* : ภาคกลาง *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2544ข); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

977. นกกระตีดตะโพกขาว (White-rumped Munia) *Lonchura striata* (Linnaeus, 1766)

LONCST

Type locality: ประเทศศรีลังกา *การแพร่กระจาย* : ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก และภาคใต้ *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2544ข); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

978. นกกระตีดท้องขาว (White-bellied Munia) *Lonchura leucogastra* (Blyth, 1846)

LONCLE

Type locality: ประเทศมาเลเซีย *การแพร่กระจาย* : ภาคใต้ *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2544ข); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

979. นกกระตีดขี้หมู (Scaly-breasted Munia) *Lonchura punctulata* (Linnaeus, 1758)

LONCPU

Type locality: เกาะชวา ประเทศอินโดนีเซีย *การแพร่กระจาย* : ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก และภาคใต้ *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2544ข); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

980. นกกระตีดสีอิฐ (Black-headed Munia) *Lonchura malacca* (Linnaeus, 1766)

LONCMAL

Type locality:เมืองMalacca ประเทศมาเลเซีย *การแพร่กระจาย* :ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2544ข);จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

981. นกกระตีดหัวขาว (White-headed Munia) *Lonchura maja* (Linnaeus, 1766)

LONCMAJ

Type locality:ประเทศมาเลเซีย *การแพร่กระจาย* :ภาคใต้ *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2544ข);จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

วงศ์นกจาบปีกอ่อน (Family Fringillidae)

982. นกจาบปีกอ่อนหัวเทาอกชมพู (Chaffinch) *Fringilla coelebs* Linnaeus, 1758

FRINCO

Type locality:ทวีปยุโรป *การแพร่กระจาย* :ภาคเหนือ *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2544ข);จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

983. นกจาบปีกอ่อนนอกสีส้ม (Brambling) *Fringilla montifringilla* Linnaeus, 1758

FRINMO

Type locality:ทวีปยุโรป *การแพร่กระจาย* :ภาคเหนือ *อ้างอิงจาก* : จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

984. นกจาบปีกอ่อนเขียว (Black-headed Greenfinch) *Carduelis ambigua* (Oustalet, 1896)

CARDAM

Type locality:มณฑลยูนนาน ประเทศจีน *การแพร่กระจาย* :ภาคเหนือ *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2544ข);จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

985. นกจาบปีกอ่อนสีชมพูคล้ำ (Dark-breasted Rosefinch) *Carpodacus nipalensis* (Hodgson, 1836)

CARPNI

Type locality:ประเทศเนปาล *การแพร่กระจาย* :ภาคเหนือ *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2544ข);จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

986. นกจาบปีกอ่อนสีกุหลาบ (Common Rosefinch) *Carpodacus erythrinus* (Pallas, 1770)

CARPER

Type locality: ประเทศรัสเซีย *การแพร่กระจาย* : ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2544ข); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

987. นกจาบปีกอ่อนตะโพกชมพู (Pink-rumped Rosefinch) *Carpodacus eos* (Stresemann) 1930. CARPEO

Type locality: ประเทศจีน *การแพร่กระจาย* : ภาคเหนือ *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2544ข); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

988. นกจาบปีกอ่อนสีแดง (Scarlet Finch) *Haematospiza sipahi* (Hodgson) 1836. HAEMSI

Type locality: ประเทศเนปาล *การแพร่กระจาย* : ภาคเหนือ *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2544ข); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

989. นกกระติ๊ดใหญ่ปากเหลือง (Yellow-billed Grosbeak) *Eophona migratoria* Hartert, 1903 EOPHMI

Type locality: ไชยบุรี ประเทศรัสเซีย *การแพร่กระจาย* : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2544ข); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

990. นกกระติ๊ดใหญ่สร้อยคอเหลือง (Collared Grosbeak) *Mycerobas affinis* (Blyth, 1855) MYCEAF

Type locality: รัฐปัญจาบ ประเทศอินเดีย *การแพร่กระจาย* : ภาคเหนือ *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2544ข); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

991. นกกระติ๊ดใหญ่ปีกลาย (Spot-winged Grosbeak) *Mycerobas melanozanthos* (Hodgson, 1836) MYCE

Type locality: ประเทศเนปาล *การแพร่กระจาย* : ภาคเหนือ *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2544ข); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

วงศ์นกจาบปีกอ่อนเล็ก (Family Emberizidae)

992. นกจาบปีกอ่อนหงอน (Crested Bunting) *Melophus lathamii* (Gray, 1831) MALOLA

Type locality: เมืองกวางตุ้ง ประเทศจีน *การแพร่กระจาย* : ภาคเหนือ *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2544ข); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

993. นกจาบปีกอ่อนหัวดำขาว (Tristram's Bunting) *Emberiza tristrami* Swinhoe, 1870

EMBETR

Type locality: ประเทศจีน *การแพร่กระจาย :* ภาคเหนือ *อ้างอิงจาก :* โอภาส (2544ข); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

994. นกจาบปีกอ่อนหัวดำ (Black-headed Bunting) *Emberiza melanocephala* Scopoli, 1769

EMBEME

Type locality: ทวีปยุโรป *การแพร่กระจาย :* ภาคตะวันตก *อ้างอิงจาก :* โอภาส (2544ข); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

995. นกจาบปีกอ่อนหัวแดง (Red-headed Bunting) *Emberiza bruniceps* Brandt, 1841

EMBEBR

Type locality: ประเทศเติร์กเมนิสถาน (Turkmenistan) *การแพร่กระจาย :* ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก และภาคใต้ *อ้างอิงจาก :* จารุจินต์ และคณะ (2550)

996. นกจาบปีกอ่อนหัวเทา (Chestnut-eared Bunting) *Emberiza fucata* Pallas, 1776

EMBEFU

Type locality: ไชบีเรีย ประเทศรัสเซีย *การแพร่กระจาย :* ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ *อ้างอิงจาก :* โอภาส (2544ข); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

997. นกจาบปีกอ่อนเล็ก (Little Bunting) *Emberiza pusilla* Pallas, 1776

EMBEPU

Type locality: ประเทศรัสเซีย *การแพร่กระจาย :* ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ *อ้างอิงจาก :* จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008); โอภาส (2544)

998. นกจาบปีกอ่อนอกเหลือง (Yellow-breasted Bunting) *Emberiza aureola* Pallas, 1773

EMBEAU

Type locality: ประเทศรัสเซีย *การแพร่กระจาย :* ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก และภาคใต้ *อ้างอิงจาก :* โอภาส (2544ข); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

999. นกจาบปีกอ่อนสีตาล (Chestnut Bunting) *Emberiza rutila* Pallas, 1776 **EMBERU**

Type locality: ประเทศรัสเซีย *การแพร่กระจาย* : ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันตก *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2544ข); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

1000. นกจาบปีกอ่อนหน้าดำ (Black-faced Bunting) *Emberiza spodocephala* Pallas, 1776

EMBESP

Type locality: ประเทศรัสเซีย *การแพร่กระจาย* : ภาคเหนือ *อ้างอิงจาก* : โอภาส (2544ข); จารุจินต์ และคณะ (2550); Robson (2008)

เอกสารอ้างอิง

จารุจินต์ นภิตะภักดิ์, กานต์ เลขะกุล และวัชระ สงวนสมบัติ. 2550. คู่มือดูนก หมอบัญส่งเลขะกุล นกเมืองไทย. ด้านสุทธาการพิมพ์จำกัด, กรุงเทพฯ.

สมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย. 2554. **ฐานข้อมูลนกในประเทศไทย**. สมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย , กรุงเทพฯ แหล่งที่มา : http://www.bcst.or.th/back_up_2009/data.htm, 14 พฤศจิกายน 2554.

โอภาส ขอบเขตต์. 2541. **นกในเมืองไทย เล่ม 1**. สารคดี, กรุงเทพฯ.

โอภาส ขอบเขตต์. 2542. **นกในเมืองไทย เล่ม 2**. สารคดี, กรุงเทพฯ.

โอภาส ขอบเขตต์. 2543. **นกในเมืองไทย เล่ม 3**. สารคดี, กรุงเทพฯ.

โอภาส ขอบเขตต์. 2544ก. **นกในเมืองไทย เล่ม 4**. สารคดี, กรุงเทพฯ.

โอภาส ขอบเขตต์. 2544ข. **นกในเมืองไทย เล่ม 5**. สารคดี, กรุงเทพฯ.

Duckworth, J. W., T. P. Inskipp, E. Pasquet, P. C. Rasmussen, N. H. Rice, C. R. Robson & D. G. D. Russell. 2008. A status re-evaluation of Tawny Eagle *Aquila rapax* in South-East Asia. **Forktail**24:127-128.

Lekagul, B. and P. D. Round. 1991. **A Guide to the Birds of Thailand**. Darnsutha Press, Bangkok.

Pratumtong, D. Wachara Sa-nguansombat, Vijak Chimchome. 2007. **Birds of Dry and Semi-humid Ecosystem**, Office of Natural Resources and Environmental Policy and Planning, Bangkok, Thailand, 148 p.

Robson, C. R. 2002. **A Field Guide to the Birds of Thailand.** Bangkok: Asia Books. Bangkok.

Robson, C. R. 2008. **A Field Guide to the Birds of Thailand and South – East Asia.** Bangkok:
Asia Books. Bangkok.